



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com

แจ้งเตือนพืชที่เกิดผลกระทบ ช่วงวันที่ ๒๙ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
อากาศร้อนมี ฝนตกในบาง พื้นที่	มะลิ	เก็บผลผลิต	หนอนเจาะดอก มะลิ	ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ เป็นฟองเดี่ยวๆสีเหลือง บนกลีบดอกหรือก้าน กลีบเลี้ยงดอกและ ยอดอ่อน เมื่อฟักเป็นตัว หนอนจะเจาะเข้าไปกัด กินอยู่ภายในดอกทำให้ ดอกเป็นรอยชำเปลี่ยนเป็น สีม่วงเหี่ยวแห้งและ ร่วงหล่น	เมื่อพบการระบาดของ พ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
	ทุเรียน	เก็บผลผลิต	โรคผลเน่า (เชื้อรา Phytophthora palmivora)	เริ่มแรกเกิดจุดแผลขนาดเล็ก สีน้ำตาลดำบนผลจุด แผลจะขยายใหญ่ลุกลาม มากขึ้นตามการสุกของผล ในสภาพที่มีความชื้นสูง อาจพบเส้นใยสีขาวของ เชื้อราสาเหตุโรคบนแผล พบอาการโรคได้ตั้งแต่ผล ที่ยังอยู่บนต้นซึ่งถ้าอาการ รุนแรงมากผลจะเน่าร่วง หล่นก่อนกำหนดโรคนี้นพบ ได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อน แต่ ส่วนใหญ่มักพบในผลช่วง ๑ เดือนก่อนเก็บเกี่ยว จนกระทั่งเก็บเกี่ยว และ ระหว่างการบ่มผลให้สุก	๑. หมั่นตรวจผล ทุเรียนในแปลงอย่าง สม่ำเสมอตัดผลที่เป็น โรคและเก็บผลเน่าที่ ร่วงหล่นนำไปทำลาย นอกแปลงปลูกแล้ว พ่นด้วยสารป้องกัน กำจัดโรคพืชเมทา แลกซิล ๒๕ % ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน ๑-๒ ครั้งทุก ๗-๑๐ วัน

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
					และควรหยุดพ่นสาร ก่อนเก็บเกี่ยวผล อย่างน้อย ๑๕ วัน ๒. ไม่นำเครื่องมือตัด แต่งที่ใช้กับต้นเป็น โรคไปใช้ต่อกับต้น ปกติและควรทำความ สะอาดเครื่องมือก่อน นำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง ๓. ในแปลงปลูกที่มี ความเสี่ยงต่อการเกิด โรค ผล เน่า สูง เนื่องจากมีต้นที่เป็น โรครากเน่าและโคน เน่าในแปลงมากและ มีฝนตกชุกหรือมี ความชื้นในอากาศสูง ในช่วงทุเรียนใกล้เก็บ เกี่ยวผลเชื้อสาเหตุ โรคอาจจะติดไปกับ ผลได้โดยยังไม่แสดง อาการ ดังนั้นการเก็บ เกี่ยวผลต้องระมัดระวัง ไม่ให้ผลสัมผัสกับดิน หรือปูพื้นดินที่จะวาง ผล ด้วยวัสดุ หรือ กระสอบที่สะอาดเพื่อ ลดโอกาสที่ผลจะ สัมผัสกับดินซึ่งมีเชื้อ สาเหตุโรคและการขน ย้ายควรระมัดระวัง ไม่ให้เกิดบาดแผล ที่ผล

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
					**** โรคผลเน่า เกิดจากเชื้อสาเหตุ ชนิดเดียวกับโรคราก เน่าและโคนเน่า ดังนั้นเพื่อให้การ ป้องกันกำจัดโรค ได้ผลดีควรทำการ ป้องกันกำจัดโรคราก เน่าโคนเน่าไปพร้อม กัน

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์