



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com
[http:// www.moac.go.th](http://www.moac.go.th)

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 4 เมษายน 2567 (เวลา 08.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 06.00 น.

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงาน หรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานไว้ด้วย ในขณะที่ลมใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทำให้ ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ถึงสูง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อน

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 3 เม.ย. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 4 เม.ย. 67



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	ตรัง	3.3	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 67)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 45,901 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ปริมาณน้ำใช้การได้ 21,960 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (48,242 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,341 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 17.65 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 130.40 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 30,436 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 42,979 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 19,440 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (45,087 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) น้อยกว่าปี 2566 จำนวน 2,108 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 11.90 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 115.24 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 27,947 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	12,811	52	6,067	34	80	1,083	661	61	571	58	88	25,908	13,472	52	6,637	35	12,435
ตอน.	12	8,368	4,418	53	2,766	41	226	2,061	1,165	57	998	53	238	10,429	5,583	54	3,764	44	4,846
กลาง	3	1,419	411	29	351	26	27	419	175	42	151	38	30	1,838	586	32	502	29	1,252
ตะวันออก	2	26,605	19,185	72	5,908	44	8	164	68	42	57	37	10	26,769	19,253	72	5,965	44	7,515
ตะวันออก	6	1,515	589	39	494	35	52	1,006	454	45	397	42	58	2,520	1,043	41	892	38	1,478
ใต้	4	8,194	5,565	68	3,855	59	42	679	399	59	345	55	46	8,874	5,964	67	4,200	59	2,909
รวม	35	70,926	42,979	61	19,440	41	435	5,411	2,922	54	2,520	50	470	76,337	45,901	60	21,960	42	30,436

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 12,543 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 5,847 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 2.75 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 36.05 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,328 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	ได้อีก
ภูมิพล	7,491	56	3,691	38	0.00	0.00	18.00	18.00	5,971
สิริกิตี	4,411	46	1,561	23	1.68	3.27	11.14	11.00	5,099
ภูมิพล+สิริกิตี	11,902	52	5,252	32	1.68	3.27	29.14	29.00	11,070
แควน้อยฯ	368	39	325	36	0.67	0.86	3.89	4.32	571
ป่าสักชลสิทธิ์	273	28	270	28	0.40	0.41	3.03	3.03	687
รวมทั้งหมด	12,543	50	5,847	32	2.75	4.54	36.05	36.35	12,328

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 8 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ สิริกิตี (23%) อ่างฯ แม่มอก (24%) อ่างฯ จุฬารักษ์ (18%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (28%) อ่างฯ กระเสี้ยว (12%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (30%) อ่างฯ คลองสิียด (5%) และอ่างฯ ปราณบุรี (25%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโกลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 277 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 298 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.23 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.47 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.30 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.45 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.54 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.54 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 77 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 79 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 64 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 13 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 6 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 6 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 62 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) 16 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 21 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 90 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 95 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) - ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสี้ยว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสี้ยว 3 ลบ.ม./วินาที) แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 35 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 40 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 12 ลบ.ม./วินาที

อบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 163 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 110 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		28 มี.ค. 67	29 มี.ค. 67	30 มี.ค. 67	31 มี.ค. 67	1 เม.ย. 67	2 เม.ย. 67	3 เม.ย. 67		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.61	0.58	0.56	0.61	0.60	0.70	0.71	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.80	0.72	0.70	0.79	0.81	1.10	1.13	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับลิ่ง	ระดับน้ำ 2 เม.ย. 67	+ สูงกว่าลิ่ง - ต่ำกว่าลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.53	-11.27
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	3.12	-12.88
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	0.65	-11.55
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	0.95	-11.05
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.49	-11.01
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.02	-12.48

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dnw.go.th


3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (วันที่ 1 พ.ย.66 ถึง 30 เม.ย.67) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้งานได้ จำนวน 40,387 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 24,985 ล้าน ลบ.ม. สำหรับในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้วางแผนจัดสรรน้ำ จำนวน 8,700 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 20,147 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใช้น้ำไป 7,306 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 7,306 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	3,050	7,760	13,555	620	24,985	20,147	81
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	1,150	2,722	4,693	135	8,700	7,306	84



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

ทั่วประเทศ จำนวน 10.66 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.13 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.53 ล้านไร่

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 4.90 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4.20 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.70 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567)

ทั่วประเทศ จำนวน 13.08 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 11.54 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 122.70 ของแผน

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 7.65 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.29 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.36 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 156.12 ของแผน

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2566/67			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2566/67						ข้าวรอบที่ 2	
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าว	%ข้าว	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวม	%รวม	พื้นที่ เก็บเกี่ยว	พื้นที่ เกี่ยว
ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	5.80	0.57	6.37	9.12	157.24	0.53	92.98	9.65	151.49	3.40	5.72
	นอกเขตชลประทาน	2.33	1.96	4.29	2.42	103.86	1.01	51.53	3.43	79.95	0.83	1.59
	รวม	8.13	2.53	10.66	11.54	141.94	1.54	60.87	13.08	122.70	4.23	7.31
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	3.03	0.13	3.16	5.75	189.77	0.09	69.23	5.84	184.81	2.73	3.02
	นอกเขตชลประทาน	1.17	0.57	1.74	1.54	131.62	0.27	47.37	1.81	104.02	0.77	0.77
	รวม	4.20	0.70	4.90	7.29	173.57	0.36	51.43	7.65	156.12	3.50	3.79

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 54 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 4.15 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 49 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 3.69 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนครหนองคายหนองบัวลำภูอำนาจเจริญอุดรธานีอุบลราชธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามระยองสระแก้วกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดกระบี่

- นอกเขตชลประทาน 23 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.46 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก น่าน นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม หนองบัวลำภูอำนาจเจริญชัยนาทตราดนครนายกสุพรรณบุรีและจังหวัดตรัง

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 16 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	ตาก(3) พิษณุโลก(1) เพชรบูรณ์(6) สุโขทัย(5) พิจิตร(1) กำแพงเพชร(3) แพร่(8) เชียงราย(5) เชียงใหม่(25) น่าน(4) พะเยา(4) ลำปาง(5) ลำพูน(8) แม่ฮ่องสอน(7) อุตรดิตถ์(1)
กลาง	กาญจนบุรี(13) อุทัยธานี(8) สุพรรณบุรี(3) สระบุรี(5) ลพบุรี(11) นครสวรรค์(7) ชัยนาท(3) กรุงเทพมหานคร(1) สมุทรสงคราม(1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ(8) ชัยภูมิ(7) ขอนแก่น(8) นครราชสีมา(15) นครพนม(4) บุรีรัมย์(14) สุรินทร์(9) สกลนคร(13) เลย(8) หนองคาย(2) บึงกาฬ(2) อุบลราชธานี(9) อุดรธานี(13) หนองบัวลำภู(7) กาฬสินธุ์(12) มหาสารคาม(1) ร้อยเอ็ด(6) ยโสธร(1) อำนาจเจริญ(2) มุกดาหาร(7)
ภาคตะวันออก	ชลบุรี(7) จันทบุรี(9) ระยอง(7) ตราด(3) ฉะเชิงเทรา(6) สระแก้ว(9) นครนายก(2) ปราจีนบุรี(7)
ภาคใต้	ประจวบคีรีขันธ์(6) กระบี่(3) นครศรีธรรมราช(23) ราชบุรี(10) ชุมพร(8) เพชรบุรี(8) สุราษฎร์ธานี(19) สงขลา(8) พังงา(8) ตรัง(9) ภูเก็ต(1) ยะลา(1) ระนอง(2) สตูล(2) พัทลุง(1)
รวม	67 จังหวัด (444 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	ผลการปฏิบัติการ
1. เชียงใหม่	2	1. การกักการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) บริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน หลังการปฏิบัติการจากการติดตามปริมาณค่าฝุ่นละอองในเขตพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีจำนวนจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับลมเป็นลมฝ่ายตะวันตกที่พัดนำฝุ่นละอองจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
2. แพร่	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากช่วงเช้าอากาศมีเสถียรภาพ ช่วงบ่ายจัดเก็บบริเวณพื้นที่ภาคพื้นและเจ้าหน้าที่เดินทางกลับที่ตั้ง
3. กาญจนบุรี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากอากาศค่อนข้างมีเสถียรภาพส่งผลให้เมฆคิวมูลัสในพื้นที่เป้าหมายไม่พัฒนาตัว
4. อุบลราชธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆคิวมูลัสในบริเวณพื้นที่เป้าหมายก่อตัวได้เล็กน้อยและสลายตัวค่อนข้างเร็ว
5. จันทบุรี	1	ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง มีฝนตกบริเวณ จ.จันทบุรี (ไปน้าร้อน)

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	ผลการปฏิบัติการ
6. สงขลา	2	ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง มีฝนตกบริเวณ จ.สงขลา (เทพา สะบ้าย้อย สะเดา คลองหอยโข่ง นาทวี จะนะ นาทมอม หาดใหญ่ เมืองสงขลา) จ.สตูล (ควนโดน ควน กาหลง) จ.พัทลุง (ป่าบอน ตะโหมด) และ จ.ตรัง (ปะเหลียน)
รวม	5	

สรุปผลการปฏิบัติการภารกิจดับไฟป่า ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	ผลการปฏิบัติการ
- ศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคใต้	-	-

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้

- การปฏิบัติการฝนหลวง 74 วัน จำนวน 558 เที่ยวบิน (865.10 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำ 277.225 ตัน และปริมาณการใช้น้ำ 253,800 ลิตร พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 194 นัด รายงานพื้นที่ฝนตก รวม 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยาแพร่ น่าน เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กระบี่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา

- การปฏิบัติการภารกิจดับไฟป่า จำนวน 10 วัน จำนวน 132 เที่ยวบิน (24:35 ชั่วโมงบิน) ปริมาณน้ำ 72,500 ลิตร พื้นที่ปฏิบัติการ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกระบี่

6. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบโกล-บริโกล พืชไร่ และอหุภักย์ ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 จำนวน 2,289 เครื่อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ ประจำวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2567 งานขาดแคลนน้ำ จำนวน 5 เครื่อง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

7. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย. 67)

7.1 อุทกภัย ช่วงภัย 25 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง เกษตรกร 7 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) ไร่ กระชัง 256 ตร.ม. สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 7 ราย พื้นที่(บ่อปลาบ่อกุ้ง) 2 ไร่ กระชัง 256 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 103,572 บาท

ด้านพืช และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.2 วาตภัย ช่วงภัย 13 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี บึงกาฬ เลย และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 1,345 ราย รวมพื้นที่ 16,286 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8,955 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,355 ไร่ และไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 976 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 126 ราย รวมพื้นที่ 1,037 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 702 ไร่ พืชไร่ และพืชผัก 327 ไร่ และ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 8 ไร่ คิดเป็นเงิน 1.62 บาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 10 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.94 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 54 ไร่ วงเงิน 114,158 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.05 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7.3 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 22 – 28 ธ.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 20,928 ราย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 28,983 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,002 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,246 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 18,735 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,179 ราย พื้นที่ 2,142 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 366 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 205 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 1,571 ไร่ คิดเป็นเงิน 7.25 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 939 ราย (คิดเป็นร้อยละ 79.64 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 1,747 ไร่ วงเงิน 6.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 86.80 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา เกษตรกร 716 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ (บ่อปลา) 278 ไร่ กระชัง 13,283 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 716 ราย พื้นที่ (บ่อปลา) 278 ไร่ กระชัง 13,283 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 6.20 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 467 ราย (คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 157 ไร่ กระชัง 3,019 ตร.ม. วงเงิน 2.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 33.96 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 34,889 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 577,782 ตัว แบ่งเป็น โค 54,435 ตัว กระบือ 2,217 ตัว สุกร 5,574 ตัว แพะ/แกะ 30,560 ตัว สัตว์ปีก 484,996 ตัว แปลงหญ้า 1,183 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 219 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 1,389 ตัว แบ่งเป็น โค 245 ตัว กระบือ 6 ตัว สุกร 18 ตัว แพะ/แกะ 107 ตัว และสัตว์ปีก 1,013 ตัว คิดเป็นเงิน 8.70 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.4 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 1 พ.ย. 66 – 30 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง พัทลุง ปัตตานี นครศรีธรรมราช ยะลา ระนอง นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 44,131 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 67,238 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 30,355 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 10,649 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 26,234 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 3,001 ราย พื้นที่ 14,992 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10,577 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,910 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 1,505 ไร่ คิดเป็นเงิน 26.02 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,396 ราย (คิดเป็นร้อยละ 46.52 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 8,946 ไร่ วงเงิน 16.12 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 61.96 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 7,342 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 20,068 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 12,707 ไร่ บ่อกุ้ง 7,361 ไร่ กระชัง 20,319 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,342 ราย พื้นที่ (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 20,068 ไร่ กระชัง 20,319 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 153.58 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 235 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 261 ไร่ กระชัง 1,245 ตร.ม. วงเงิน 2.12 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย เกษตรกร 371 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 6,063 ตัว แบ่งเป็น โค 200 ตัว กระบือ 29 ตัว สุกร 38 ตัว แพะ/แกะ 236 ตัว และสัตว์ปีก 5,560 ตัว คิดเป็นเงิน 7.77 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.5 อุทกภัย ช่วงภัย 10 ก.ย. – 6 พ.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรัง สระแก้ว นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา เกษตรกร 155,188 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,310,189 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 990,971 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 316,499 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 2,718 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,965.58 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 80,267 ราย (คิดเป็นร้อยละ 51.72 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 611,179 ไร่ วงเงิน 891.19 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 45.34 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ตาก พิจิตร พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ยะลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 8,424 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 10,365 ไร่ กระชัง 2,316 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 53.96 ล้านบาท

ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 5,230 ราย (คิดเป็นร้อยละ 62.08 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 6,255 ไร่ กระชัง 413 ตร.ม. วงเงิน 31.90 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 59.11 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอนแพร่ เพชรบูรณ์ ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกร 466 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 7,250 ตัว แบ่งเป็น โค 26 ตัว กระบือ 3 ตัว สุกร 12 ตัว และ สัตว์ปีก 7,209 ตัว แปลงหญ้า 1,354 ไร่ คิดเป็นเงิน 3.85 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.6 อุทกภัย ช่วงภัย 6 มิ.ย. – 29 ส.ค. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก น่าน พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ นครพนม หนองคาย สกลนคร อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตรัง ระนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 18,011 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 143,232 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 136,346 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,220 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 666 ไร่ คิดเป็นเงิน 197.73 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กระบี่ ระนอง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 535 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) 323 ไร่ กระชัง 881 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 1.85 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

7.7 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย 22 พ.ค. 66 – 18 ก.ย. 66

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 32,065 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 362,425 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 242,976 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 119,357 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 93 ไร่ คิดเป็นเงิน 562.29 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 12,993 ราย (คิดเป็นร้อยละ 40.52 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 175,574 ไร่ วงเงิน 299.00 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 53.18 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 67)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ สุรินทร์ และ กรุงเทพมหานคร) จำนวน 11 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 24 ไร่	- ให้ความรู้ระดับน้ำในนาข้าว แบบเปียกสลับแห้ง เมื่อตรวจพบ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยหรือตัวอ่อน เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง
	2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน พังงา และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 51 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่	- ให้ใช้พันธุ์ต้านทานโดยปลูกสลับกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้น
	3. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (เพชรบูรณ์ แพร่ ชัยนาท กรุงเทพมหานคร จันทบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 152 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 17 ไร่	- เมื่อพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก
	4. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร และร้อยเอ็ด) จำนวน 7 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร
	5. โรคใบจุดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สกลนคร และสงขลา) จำนวน 35 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้กำจัดวัชพืชก่อนหว่านข้าวเพื่อทำลายพืชอาศัย ไม่ควร ปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักดำ
	6. หนอนทอใบข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (มหาสารคาม) จำนวน 120 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 120 ไร่	- ให้เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดิน เพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
มะพร้าว	1. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 19 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ให้เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดิน เพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
	2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 29 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 16,029 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1,056 ไร่	- ให้กำจัดวัชพืชก่อนหว่านข้าวเพื่อทำลายพืชอาศัย ไม่ควร ปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักดำ - ให้เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดิน เพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง - ให้ปรับปรุงดินโดยการไถกลบใช้ฟางคลุมเมล็ดพันธุ์ ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราใส่ปุ๋ยโปแตสเซียม-คลอไรด์ อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 14,541 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 760 ไร่	เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว ปลอ้ยแตนเบียน เตตระสติกส์ (โดยปลอ้ยทุก 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน) - ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักด้
	4. ด้วงวง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,481 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 135 ไร่	
	5. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,751 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	
	6. โรสีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ชุมพร ตรัง และพัทลุง) จำนวน 496 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	
ปาล์ม น้ำมัน	1. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,709 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 35 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักด้ และระยะตัวหนอน - หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณ โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน - พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณ ที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - ตัดใบย่อยที่มีหนอนหน้าแมว หรือเก็บดักด้ตามใบ และ ซอกโคนมาทำลาย พ่นแบคทีเรีย Bt อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นสารฆ่าแมลงบริเวณผิวใบ เฉลี่ย 20 ตัวต่อทางใบ - ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ซอดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบ เป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง ให้ลดการใช้ ปุ๋ยไนโตรเจน - เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่าย ในช่วงฤดูฝน สัรวจลัปดาห์ละครั้ง - ก้านทางใบเน่า แนะนำแก่เกษตรกร ให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตราส่วนตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
	2. ด้วงกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 706 ไร่ การระบาดคงที่	
	3. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,457 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 14 ไร่	
	4. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,963 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	
	5. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 112 ไร่ การระบาดคงที่	
	6. หนอนหน้าแมว	พื้นที่ปลูก 3 จังหวัด (ระยอง สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 403 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 403 ไร่	
	7. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา นราธิวาส สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 94 ไร่ การระบาดคงที่	
	8. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 903 ไร่ การระบาดคงที่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	9. ก้านทางใบเน่า	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กระบี่ นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 467 ไร่ การระบาดคงที่	
ยางพารา	1. โรคราขาว 2. โรคราแป้ง 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 5. โรคหนำยางแห้ง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,839 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 160 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 100 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,004 ไร่ การระบาดลดลง 60 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,459,856 ไร่ การระบาดลดลง 360,072 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ยโสธร สกลนคร จันทบุรี ตรัง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,516 ไร่ การระบาดลดลง 1,145 ไร่	- คำนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคราขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาขนาดกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรังค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือ จนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบกรีด การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง) จำนวน 667 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 16 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป่นต่อเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรด ทำลายนอกแปลง
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (fall amylworm)	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี จันทบุรี สระแก้ว ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 203 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา) จำนวน 45 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ปล่อยแมลงหางหนีบอัตรา 500 ตัวต่อไร่
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. ไรแดงมันสำปะหลัง 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 157 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 15,208 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8,781 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี และชลบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 29 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี ชัยนาท สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 220,371 ไร่ การระบาดลดลง 5,068 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่างด้วย 3 วิธี - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการ ขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมี การระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรกรองแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยยาฆ่าเชื้อรา หรือฟอสฟิออร์-อะลูมิเนียม - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. โรคพุ่มแจ้	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี ชลบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 317 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 50 ไร่	
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 7 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 100 ไร่ การระบาดลดลง 24 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 31 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ขอนแก่น) จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบอ่อน และใบแก่ - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. ไรแดง 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสาหร่าย 8. เพลี้ยหอยเกล็ด 9. เพลี้ยจักจั่นฝอย 10. โรคราดำ 11. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,269 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 653 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 398 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 823 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,137 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 248 ไร่ การระบาดลดลง 21 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 558 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 343 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 373 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 152 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 165 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 22 ไร่	- หากพบเพลี้ยไฟ ไรแดงแอฟริกาจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้งหากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง - โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบติดหรือใบไหม้ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นนำไป - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว - ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง - ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง กำจัดวัชพืชในแปลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกลดความชื้นสะสม เมื่อพบคราบราสีดำพ่นด้วยน้ำเปล่า - กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อเป็นการลดความชื้นสะสม หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง หรือเอนโดสเฟอเรียบริเวณที่เป็นโรคออก และใช้สารคอปเปอร์-ออกไซด์คลอไรด์ ผสมน้ำทาบริเวณแผลที่ตัด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนซอนใบ 4. โรคนิ่ว 5. โรคน้ำแฉะ 6. โรคนิ่วสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง และชุมพร) จำนวน 208 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 305 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 148 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 56 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 86 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส) จำนวน 254 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- หมั่นทำความสะอาดแปลงปลูก และทำลายส่วนที่เป็นโรค เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบหรือส่วนที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดของโรคให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอน จะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางวัน - กำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน
ลำไย	1. โรคพุ่มไม้กวาด 2. โรคราดำ 3. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 98 ไร่ การระบาดลดลง 15 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา อุบลราชธานี และจันทบุรี) จำนวน 285 ไร่ การระบาดลดลง 34 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสมุทรสาคร) จำนวน 18 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจแปลงหากพบกิ่งที่เป็นโรคให้ตัดกิ่งที่เป็นโรค นำมาเผาทำลายนอกแปลง ป้องกันแมลงพาหะจำพวกปากดูด พักเพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล โดยใช้สารเคมี ได้แก่ คาร์โบซัลเฟน อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือไอโซพ्रो-คาร์บอน อัตรา 40 กรัม

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มี.ค. 67)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 19 มีนาคม 2567 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 14 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 126 จุด ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครนายก อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา เลย มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ อุดรธานี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้