



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 (เวลา 08.00 น.)

1. สภาพอากาศ


1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 06.00 น.

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทยตอนบน และอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจาก ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและ พื้นที่ลุ่มไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มี ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณ ที่มี ฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ทกซูรี” บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้ (26 ก.ค. 66) หลังจากนั้น จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 27- 28 ก.ค. 66 ขอให้ผู้ที่เดินทางไปที่ดังกล่าว โปรดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 25 ก.ค. 66 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 26 ก.ค. 66



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	สกลนคร	55.2	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	พิจิตร	46.8	ฝนตกหนัก
3	อ.คลองใหญ่	ตราด	44.1	ฝนตกหนัก
4	อ.สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	42.6	ฝนตกหนัก
5	อ.เมือง	ลพบุรี	37.5	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 66)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 38,476 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,536 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 28) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (42,864 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56) น้อยกว่าปี 2565 จำนวน 4,388 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 218.75 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 108.01 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 37,861 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 35,820 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,282 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 26) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (39,276 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55) น้อยกว่าปี 2565 จำนวน 3,456 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 153.45 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 89.46 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 35,107 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	10,128	41	3,383	19	80	1,083	506	47	415	42	88	25,908	10,634	41	3,798	20	15,274
ตอน.	12	8,368	3,850	46	2,200	32	226	2,061	1,113	54	946	50	238	10,429	4,963	48	3,145	37	5,466
กลาง	3	1,419	271	19	211	16	27	419	129	31	105	27	30	1,838	400	22	316	18	1,437
ตะวันตก	2	26,605	16,607	62	3,330	25	8	164	72	44	61	40	10	26,769	16,679	62	3,391	25	10,090
ตะวันออก	6	1,515	553	37	459	32	52	1,006	459	46	403	42	58	2,520	1,012	40	862	36	1,508
ใต้	4	8,194	4,480	55	2,770	42	42	679	307	45	254	41	46	8,874	4,787	54	3,024	43	4,087
รวม	35	70,926	35,890	51	12,353	26	435	5,411	2,586	48	2,183	43	470	76,337	38,476	50	14,536	28	37,861

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 9,768 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 3,072 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 17) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 20.58 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 44.75 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,103 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,888	44	2,088	22	6.83	11.78	27.00	27.00	7,574
สิริกิตี	3,611	38	761	11	9.56	14.70	14.98	17.15	5,899
ภูมิพล+สิริกิตี	9,499	41	2,849	17	16.39	26.48	41.98	44.15	13,473
แควน้อยฯ	157	17	114	13	2.12	2.69	1.73	1.73	782
ป่าสักชลสิทธิ์	112	12	109	11	2.08	2.51	1.04	1.04	849
รวมทั้งหมด	9,768	39	3,072	17	20.58	31.68	44.75	46.92	15,103

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาตรน้ำใช้การ จำนวน 17 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (22%) อ่างฯ สิริกิตี (11%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (13%) อ่างฯ แม่มอก (19%) อ่างฯ น้ำพุ (25%) อ่างฯ จุฬารักษ์ (18%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (14%) อ่างฯ สิรินคร (21%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (11%) อ่างฯ กระเสียว (16%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (29%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (20%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (30%) อ่างฯ คลองสิียด (12%) อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (23%) อ่างฯ แก่งกะจาน (23%) และ อ่างฯ ปรานบุรี (13%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำพระสุทึง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำมูล แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 286 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 258 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.48 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.22 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 55 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.31 ม.รทก. (เมื่อวาน +14.22 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.21 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.28 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 90 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 86 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 60 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 21 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 9 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระราม 9 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 9 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 34 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 32 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลป์) 5 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 14 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 102 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 101 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 12 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 3 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 35 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 40 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 12 ลบ.ม./วินาที

อุบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 129 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 155 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		19 ก.ค. 66	20 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	22 ก.ค. 66	23 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	25 ก.ค. 66		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุนทรบุรี จ.นนทบุรี	0.25	0.26	0.27	0.29	0.25	0.24	0.24	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกมชลประทานสามเสน กทม.	0.28	0.29	0.33	0.38	0.27	0.25	0.25	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 25 ก.ค. 66	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	3.39	-9.41
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	5.74	-10.26
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	3.12	-9.08
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	4.11	-7.89
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	4.32	-8.18
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	5.75	-8.75

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 13 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิชณุโลก แพร่ ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สระแก้ว อำเภอดงหลวง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2566)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร(8) ตาก(7) น่าน(5) พะเยา(7) พิจิตร(5) พิชณุโลก(7) ลำปาง(11) ลำพูน(7) สุโขทัย(7) อุตรดิตถ์(8) เชียงราย(7) เชียงใหม่(7) เพชรบูรณ์(9) แพร่(5)
กลาง	กาญจนบุรี(10) ชัยนาท(7) นครสวรรค์(13) ลพบุรี(10) สระบุรี(7) สิงห์บุรี(2) สุพรรณบุรี(6) อุทัยธานี(8) อ่างทอง(2) สมุทรสงคราม(2)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์(2) ขอนแก่น(6) ชัยภูมิ(9) นครราชสีมา(19) บุรีรัมย์(10) มหาสารคาม(4) ยโสธร(5) ร้อยเอ็ด(9) ศรีสะเกษ(8) สกลนคร(1) สุรินทร์(7) อำนาจเจริญ(4) อุตรดิตถ์(8) อุบลราชธานี(13) เลย(7)
ตะวันออก	จันทบุรี(3) ฉะเชิงเทรา(6) ชลบุรี(6) นครนายก(3) ปราจีนบุรี(4) ระยอง(4) สระแก้ว(9)
ใต้	ชุมพร(2) นครศรีธรรมราช(5) ประจวบคีรีขันธ์(8) พัทลุง(11) ภูเก็ต(3) ราชบุรี(6) สงขลา(6) สุราษฎร์ธานี(5) เพชรบุรี(7)
รวม	55 จังหวัด (367 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	1	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.เชียงใหม่(สันกำแพง สารภี หางดง) จ.ลำพูน(บ้านธิ เมืองลำพูน แม่ทา) จ.ลำปาง(เมืองลำปาง ห้างฉัตร เมืองปาน แจ่ม) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง อ่างเก็บน้ำแม่ตึบ อ่างเก็บน้ำแม่อิง จ.ลำพูน
2. ตาก	1	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.ตาก(สามเงา)
3. พิชณุโลก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมพื้นที่เป้าหมายหนาแน่นตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายมีการพัฒนาตัวช้า
4. แพร่	4	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.แพร่(เด่นชัย วังชิ้น ลอง ร้องกวาง) จ.น่าน(น่าน้อย) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.น่าน อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง อ่างเก็บน้ำแม่ถาง อ่างเก็บน้ำแม่สาย จ.แพร่

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
5. ลพบุรี	1	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.ลพบุรี(หนองม่วง โคกเจริญ ชัยบาดาล) จ.นครสวรรค์(ตาคลี ดงพญาไฟ พายัพ) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จ.ลพบุรี
6. กาญจนบุรี	4	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยปานกลางบริเวณ จ.กาญจนบุรี(หนองปรือ เลาขวัญ) จ.สุพรรณบุรี(ด่านช้าง หนองหญ้าไซ เดิมบางนางบวช) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำ อ่างเก็บน้ำกระเสียว อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน จ.สุพรรณบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยเหียน จ.กาญจนบุรี
7. ขอนแก่น	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีพื้นที่ประสบภัยและติดตามสถานการณ์น้ำ ซึ่งมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
8. นครราชสีมา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมพื้นที่เป้าหมายตลอดทั้งวัน ประกอบกับมีฝนละอองตกบริเวณสนามบินเป็นระยะ
9. อุบลราชธานี	1	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.อุบลราชธานี (ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สิรินคร พิบูลมังสาหาร) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
10. สุรินทร์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมพื้นที่เป้าหมายตลอดทั้งวัน ประกอบกับในช่วงบ่ายมีฝนตกเป็นระยะๆ
11. สระแก้ว	2	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงบริเวณ จ.สระแก้ว (วังสมบูรณ์ คลองหาด) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จ.สระแก้ว
12. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้กลุ่มเมฆในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวได้เล็กน้อย
13. สุราษฎร์ธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสนามบินติดภารกิจ VIP
รวม	14	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (15 กุมภาพันธ์ – 24 กรกฎาคม 2566)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 24 กรกฎาคม 2566 การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 134 วัน ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 3,111 เที่ยวบิน (4,804:42 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำมัน 2,621.9 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 268 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์ จำนวน 386 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์ สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1,550 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 66 จังหวัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 66 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย สกลนคร นครพนม หนองคาย บัณฑิต อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ บึงกาฬ มุกดาหาร หนองบัวลำภู นครราชสีมา อุตรดิตถ์ มหาสารคาม กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด อุทัยธานี นครสวรรค์ สุรินทร์ จันทบุรี ตรัง ยโสธร อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก ลพบุรี ระยอง สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง พัทลุง ภูเก็ต สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุปโภค-บริโภค พืชไร่ และอุตสาหกรรม ในช่วงฤดูฝน ปี 2566 จำนวน 2,289 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2566 จำนวน 14 เครื่อง จำนวน 5 จังหวัด ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี นนทบุรี พัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 66)

5.1 อุทกภัย ช่วงภัย 6 มิ.ย. 66 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก กาฬสินธุ์ ระนอง ตรัง และจังหวัดสตูล เกษตรกร 9,527 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 6,922 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,723 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 304 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 2,895 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 22 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 76 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 72 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.16 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.2 ภัยแล้ง ช่วงภัย 27 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร เกษตรกร 15,206 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 21,679 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 120 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 767 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 20,792 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 675 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 1,394 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 83 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 72 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 1,239 ไร่ คิดเป็นเงิน 5.27 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 387 ราย (คิดเป็นร้อยละ 57.33 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 758 ไร่ วงเงิน 2.93 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 55.58 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5.3 วาตภัย ช่วงภัย 4 ก.พ. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เลย แพร่ น่าน ตาก เพชรบูรณ์ เพชรบุรี จันทบุรี หนองคาย ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี ตราด พิจิตร สระแก้ว มุกดาหาร ชุมพร กระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 7,831 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 22,060 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7,590 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 7,088 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 7,382 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,546 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 3,845 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 962 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,566 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 1,317 ไร่ คิดเป็นเงิน 9.72 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 865 ราย (คิดเป็นร้อยละ 55.95 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 1,436 ไร่ วงเงิน 4.50 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 46.28 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 66)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. แมลงสิง 2. เพลี้ยไฟ 3. โรคไหม้ข้าว 4. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สงขลา) จำนวน 3 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สุรินทร์ และอุบลราชธานี) จำนวน 42 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 39 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุรินทร์ อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา พัทลุง และสงขลา) จำนวน 280 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 180 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครสวรรค์ และสงขลา) จำนวน 51 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 51 ไร่	- แมลงสิง ให้กำจัดวัชพืชในนาข้าว คั่นนาและรอบๆ แปลง จับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมาทำลาย ตัวเต็มวัยชอบกินเนื้อเน่า นำเนื้อเน่าแขวนไว้ตามนาข้าวและจับมาทำลาย หลีกเลี้ยง การปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่ขยายพันธุ์ - เพลี้ยไฟ ให้หมั่นสำรวจ ดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ ใช้น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อพบตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุ 6-7 วัน หลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว และใช้สารฆ่าแมลงมาลาไธออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นใบข้าว - โรคไหม้ข้าว ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร - หนอนกอข้าว ให้เฝ้าต่อช่วงหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดิน เพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง ควรปลูกพืชหมุนเวียน และไม่ใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดในนาข้าว เพื่อช่วยให้ศัตรูธรรมชาติพวกแตนเบียนไข่และแตนเบียนหนอนของหนอนกอข้าว
มะพร้าว	1. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 539 ไร่ การระบาดคงที่	- ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของ หนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว และปลอ่ยแตนเบียน ไช้ทริโครแกรมมา เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ - รณรงค์ให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และ เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งแพร่พันธุ์

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. หนอนหัวดำ 3. แมลงดำหนาม 4. ดั้วงวง 5. ดั้วแรด 6. โรสซีฆาเมพร้าว	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,386 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 44 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,621 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,180 ไร่ <u>การระบาดลดลง 12 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ปัตตานี ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,205 ไร่ <u>การระบาดลดลง 21 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร ชุมพร และสงขลา) จำนวน 470 ไร่ <u>การระบาดลดลง 18 ไร่</u>	- ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ และปลอ่ยแตนเบียนเตตระสตักส์ ควบคุมด้กแดแมลงดำหนามมะพร้าว - ใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด และระยะตัวหนอน - โรสซีฆาจะเข้าทำลายอยู่ภายในซั้วผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไฟไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไฟในระยะมะพร้าวติดจันจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสซีฆาเมพร้าวเข้าทำลายใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. ดั้วกู่ลาบ 3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า 6. โรคใบจุด 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,835 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 355 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 26 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,423 ไร่ <u>การระบาดลดลง 4 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,345 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 84 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตรด กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 77 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 15 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา) จำนวน 94 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 310 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 23 ไร่</u>	- ใช้กาดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด และระยะตัวหนอน - พ่นด้วงกู่ลาบด้วยสารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC - หนอนปลอกเล็ก พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - รมรังค์ให้เกษตรกรตัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่าของปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง - แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - เฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่าย ในช่วงฤดูฝน สัรวจสัปดาห์ละครั้งตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
กาแฟ	1. หนอนเจาะกิ่ง/ลำต้น กาแฟ 2. โรคราสนิม 3. โรคใบจุดตากบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 38 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 73 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และระยอง) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง - หนอนเจาะกิ่ง/ลำต้นกาแฟ ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเฟนิโตรไธออน (fenitrothion) (ซูมิไธออน (sumithion) 50% EC) ในอัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ในระยะเวลาของช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
ยางพารา	1. โรครากขาว 2. โรคราแป้ง 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,430 ไร่ การระบาดลดลง 36 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 100 การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง ปัตตานี พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,329 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 11 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 88,033 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำวิธีป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาดูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรค - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรังค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ ร่องขวางกับลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามลงสู่ราก
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. ไรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคพุ่มแฉ้ 6. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ขอนแก่น สกลนคร ชลบุรี นครราชสีมา เพชรบุรี และจันทบุรี) จำนวน 412 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 29 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และอุบลราชธานี) จำนวน 8 ไร่ การระบาดลดลง 232 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร และอุบลราชธานี) จำนวน 18 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพชรบุรีและกาญจนบุรี) จำนวน 773 ไร่ การระบาดลดลง 9,835 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 49 ไร่ การระบาดลดลง 35 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว) จำนวน 34,687 ไร่ การระบาดลดลง 4,084 ไร่	- เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ไถและพรวนดิน ใช้ท่อนพันธุ์ ที่สะอาด เมื่อพบการระบาด ถอนต้นมันสำปะหลังและเก็บทำลาย - การควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนเพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู ปลอ่ยให้กระจายตัวแปลง ให้เจริญเติบโต และ ขยายพันธุ์ได้น้อย 10 เท่า ในทุกชั่วอายุ - เพลี้ยหอย ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยหอย ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 4 กรัม อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 4 กรัม - ไรแดง ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หากเริ่มพบการเข้าทำลาย ของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย - โรคพุ่มแฉ้ ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่ แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - โรคใบด่างมันสำปะหลัง ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี พัทลุง ยะลา และสตูล) จำนวน 252 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 40 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 88 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง เตรียมดินให้ตัดต้นและป็นต่อถ้าสับปะรด ทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากเหง้าต้นสับปะรดและซากวัชพืช
อ้อย	1. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา) จำนวน 85 ไร่ การระบาดลดลง 65 ไร่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปลอ่ยแตนเบียนไขไตรโครแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ ต่อครั้ง ปลอ่ยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของ หนอนกออ้อย ปลอ่ยแมลงหางหนีบอัตรา 500 ตัวต่อไร่ เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน ควรพ่นสารฆ่าแมลงเดลทามาทริน 3% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง ห่าง 14 วัน
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 22 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบ โคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่าย เก็บรวบรวมไปเผาทำลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์ไฮดรอกไซด์

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และ นราธิวาส) จำนวน 35 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 21 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น จันทบุรี ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 217 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 217 ไร่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบเพลสด ใบอ่อน และใบแก่ - โรคราแป้ง เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผลหมั่นตรวจดูหากพบว่าร่าแป้งเข้าทำลายให้ทำการพ่นด้วยผงกำมะถันละลายน้ำ 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทำให้การระบาดของในช่วงติดผลนั้นลดความรุนแรงลงได้ ในช่วงระยะผลอ่อน หากพบอาการของโรคราแป้งควรเลือกใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ได้แก่ บีโนมิล คาร์เบนดาซิม ไตรติมอร์ฟ ไตรฟลูโรรีน ไพราโซฟอส ไดโนแคบ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นตามอัตราคำแนะนำในฉลาก
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. ไรแดงแอฟริกา 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 304 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 59 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 317 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (พิษณุโลก จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา) จำนวน 270 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 509 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,022 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 89 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 204 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 485 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 11 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่สำหรับต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่น - ไรแดงแอฟริกา กำจัดวัชพืชในสวน เมื่อพบระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไพโรพาร์ไกต์ (pyrethrin) 30 % WP อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ (amitraz) 20 % EC อัตรา 30 มิลลิลิตร เฮกซีไทอะซอกซ์ (hexythiazox) 2% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร พ่นทุก 7-10 วัน - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบติดหรือใบไหม้ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่น นำไปทำลายนอกแปลง ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ในพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูง - โรคใบจุดสาหร่าย เมื่อเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบหรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หรือฝังดิน ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ 4. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 174 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร และ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 268 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 95 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 893 <u>การระบาดคงที่</u>	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการณ์เข้าทำลายของหนอนขอนใบอย่างสม่ำเสมอ - โรคใบจุด หมั่นสำรวจ ทำความสะอาดแปลงปลูก และกำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน ได้แก่ คอปเปอร์ออกไซด์ไฮดรอกไซด์ 85%
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี ระยอง และสมุทรสาคร) จำนวน 438 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 423 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ให้หมั่นสำรวจแปลงลำไยทุกสัปดาห์หากพบการระบาดแนะนำให้ตัดส่วนของกิ่งก้านที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ไปทำลาย หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด มาลาไทออน (Malathion) 83% W/V EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และไพรีทรอยด์ (Pyrethroids) (อัตราส่วนตามฉลาก) พ่นให้ทั่ว

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. โรคพุ่มไม้กวาด 3. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และจันทบุรี) จำนวน 205 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา และ จันทบุรี) จำนวน 908 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 422 ไร่	- โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อ ไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ - โรคราดำ ให้ป้องกันและกำจัดแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 66)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 19 กรกฎาคม 2566 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 33 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 29 จุด ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร และจังหวัดเลย ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้

7.2 โรคล้มปัสกีน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 66)

พบการระบาดของสละตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 14 กรกฎาคม 2566 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 632,519 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 19,416 ตัว สัตว์ตายสะสม 67,401 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจรอยโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,473 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พันยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พันยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 138,631 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 444,383 ราย