



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2629-9660 E-mail : disas.plan@gmail.com  
<http://www.moac.go.th>

สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

## สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด

### 1. ศัตรูข้าว

- พื้นที่ปลูกทั้งหมด 76 จังหวัด มีพื้นที่ยืนต้น 24,805,362.87 ไร่
- พื้นที่ระบาดรวม 1,730.61 ไร่ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,016.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,746.61 ไร่)
  - หนอนห่อใบข้าว พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร นครสวรรค์ พัทลุง และยะลา จำนวน 848.50 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 19.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 867.50 ไร่)
  - เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอนแก่น สุรินทร์ นครสวรรค์ และปราจีนบุรี จำนวน 86.25 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 1,060.50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,146.75 ไร่)
  - เพลี้ยไฟ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และปราจีนบุรี จำนวน 47.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 27.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 20.00 ไร่)
  - หนอนกอข้าว พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ สกลนคร และยะลา จำนวน 47.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 8.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 55.00 ไร่)
  - เพลี้ยจักจั่นสีเขียว พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
  - โรคไหม้ข้าว พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย ลำปาง สุโขทัย ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สกลนคร นครสวรรค์ ปราจีนบุรี และราชบุรี จำนวน 552.25 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 48.50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 601.25 ไร่)
  - โรคขอบใบแห้ง พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร บุรีรัมย์ และสงขลา จำนวน 49.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 1.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 48.00 ไร่)
  - โรคใบสีส้ม พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 9.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
  - โรคใบขีดสีน้ำตาล พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และอุบลราชธานี จำนวน 40.11 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่

### • ผลการดำเนินงาน

- หนอนห่อใบข้าว สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ให้เกษตรกรปลูกข้าว 2 พันธุ์ขึ้นไป โดยการปลูกสลับพันธุ์ เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการระบาด และแนะนำการใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม
- เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมการระบาด เช่น มวนเขียวดูดไข่ แมงมุมสุนัขป่า เป็นต้น และการควบคุมระดับน้ำในนาข้าว โดยการระบายน้ำออกเป็นครั้งคราวแบบเปียกสลับแห้ง และแนะนำเกษตรกรให้ใช้สารกำจัดแมลงตามสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่พบ
- เพลี้ยไฟ ใช้สารฆ่าแมลง มาลาไธออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อไร่ 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 85% WP อัตรา 20 กรัมต่อไร่ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวมีมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในระยะข้าวอายุ 10-15 วันหลังหว่าน และดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าน้ำขุ่น
- หนอนกอข้าว ให้เฝ้าต่อชงหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าว ที่อยู่ตามตอชงปลูกพืชอื่นเพื่อตัดวงจรชีวิตของหนอนกอข้าว ปลูกพืชหมุนเวียน ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ทำให้ใบข้าวงาม หนอนกอชอบวางไข่ใช้แสงไฟล่อตัวเต็มวัยและทำลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง และแนะนำการใช้สารฆ่าแมลงเมื่อพบอาการของโรค



## 2. ศัตรูมะพร้าว

- **พื้นที่ปลูกทั้งหมด** 70 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,018,584.60 ไร่
- **พื้นที่ระบาดรวม** 42,671.49 ไร่ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 368.82 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 43,040.31 ไร่)

- **หนอนหัวดำ** พื้นที่ระบาด 39 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อ่างนาจเจริญ อุตรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวาท ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จำนวน 28,528.94 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 336.78 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 28,865.72 ไร่)

- **แมลงดำหนาม** พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นครพนม อุตรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวาท ระยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จำนวน 6,341.88 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 53.48 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 6,395.36 ไร่)

- **ด้วงแรด** พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวาท ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จำนวน 6,292.21 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 17.31 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 6,309.52 ไร่)

- **ด้วงวง** พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวาท ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 710.91 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 3.50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 707.41 ไร่)

- **ไรสีขามะพร้าว** พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวาท สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร ชุมพร และสงขลา จำนวน 797.55 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 35.25 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 762.30 ไร่)

### • ผลการดำเนินงาน


- หนอนหัวดำ ปล่อยแตนเบียนบราคอน (*Bracon hebetor*) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ ปล่อยแตนเบียนไซโทโครแกรมมา (*Trichogramma sp.*) เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ และแนะนำการใช้สารเคมี อีมาเม็กติน เบนโซเอต (*emamectin benzoate*) 1.92% EC ในการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำ

- แมลงดำหนาม ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (*Asecodes hipinarum*) เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว ปล่อยแตนเบียนเตตระสติกัส (*Tetrastichus brontispae*) เพื่อควบคุมด้วงแมลงดำหนามมะพร้าว และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ

- ด้วงแรด ใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (*Metarhizium anisopliae*) ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ ในการกำจัด ด้วงแรดในระยะหนอนและดักแด้ ใช้กับดักฟีโรโมนเพื่อล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และแนะนำการใช้สารเคมีกำจัด หากพบการระบาดรุนแรง

- ด้วงวง ใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (*Metarhizium anisopliae*) เพื่อกำจัดด้วงวงในระยะหนอนและดักแด้ และใช้ตาข่ายดักจับด้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย

- ไรสีขามะพร้าว ไรสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไร ไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร




### 3. ศัตรูปาล์มน้ำมัน

- **พื้นที่ปลูกทั้งหมด** 69 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 5,440,623.46 ไร่
- **พื้นที่ระบาดรวม** 19,624.00 ไร่ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 164.15 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 19,788.15 ไร่)
  - **หนอนปลอกเล็ก** พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จำนวน 958.30 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 78.25 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 880.05 ไร่)
  - **หนอนหัวดำ** พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จันทบุรี ชลบุรี และนครศรีธรรมราช จำนวน 380.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 35.50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 415.50 ไร่)
  - **ด้วงแรด** พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,035.35 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 25.85 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,009.50 ไร่)
  - **ด้วงกุหลาบ** พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตรัง ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 403.25 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 2.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 405.25 ไร่)
  - **โรคลำต้นเน่า** พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จำนวน 11,441.81 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 73.75 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 11,595.56 ไร่)
  - **โรคทะลายเน่า** พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด สระแก้ว ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,060.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 20.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,080.00 ไร่)
  - **โรคใบจุดสาหร่าย** พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 4,131.29 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 144.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 4,275.29 ไร่)
  - **โรคใบจุด** พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 214.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 7.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 207.00 ไร่)

#### ผลการดำเนินงาน

- หนอนปลอกเล็ก ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนปลอกเล็กกัดกินมาเผาทำลายทิ้งนอกแปลง แนะนำ พันเชื้อบีที (*Bacillus thuringiensis*) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5 - 7 วัน
- หนอนหัวดำ ตัดทางใบและเก็บซากพืชที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาทันที เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ และปล่อยแตนเบียนบราคอน (*Bracon hebetor*) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ
- ด้วงแรด ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไธเซีย (*Metarhizium anisopliae*) อัตรา 800 กรัมต่อกองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะหนอนและดักแด้
- ด้วงกุหลาบ ทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ และแนะนำเกษตรกร ให้ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP หรือคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC ในการกำจัดด้วงกุหลาบ
- โรคลำต้นเน่า ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาเพื่อบำรุงต้นปาล์มน้ำมันให้แข็งแรง
- โรคทะลายเน่า ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรคนำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง และทำความสะอาดสวนกำจัดวัชพืช เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น
- โรคใบจุด กำจัดวัชพืชบริเวณรอบสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเมื่อพบการแพร่ระบาดของโรคใบจุด และแยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายทันที

- โรคราแป้งโรคราขาว ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคราแป้งโรคราขาว นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ไปยังต้นอื่น และแนะนำใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (copper oxychloride) 85% WP เมื่อพบการระบาดรุนแรง




#### 4. ศัตรูยางพารา

- พื้นที่ปลูกทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 18,615,351.68 ไร่
- พื้นที่ระบาดรวม 1,574,429.80 ไร่ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 53,103.77 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,521,326.03 ไร่)
  - โรครากขาว พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,836.95 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 250.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,086.95 ไร่)
  - โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัย นครพนม บึงกาฬ เลย หนองคาย อุดรธานี กาญจนบุรี กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสตูล จำนวน 1,564,224.10 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 53,397.77 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,510,826.33 ไร่)
  - โรคใบร่วงยางพารา พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย หนองคาย ตราด ชุมพร ตรัง พังงา ระนอง และสุราษฎร์ธานี จำนวน 2,324.25 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 44.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,368.25 ไร่)
  - โรคหน้ำยางแห้ง พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด สกลนคร ชลบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง และสุราษฎร์ธานี จำนวน 6,044.50 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่


#### • ผลการดำเนินงาน

- โรครากขาว สำรวจต้นยางพาราสม่ำเสมอ โดยเฉพาะต้นที่ปลูกในบริเวณที่เคยเป็นโรครากขาว หากพบต้นยางพารา แสดงอาการใบเหลืองผิดปกติควรขุดโคนต้นและราก หากพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคให้ขุดเผาทำลายเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคต้นยางพาราที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ควรขุดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร จำกัดบริเวณที่เป็นโรค โดยขุดระหว่างต้นที่อยู่ถัดไปจากต้นที่แสดงอาการทางใบ ในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงของแถวยางพาราที่พบโรคกับแถวถัดไปทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการลุกลามทางราก และควรขุดลอกคูทุกปี แนะนำเกษตรกรให้ใช้สารเคมีสำหรับรักษาต้นที่เป็นโรค และต้นข้างเคียงเพื่อป้องกันการเกิดโรค
- โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา และโรคใบร่วงยางพารา แนะนำใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อกำจัดและควบคุมเชื้อราสาเหตุที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนใบยางพาราที่ร่วงหล่นบริเวณพื้น โดยใช้อัตรา เชื้อสด 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 3 เดือน เช่น ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด 1 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และรำ 4 กิโลกรัม หวานหรือใช้เชื้อสดผสมน้ำหรือน้ำผสมน้ำหมักชีวภาพ 200 ลิตร ฉีดพ่น ทั้งนี้ ควรหว่านหรือฉีดพ่นให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาครอบคลุมบนใบยางพาราที่ร่วงหล่นทั่วทั้งสวน
- โรคหน้ำยางแห้ง แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดในระยะที่ต้นยางมีการผลิใบใหม่ และไม่ควรงรีดยางทุกวันหรือกรีดติดต่อกันหลายวัน เพื่อลดการเกิดโรคหน้ำยางแห้ง



## 5. ศัตรูกาแฟ

- พื้นที่ปลูกทั้งหมด 59 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 116,030.77 ไร่
- พื้นที่ระบาดรวม 376.97 ไร่ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 376.47 ไร่)
  - หนอนกาแฟสีแดง พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และตาก จำนวน 8.50 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
  - หนอนเจาะกิ่ง/หนอนเจาะลำต้น พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และตาก จำนวน 157.50 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 1.00 (สัปดาห์ที่ผ่านมา 158.50 ไร่)
    - มอดเจาะผลกาแฟ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ตาก ระนอง ชุมพร และสงขลา จำนวน 210.97 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 1.50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 209.47 ไร่)
- ผลการดำเนินงาน
  - หนอนกาแฟสีแดง และหนอนเจาะกิ่ง/หนอนเจาะลำต้น เมื่อพบการเข้าทำลายให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง และฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเพนิโตรไธออน (fenitrothion) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และนำไปพาดด้วยปรอทาสีบริเวณลำต้นกาแฟให้ทั่ว หากใช้ฉีดพ่นให้ใช้ในอัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
  - มอดเจาะผลกาแฟ สำรวจและรักษาความสะอาดแปลง ตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่ม ให้โปร่งเก็บเกี่ยวผลกาแฟให้หมดต้น และเก็บผลกาแฟ ที่ถูกมอดเจาะออกไปทำลายนอกแปลง วางกับดักและสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ จำนวน 5-10 จุดต่อไร่ และเติมสารล่อทุกๆ 2 สัปดาห์ หากพบการระบาดรุนแรง สามารถใช้สารไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ในระยะที่ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร จนถึงผลกาแฟสุก



## 6. ศัตรูมันสำปะหลัง

- **พื้นที่ปลูกทั้งหมด** 54 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 7,460,315.43 ไร่
- **พื้นที่ระบาดรวม** 848,162.17 ไร่ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 9,304.66 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 857,466.83 ไร่)

- **เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง** พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ขอนแก่น บุรีรัมย์ Mukดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร อุตรธานี จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว และกาญจนบุรี จำนวน 3,077.68 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 1,197.18 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,880.50 ไร่)

- **ไรแดง** พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สกลนคร สุรินทร์ อุตรธานี ชลบุรี และกาญจนบุรี จำนวน 40,349.26 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 3,838.45 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 36,510.81 ไร่)

- **โรคพุ่มแจ้** พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ กาฬสินธุ์ Mukดาหาร สกลนคร อุตรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี จำนวน 9,891.25 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 275.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 10,166.25 ไร่)

- **โรคโคนเน่าหัวเน่า** พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 50.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่

- **โรคใบไหม้/ใบจุดเหลี่ยมแบคทีเรีย** พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร และชัยนาท จำนวน 292.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่

- **โรคใบด่างมันสำปะหลัง** พื้นที่ระบาด 36 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม Mukดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อ่างทอง อุตรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี จำนวน 794,501.98 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 14,065.29 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 808,567.27 ไร่)

### • ผลการดำเนินงาน

- เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ไถและพรวนดิน เพื่อลดปริมาณของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังที่อยู่ในดิน และควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงช้างปีกใส และแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู และแนะนำการใช้สารฆ่าแมลงเฉพาะจุดเมื่อพบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง


- ไรแดง อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวเต่าสตีธอร์ส ตัวงักสั้น และไรตัวห้ำ หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หากเริ่มพบการเข้าทำลายของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย เพื่อลดการเพิ่มปริมาณของไรแดงในสภาพที่เหมาะสมอาจเกิดการระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งแนะนำการใช้สารฆ่าแมลงเมื่อพบอาการ

- โรคพุ่มแจ้ แนะนำใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคหรือต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรคกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อหรือเป็นที่อาศัยของแมลงพาหะนำโรคในแปลง เช่น ต้นสาบม่วง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์ จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด

- โรคใบไหม้/ใบจุดเหลี่ยมแบคทีเรีย หมั่นตรวจแปลงปลูก หากพบอาการโรคเก็บส่วนต้นและใบที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลง เมื่อพบการระบาดรุนแรง ให้ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หรือพืชตระกูลถั่ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน


- โรคใบด่างมันสำปะหลัง ปลูกมันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 และหัวยง 60 และพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง ได้แก่ อธิ 1 อธิ 2 อธิ 3 หรือพันธุ์อื่น ๆ ที่หน่วยงานวิชาการรับรอง กำจัดแมลงหีขาวยาสูบพาหะนำโรค โดยการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงหีขาวยาสูบ ได้แก่ แมลงช้างปีกใส ตัวเต่าตัวห้ำ หรือพ่นสารกำจัดแมลง imidacloprid 70% WG และเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสใบด่างในพืชอาศัยอื่นๆ

สถานการณ์การระบาดของศัตรูมันสำปะหลัง ปี 2569



## 7. ศัตรูอ้อย

- พื้นที่ปลูกทั้งหมด 45 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 4,212,213.40 ไร่
- พื้นที่ระบาดรวม 18,455.24 ไร่ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 47.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 18,408.24 ไร่)
  - หนอนกออ้อย พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา อุรธานี และชลบุรี จำนวน 1,432.25 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 46.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,386.25 ไร่)
  - โรคใบขาวอ้อย พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม และอุรธานี จำนวน 16,850.74 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 110.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 16,740.74 ไร่)
  - โรคเส้ดำ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธานี จำนวน 265.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 109.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 265.00 ไร่)
  - ดัวงหนวดยาว พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ จำนวน 16.25 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
- ผลการดำเนินงาน
  - หนอนกออ้อย แนะนำปล่อยแตนเบียนไซโตโครแกรมมา ในช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกออ้อย หรือปล่อยแมลงหางหนีบ ในช่วงที่พบหนอนกออ้อยและกลุ่มไข่ของหนอนกออ้อย และแนะนำเกษตรกรให้ใช้สารฆ่าแมลงเดลทามาเทริน (deltamethrin) ในอ้อยที่มีอายุ 1 เดือน หรืออ้อยที่แสดงอาการยอดเหี่ยว เมื่อพบการระบาดมากกว่าร้อยละ 10 ให้เลือกพ่นสารฆ่าแมลง ได้แก่ อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15% EC คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC ลูเฟนนูรอน (lufenuron) 5% EC
  - โรคใบขาวอ้อย ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค แช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนปลูก และหากพบแปลงที่เกิดการระบาดรุนแรงให้ไถทำลายตออ้อย และนำตอเก่าออกจากแปลงให้หมด เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
  - โรคเส้ดำ ใช้พันธุ์ต้านทาน เช่น พันธุ์อู่ทอง 15 พันธุ์ LK 92-11 และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือสารกำจัดโรคพืช ได้แก่ ไตรอาไดมีฟอน (triadimefon) 25% WP โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 25% EC แช่ท่อนพันธุ์ก่อนนำไปปลูกในแปลง หากพบกออ้อยเริ่มแสดงอาการเส้ดำควรตัดเส้ดำออกขณะเริ่มปรากฏอาการ ก่อนที่เชื้อหุ้มเส้ดำจะหลุดออกนำไปใส่ถุงไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังกอข้างเคียง



## 8. ศัตรูข้าวโพด

- พื้นที่ปลูกทั้งหมด 53 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,122,860.98 ไร่
- พื้นที่ระบาดรวม 53.37 ไร่ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 54.63 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 108.00 ไร่)

- หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว ยะลา และสตูล จำนวน 53.37 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 54.63 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 108.00 ไร่)

- ผลการดำเนินงาน

- หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ไถพรวนและตากดินเพื่อกำจัดดักแด้ที่อยู่ในดิน เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้ง นอกแปลง และปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียนไตรโคแกรมมา แมลงหางหนีบ มวนพิฆาต ใช้สารชีวภัณฑ์พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส สายพันธุ์ไอซาไว หรือสายพันธุ์เคอร์สตากี้



## 9. ศัตรูสับปะรด

- พื้นที่ปลูกทั้งหมด 49 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 506,420.66 ไร่
  - พื้นที่ระบาดรวม 252.35 ไร่ คงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมา
    - โรคเหี่ยว พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี จำนวน 252.35 ไร่
- พื้นที่ระบาดคงที่

### • ผลการดำเนินงาน

- โรคเหี่ยว ทำความสะอาดแปลงเพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งอาศัยของมดและเพลี้ยแป้ง ใช้เหยื่อพิษกำจัดมด หวานสารไฮดราเมทิลโนน (hydramethylnon) 0.73% GR โดยหวานพร้อมปลูก และหลังปลูก 6 เดือน และหากพบต้นเป็นโรคให้ถอนต้นสับปะรดที่แสดงอาการใส่ถุงพลาสติกไปทำลายนอกแปลง ขณะเคลื่อนย้ายต้องระมัดระวังไม่ให้เพลี้ยแป้งร่วงลงสู่พื้น



## 10. ศัตรูทุเรียน

- **พื้นที่ปลูกทั้งหมด** 77 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,378,511.79 ไร่
- **พื้นที่ระบาดรวม** 13,942.01 ไร่ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 190.31 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 14,132.32 ไร่)
  - **เพี้ยแปง** พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และยะลา จำนวน 312.25 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 14.50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 297.75 ไร่)
  - **เพี้ยไฟ** พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,423.85 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 41.35 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,382.50 ไร่)
  - **เพี้ยไก่แจ้** พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ยะลา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,211.70 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 32.38 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,179.32 ไร่)
  - **เพี้ยหอยเกล็ด** พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ปราจันบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ยะลา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 403.68 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 38.50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 365.18 ไร่)
  - **เพี้ยจ๊กจ้นฝอย** พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จันทบุรี ตราด ปราจันบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 748.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 37.50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 710.50 ไร่)
  - **หนอนเจาะผล** พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด และชุมพร จำนวน 71.25 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 2.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 69.25 ไร่)
  - **หนอนเจาะเมล็ด** พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส และยะลา จำนวน 103.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
  - **ไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกัน** พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,465.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 68.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,397.00 ไร่)
  - **มอดเจาะลำต้นทุเรียน** พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 174.75 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 10.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 164.75 ไร่)
  - **หนอนกินใบ** พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และชุมพร จำนวน 239.25 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 6.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 245.25 ไร่)
  - **โรครากเน่าโคนเน่า** พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ปราจันบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จำนวน 4,664.61 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 53.39 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 4,718.00 ไร่)
  - **โรคราดำ** พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชุมพร พังงา และยะลา จำนวน 126.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
  - **โรคราสีชมพู** พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จำนวน 187.02 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 12.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 175.02 ไร่)
  - **โรคใบติดหรือใบไหม้** พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จันทบุรี ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี 580.45 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 356.43 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 936.88 ไร่)
  - **โรคใบจุดสาหร่าย** พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,274.10 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 27.50 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,301.60 ไร่)
  - **โรคกิ่งแห้ง** พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ปราจันบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา ยะลา และสุราษฎร์ธานี จำนวน 481.10 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 6.22 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 487.32 ไร่)

- โรคแอนแทรกโนส พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จันทบุรี ชุมพร ตรัง และยะลา จำนวน 462.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 2.00 ไร่ (สปีดาร์ที่ผ่านมา 460.00 ไร่)
- โรคผลเน่าทุเรียน พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร และจันทบุรี จำนวน 14.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 1.00 ไร่ (สปีดาร์ที่ผ่านมา 13.00 ไร่)


#### • ผลการดำเนินการ

- เพลี้ยแป้ง หากพบปริมาณน้อยบนผลทุเรียนใช้แปลงปิด หรือใช้น้ำพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุด หรือการใช้น้ำผสมสารไวต์ดอยล์ เพื่อการกำจัดเพลี้ยแป้ง และป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไทออน (Malathion) 83% EC คาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP พ่นไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของต้นทุเรียน พ่นสารฆ่าแมลงไปที่โคนต้นเพื่อป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง
- เพลี้ยไฟ แนะนำใช้สารกำจัดแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) 10% SL คาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20% EC และไม่ควรใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้
- เพลี้ยไก่แจ้ อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยไก่แจ้ทั้งแมลงห้ำ ได้แก่ ตัวงเต่าลาย 3 ชนิด (ตัวงเต่าลายหยัก ตัวงเต่าสี่สั้ม ตัวงเต่าลายสมอ) แมลงช้างปีกใส และแมลงช้างปีกสีน้ำตาล หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambdacyhalothrin) 14.1/10.6% ZC ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) 25% WG อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP พ่นทุก 7 - 10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้
- เพลี้ยหอยเกล็ด แนะนำใช้สารไวต์ดอยล์ 67% EC เมื่อพบการแพร่ระบาดที่ไม่รุนแรง แต่หากพบการแพร่ระบาดที่รุนแรงให้ใช้สารไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WP ในการกำจัดแมลง
- เพลี้ยจักจั่นฝอย หากพบการแพร่ระบาดที่รุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ คาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) โฟซาโลน (Fosalon) โฟซาโลน (Fosalon) อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน
- หนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ด ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั้น ระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย ใช้สารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 2.5% EC ในแหล่งที่พบการระบาด
- ไรแดงทุเรียน กำจัดวัชพืชในสวนทุเรียน หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของไรแดงแอฟริกา หมั่นตรวจดูไรแดงแอฟริกาบนต้นและใบทุเรียนอย่างใกล้ชิด การใช้สารฆ่าไรควรใช้สลับชนิดกัน เพื่อป้องกันไรแดงแอฟริกาสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าไร เมื่อพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์โกต์ (propargite) หรืออะมิทราซ (amitraz) โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7 - 10 วัน โดยพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น
- มอดเจาะลำต้นทุเรียน หมั่นตรวจดูตามลำต้นทุเรียน หากพบกิ่งแห้งที่ถูกมอดเจาะลำต้นทำลาย ควรตัดและเผา ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง เช่น ฟิโพรนิล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นบนลำต้นหรือกิ่งที่มีมอด หรือฟิโพรนิล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 5 ลิตร ผสมกับสารป้องกันกำจัดเชื้อราทาบริเวณแผลที่เน่า
- หนอนกินใบ หมั่นสำรวจบริเวณใต้ใบ หากพบการระบาดให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต ฉีดพ่นให้ทั่ว โดยสลักกลุ่มสารเพื่อป้องกันการดื้อยา
- โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมเชื้อในดิน แปลงปลูกไม่ควรมีน้ำท่วมขัง ควรปรับปรุงดินโดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปรับสภาพดินให้มีค่าความเป็นกรดต่างของดิน และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งเป็นโรค กิ่งแห้ง และตัดซั้วผลที่ค้างอยู่ ควรนำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
- โรคราดำ กำจัดวัชพืชในแปลง เมื่อพบคราบราสีดำควรพ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดำ และสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และแนะนำการป้องกันมดที่เป็นตัวแพร่โรคระบาด โดยการใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไทออน (malathion) คาร์บาริล (carbaryl) พ่นไว้ที่กิ่งของทุเรียน หรือพ่นสารฆ่าแมลงดังกล่าวที่โคนต้น




## 11. ศัตรูเงาะ

- พื้นที่ปลูกทั้งหมด 72 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 143,480.74 ไร่
- พื้นที่ระบาดรวม 759.80 ไร่ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 8.10 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 767.90 ไร่)
  - เพลี้ยแป้ง พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง และนครศรีธรรมราช จำนวน 244.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
  - หนอนคืบกินใบ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 178.75 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 3.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 181.75 ไร่)
  - โรคนิวจุดสาหร่าย พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี นราธิวาส และเพชรบูรณ์ จำนวน 221.05 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 7.10 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 228.15 ไร่)
  - โรคราแป้ง พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 84.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 2.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 82.00 ไร่)
  - หนอนกินช่อดอก พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 32.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
- ผลการดำเนินงาน
  - เพลี้ยแป้ง ตัดแต่งกิ่งเงาะเพื่อลดปริมาณมด จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องผูกครอบโคนต้น เพื่อป้องกันมด และเพลี้ยแป้งที่อาศัยอยู่ในดินไต่ขึ้นมาบนต้นเงาะ กรณีพบเพลี้ยแป้งระบาดน้อยและพบอยู่เป็นกลุ่มตามส่วนต่างๆ ของต้นเงาะ ควรตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งนำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก หากพบระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล 85% WP สารอิมิดาโคลพริด 10% SL สารคาร์โบซัลแฟน 20% EC โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามคำแนะนำในฉลาก
  - หนอนคืบกินใบ หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สังเกตดู ใบเปสลาด ใบอ่อน และใบแก่ ในกรณีที่โคนต้นเงาะโล่งเตียนไม่มีหญ้ารก ให้เกษตรกรเฝ้าระวังกิ่งเงาะเพื่อให้ตัวหนอนคืบกินใบ ที่ร่วงลงสู่พื้นดิน จากนั้นให้จับตัวหนอนคืบกินใบไปทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก ในระยะที่ต้นเงาะแตกใบอ่อน ถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP
  - โรคนิวจุดสาหร่าย แนะนำตัดส่วนที่พบโรคเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรคและร่วงหล่นอยู่ในบริเวณแปลงไปเผาทำลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่ม เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ต่อต้น แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์ไฮดรอกไซด์ 85% WP ฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น หรือใช้ฉีดยาป้องกันเป็นระยะๆ
  - โรคราแป้ง เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผลหมั่นตรวจดูหากพบว่าราแป้งเข้าทำลายให้ทำการพ่นด้วยผงกำมะถันละลายน้ำ เป็นการกำจัดปริมาณเชื้อโรค ทำให้การระบาดในช่วงติดผลนั้นลดความรุนแรงลงได้ ในช่วงระยะผลอ่อน หากพบอาการเลือกใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ได้แก่ บีโนมิล (Benomyl) 50%WP คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) 50% SC ไตรดีมอร์ฟ (Tridemorph) 75% EC ไตรฟอรีน (Triforine) 19% EC ไพราโซฟอส (Pyrazophos) 25.4% EC ไดโนแคป (Dinocap) 25% WP โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง พ่นตามอัตราคำแนะนำในฉลาก



## 12. ศัตรูแมลงศัตรู

- **พื้นที่ปลูกทั้งหมด** 68 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 305,230.78 ไร่
- **พื้นที่ระบาดรวม** 2,197.00 ไร่ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 12.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,209.00 ไร่)
  - **โรคใบจุด** พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร และพังงา จำนวน 251.75 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 2.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 249.75 ไร่)
    - **โรคใบจุดสาหร่าย** พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส ตรัง และพังงา จำนวน 541.75 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 19.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 560.75 ไร่)
    - **เพลี้ยไฟ** พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง ระยอง ระนอง และพังงา จำนวน 364.25 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 4.25 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 360.00 ไร่)
    - **หนอนกินใบ** พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง ยะลา และพังงา จำนวน 633.25 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 2.75 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 630.50 ไร่)
    - **หนอนขอนใบ** พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชุมพร และระยอง จำนวน 337.00 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 3.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 340.00 ไร่)
    - **โรคแอนแทรกโนส** พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร และนครศรีธรรมราช จำนวน 41.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 1.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 40.00 ไร่)
    - **โรคใบแห้งและขอบใบแห้ง** พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และชุมพร จำนวน 28.00 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
- **ผลการดำเนินงาน**
  - **โรคใบจุด** หมั่นสำรวจและทำความสะอาดแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ และกำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรค ฟ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช ในช่วงที่มัจศัตรูตกใบอ่อน ได้แก่ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (Copper Oxychloride) 85% WP คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) 50% WP แมนโคเซบ (Mancozeb) 80% WP โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร ฟ่นตามคำแนะนำในฉลาก
  - **โรคใบจุดสาหร่าย** หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรค นำไปทำลาย หรือฝังดินนอกแปลง เพื่อลดปริมาณและไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อสาเหตุโรค ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม ไม่ให้ต้นมีทรงพุ่มแน่นทึบ เพื่อให้มัจศัตรูได้รับแสงแดด และอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค หากโรครยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (copper oxychloride) 85% WP
  - **เพลี้ยไฟ** ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมัจศัตรู โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งขณะที่มัจศัตรูอยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน โดยการฟ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง คือ ระยะก่อนดอกบาน 7 วัน ขณะดอกบาน และหลังบานแล้ว 7 วัน หากเป็นการระบาดนอกฤดูการออกดอกติดผล ควรฟ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  - **หนอนกินใบ** หมั่นสำรวจใบอ่อนมัจศัตรูอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนกัดกินทำลายใบอ่อนมัจศัตรูในเวลากลางวัน และทิ้งร่องรอยการทำลายให้เห็น หากสำรวจพบใบอ่อนมัจศัตรู ถูกทำลายเกินร้อยละ 20 ให้พ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน ระยะเริ่มแตกใบอ่อนพ่นซ้ำเมื่อจำเป็น เพื่อช่วยลดการฟ่นสารกำจัดแมลง และแนะนำให้เกษตรกรกรอกหญ้า หรือฟางบริเวณโคนต้น เพื่อล่อหนอนให้มาซ่อนตัวและจับทำลาย
  - **หนอนขอนใบ** หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนขอนใบอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สังเกตดูที่ใต้ใบมัจศัตรู จะพบรอยทางยาวเป็นเส้นสีขาว เนื่องจากการทำลายของหนอนขอนใบ หากพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายประมาณ 30% ของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่นห่างกัน 10 วัน และงดพ่นก่อนการเก็บเกี่ยว 7 วัน



### 13. ศัตรูลำไย

- **พื้นที่ปลูกทั้งหมด** 77 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,209,941.88 ไร่
- **พื้นที่ระบาดรวม** 720.50 ไร่ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 5.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 715.50 ไร่)
  - **เพลี้ยแป้ง** พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร จำนวน 99.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 2.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 97.00 ไร่)
  - **หนอนคืบกินใบ** พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 27.25 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
  - **ไรกำมะหยี่** พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจันทบุรี จำนวน 30.25 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
  - **หนอนม้วนใบ** พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และเชียงใหม่ จำนวน 43.50 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
  - **มวนลำไย** พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจันทบุรี จำนวน 10.75 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
  - **โรคพุ่มไม้กวาด** พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และสระแก้ว จำนวน 222.75 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่
  - **โรคราดำ** พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และสระแก้ว จำนวน 287.00 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 3.00 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 284.00 ไร่)

#### • ผลการดำเนินงาน

- **เพลี้ยแป้ง** หมั่นสำรวจแปลงทุกสัปดาห์ หากพบการระบาดแนะนำให้ตัดส่วนของกิ่งก้านที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ไปเผาทำลายเสีย หากพบว่าเพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดมาลาไทออน (Malathion) 83% W/V EC ไพริทรอยด์ (Pyrethroids) โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง พ่นให้ทั่ว 2 - 3 ครั้งห่างกัน 10 วัน

- **หนอนคืบกินใบ** หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สังเกตดูใบเพสลาด ใบอ่อน และใบแก่ เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ เก็บรวบรวมดักแต่ไปทำลาย เช่น ผึ้ง หรือเผาไฟ กำจัดวัชพืชโดยรอบแปลงเพื่อไม่ให้เป็นที่หลบอาศัยของผีเสื้อ ในระยะที่ลำไยแตกใบอ่อน พบระบาดมากกว่า 20% ของยอดสำรวจ ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด คาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP แลมบ์ดาไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 2.5% EC บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus thuringiensis) เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามคำแนะนำในฉลาก ควรใช้สารเคมีฆ่าแมลงสลับกลุ่มกันไป

- **ไรกำมะหยี่** หากพบการระบาดรุนแรงจนไม่สามารถตัดแต่งกิ่งที่ถูกทำลายลงได้หมด ให้ตัดแต่งทรงพุ่มต้นลำไยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้พ่นด้วยสารฆ่าไรโทรพาไกด์ 30% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือกำมะถันผง 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอะมิทราซ 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และให้พ่นซ้ำ เมื่อต้นลำไยแทงยอดใหม่หลีกเลี่ยงการพ่นสารฆ่าไรในช่วงที่มีแดดจัด เพราะอาจทำให้ใบอ่อนไหม้ได้

- **หนอนม้วนใบ** รวบรวมยอดอ่อน หรือใบอ่อนที่มีรอยทำลายของหนอน เผาทำลาย เก็บดักด้วนำไปทำลาย หากมีการระบาดรุนแรง ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

- **มวนลำไย** ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ให้จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ ทำลาย มวนเริ่มจับกลุ่มและผสมพันธุ์อยู่ต้นใดต้นหนึ่งของลำไย ให้เขย่ากิ่งในเวลาเช้ามีดและทำลาย การใช้สารฆ่าแมลงพ่นก่อนลำไยออกดอก ได้แก่ carbaryl (85% WP) อัตรา 45-60 กรัมหรือ lambda-cyhalothrin (2.5% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

- **โรคพุ่มไม้กวาด** หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง คัดเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่ไม่เป็นโรคไปปลูก ป้องกันแมลงพาหะจำพวกปากดูดพวกเพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล โดยใช้สารเคมี ได้แก่ คาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20% EC ไอโซโปรคาร์บ (Isoprocarb) 50% WP โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามคำแนะนำในฉลาก

- **โรคราดำ** ป้องกันและกำจัดแมลงพาหะปากดูดเช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น โดยพ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ (Copper Oxychloride) 85% WP เบตาไซฟลูทริน (Betacyfluthrin) 2.5 % EC โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร หรือตามที่ฉลากกำหนด

