



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : disas_moac@hotmail.com
[http:// www.moac.go.th](http://www.moac.go.th)

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 (เวลา 08.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 06.00 น.

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมะละกา ในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน ประเทศเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรง ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับฝนละอองในระยะนี้ ประเทศไทยมีการสะสมฝนละออง/หมอกคว้นน้อย เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงและยังคงมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. 65 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 5 ธ.ค. 65



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	110.5	ฝนตกหนักมาก
2	อ.เมือง	พัทลุง	107.2	ฝนตกหนักมาก
3	อ.ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	104.0	ฝนตกหนักมาก
4	อ.เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี	88.2	ฝนตกหนัก
5	อ.เมือง	นครศรีธรรมราช	73.8	ฝนตกหนัก

ไม่มีฝน (0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกหนักมาก (>90 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง (ช่วงภัยเดือน ส.ค. 65 - ปัจจุบัน)

เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาวตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง และพายุดีเปรสชัน “โนรู” ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ประกอบกับฝนที่ตกสะสมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย (ณ วันที่ 4 ธ.ค.65) รวมทั้งสิ้น 68 จังหวัด ดังนี้ (1) จังหวัดที่เข้าสู่ภาวะปกติ 66 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก ลำพูน ลำปาง ตาก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ หนองคาย หนองบัวลำภู นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุตรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเทพฯ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต ตรัง ยะลา พัทลุง นราธิวาส สงขลา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล และ (2) จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี

ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 65)

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 65 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตากแพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุธรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ตรวดี ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครนายก นครปฐม กาญจนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี ยะลา พัทลุง สตูล สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกรได้รับผลกระทบ 674,583 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 5,678,420 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,766,623 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,818,477 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 93,320 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 451,317 ราย พื้นที่ 4,083,660 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,737,021 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,321,409 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 25,230 ไร่ คิดเป็นเงิน 6,386.13 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 5,176 ราย พื้นที่ 23,587 ไร่ วงเงิน 42.83 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 53 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา ลำปาง ลำพูน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุธรธานี หนองคาย มหาสารคาม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ตรวดี ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก นครปฐม ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ราชบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกรได้รับผลกระทบ 31,709 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 51,263 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 39,823 ไร่ บ่อกุ้ง 11,440 ไร่ กระชัง 51,978 ตรม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 17,654 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย 26,496 ไร่ กระชัง 17,053 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 176.31 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2,838 ราย พื้นที่ 3,525 ไร่ กระชัง 5,249 ตร.ม. วงเงิน 19.64 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 34 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย บุรีรัมย์ ยโสธร หนองคาย ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง กาญจนบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครนายก นนทบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 92,990 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 8,644,672 ตัว แบ่งเป็น โค 238,341 ตัว กระบือ 58,634 ตัว สุกร 60,963 ตัว แพะ/แกะ 29,470 ตัว สัตว์ปีก 8,257,264 ตัว แปลงหญ้า 4,934 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 530 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 190,884 ตัว แปลงหญ้า 364 ไร่ คิดเป็นเงิน 3.85 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 45 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 178,042 ตัว คิดเป็นเงิน 0.35 ล้านบาท

การให้ความช่วยเหลือ

1. **กรมชลประทาน** ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 779 เครื่อง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 554 เครื่อง และเครื่องจักรอื่นๆ 75 เครื่อง
2. **กรมปศุสัตว์** ดำเนินการอพยพสัตว์ 2,343,374 ตัว (ได้ย้ายสัตว์กลับหมดแล้ว) แจกจ่ายหญ้าพระราชทาน 1,651.64 ตัน อาหาร TMR 6.50 ตัน ชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 41,388 ชุด รักษาสัตว์ 5,943 ตัว และสนับสนุนถุงยังชีพสัตว์ 4,614 ชุด
3. **กรมประมง** สนับสนุนเรือตรวจการ 79 ลำ รถยนต์ 77 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ 408 นาย
4. **กรมพัฒนาที่ดิน** สนับสนุนสารเร่งซูเปอร์ พด.6 จำนวน 268,910 ลิตร
5. **กรมส่งเสริมการเกษตร** สนับสนุนหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 2,345 ขวด เชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 4,135 กิโลกรัม นำไปใช้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 412,440 ไร่

3. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 65)

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 63,730 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 39,774 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (59,360 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) มากกว่าปี 2564 จำนวน 4,370 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 97.39 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 102.44 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,707 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 58,800 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 35,263 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 (54,611 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77) มากกว่าปี 2564 จำนวน 4,189 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 68.96 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 76.95 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,227 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	20,805	84	14,060	78	80	1,082	1,032	95	932	94	88	25,907	21,837	84	14,992	79	4,103
ตอน.	12	8,368	7,638	91	5,987	89	226	2,061	1,860	90	1,691	89	238	10,429	9,498	91	7,678	89	970
กลาง	3	1,419	1,416	100	1,356	100	27	419	382	91	357	91	30	1,838	1,798	98	1,713	98	49
ตะวันตก	2	26,605	22,058	83	8,781	66	8	164	164	100	153	100	10	26,769	22,222	83	8,934	66	4,546
ตะวันออก	6	1,515	1,457	96	1,362	96	52	1,006	1,010	100	954	100	58	2,520	2,467	98	2,316	98	73
ใต้	4	8,194	5,426	66	3,716	57	42	679	482	71	425	68	46	8,874	5,908	67	4,140	58	2,965
รวม	35	70,926	58,800	83	35,263	74	435	5,410	4,930	91	4,511	90	470	76,336	63,730	83	39,774	76	12,707

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี๊ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 20,841 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,145 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 23.48 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 30.26 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 4,039 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	12,165	90	8,365	87	13.69	10.89	13.00	13.00	1,297
สิริกิตี๊	6,773	71	3,923	59	3.94	3.89	12.04	12.00	2,737
ภูมิพล+สิริกิตี๊	18,938	82	12,288	75	17.63	14.78	25.04	25.00	4,034
แควน้อยฯ	934	99	891	99	2.71	2.23	2.59	2.59	5
ป่าสักชลสิทธิ์	970	101	967	101	3.14	3.98	2.62	1.76	-
รวมทั้งหมด	20,841	84	14,145	78	23.48	21.00	30.26	29.35	4,039

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป ของความจุอ่างฯ จำนวน 27 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (90%) อ่างฯ แม่งัดสมบูรณ์ชล (104%) อ่างฯ แม่กวอดมธรา (97%) อ่างฯ กี่วลม (97%) อ่างฯ กี่วคหมา (114%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (99%) อ่างฯ แม่เม็ก (98%) อ่างฯ ห้วยหลวง (89%) อ่างฯ จุฬารณณ์ (95%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (98%) อ่างฯ ลำปาว (89%) อ่างฯ ลำตะคอง (112%) อ่างฯ ลำพระเพลิง (93%) อ่างฯ มูลบ่น (96%) อ่างฯ ลำแซะ (94%) อ่างฯ ลำน้ำรอง (99%) อ่างฯ สิรินคร (89%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (101%) อ่างฯ ทับเสลา (95%) อ่างฯ กระเสียว (98%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (90%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (98%) อ่างฯ คลองสิียด (91%) อ่างฯ บางพระ (100%) อ่างฯ หนองปลาไหล (112%) อ่างฯ ประแสร์ (95%) และ อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (94%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำพระสทิธิ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 637 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 614 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.97 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 6.73 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 502 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 511 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.50 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.50 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +8.33 ม.รทก. (เมื่อวาน +8.38 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 179 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 180 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 150 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 29 ลบ.ม. /วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 31 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 51 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 79 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 65 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศัลป์) 9 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 47 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 119 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 124 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุม (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุม) รวม 20 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 20 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 45 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 34 ลบ.ม./วินาที

อบางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 905 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 975 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		28 พ.ย. 65	29 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	1 ธ.ค. 65	2 ธ.ค. 65	3 ธ.ค. 65	4 ธ.ค. 65		
เจ้าพระยา	ปากคลองลำแฉ จ.ปทุมธานี	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปา เกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.18	0.17	0.19	0.16	0.16	0.18	0.18	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตร ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนากกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.19	0.18	0.19	0.17	0.17	0.18	0.18	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

3.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 3 ธ.ค. 65	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.98	-10.82
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	5.52	-10.48
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	2.48	-9.72
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	2.17	-9.83
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.38	-10.12
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	3.48	-11.02

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


4. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2565/66

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 (วันที่ 1 พ.ย.65 ถึง 30 เม.ย.66) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 43,740 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 27,685 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 3,717 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 14 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใช้น้ำไปแล้ว 30.26 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 697 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 8 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/66 (1 พ.ย.65 - 30 เม.ย.66)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,535	8,270	16,330	550	27,685	3,717	14
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	2,020	5,795	135	9,100	697	8



5. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

ทั้งประเทศ จำนวน 16.30 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13.55 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.75 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 9.23 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.51 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.72 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ทั้งประเทศ จำนวน 2.33 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2.07 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.26 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของแผน

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 1.62 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1.46 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.16 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.55 ของแผน

หน่วย : ล้านไร่

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2565/66			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2565/66					
		ข้าวนอกเขต 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวนอกเขต 2	% ข้าวนอกเขต 2	พืชไร่ พืชผัก	% พืชไร่ พืชผัก	รวม	% รวม
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	10.42	0.64	11.06	1.74	16.70	0.13	20.31	1.87	16.91
	นอกเขตชลประทาน	3.13	2.11	5.24	0.33	10.54	0.13	6.16	0.46	8.78
	รวม	13.55	2.75	16.30	2.07	15.28	0.26	9.45	2.33	14.29
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.64	0.10	6.74	1.16	17.47	0.09	90.00	1.25	18.55
	นอกเขตชลประทาน	1.87	0.62	2.49	0.30	16.04	0.07	11.29	0.37	14.86
	รวม	8.51	0.72	9.23	1.46	17.16	0.16	22.22	1.62	17.55

6. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 สิงหาคม 2565 และได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจัดเตรียมเครื่องบินสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 ชุด ณ สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ และเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างกักเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ในเกณฑ์น้อย รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

7. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบล-บุรี-โคก พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 จำนวน 2,079 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จำนวน 211 เครื่อง โดยแบ่งแยกดังนี้

1. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 87 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด
2. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด
3. ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด
4. ช่วยเหลืออุทกภัย จำนวน 75 เครื่อง ในพื้นที่ 2 จังหวัด

- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

8. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 65)

8.1 วาดภัย ช่วงภัย ม.ค. - ก.ย.65

ด้านพืช พบความเสียหาย 30 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ลำปาง ลำพูน น่าน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พะเยา พิจิตรแพร่ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครราชสีมา ปทุมธานี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง จันทบุรี สระแก้ว สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 3,727 ราย พื้นที่ 8,716 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 6,366 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 2,350 ไร่ คิดเป็นเงิน 22.12 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,081 ราย (คิดเป็นร้อยละ 82.67 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 6,837 ไร่ วงเงิน 18.02 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81.46 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8.2 อุทกภัย ช่วงภัย พ.ค. 65 – 31 ก.ค. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุดรธานี กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ สระบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 21,893 ราย พื้นที่ 272,838 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 232,080 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 40,466 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 292 ไร่ คิดเป็นเงิน 392.29 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,641 ราย (คิดเป็นร้อยละ 16.63 ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย) พื้นที่ 26,813 ไร่ วงเงิน 38.46 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 1,499 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,514 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,504 ไร่ บ่อกุ้ง 10 ไร่ กระชัง 563 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 7.36 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,251 ราย (คิดเป็นร้อยละ 83.46 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 1,288 ไร่ กระชัง 563 ตร.ม. วงเงิน 6.31 ล้านบาท (คิดเป็นเงิน 85.73 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

8.3 ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัย มิ.ย. – 15 ก.ค. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 326 ราย พื้นที่ (พืชไร่ และพืชผัก) 4,204 ไร่ คิดเป็นเงิน 7.64 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 69 ราย (คิดเป็นร้อยละ 21.17 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 648 ไร่ วงเงิน 1.29 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 16.88 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

9. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 65)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 3. หอยเชอรี่ 4. โรคไหม้ข้าว 5. โรคขอบใบแห้งข้าว 6. โรคใบขีดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ราชบุรี และพระนครศรีอยุธยา) จำนวน 150 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา) จำนวน 15 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สตูล ขอนแก่น และสงขลา) จำนวน 383 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ลำพูน ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร หนองบัวลำภู และ อุบลราชธานี) จำนวน 107 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี และชัยนาท) จำนวน 60 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (มุกดาหาร สกลนคร และ จันทบุรี) จำนวน 60 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ผลิตขยาย แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และชีวเวเรีย รมรวงศ์ให้ใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ และให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์และสารเคมีอย่างถูกต้อง - การป้องกันกำจัดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยวิธีกำจัดพืชอาศัย และลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือยูเรีย เพื่อลดการซ้อนทับกันของใบข้าวทำให้เกิดเป็นท่ออาศัยของโรคและแมลง รวมถึงควบคุมระดับน้ำในนาได้หลังปักดำหรือหว่าน จนถึงระยะตั้งท้องควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดีเปียก แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้ง - แนะนำให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวต้านทานโรคเพื่อป้องกันการเกิดโรคไหม้ข้าว และโรคขอบใบแห้งข้าว - แนะนำให้เกษตรกรกำจัดหอยและกลุ่มไข่จากฤดูกาลที่แล้วและป้องกันหอยไหมที่จะเข้ามา และปักไม้ไผ่ตามข้างคันนาเพื่อล่อให้หอยมาไข่แล้วเก็บไปทำลาย หากพบการระบาดรุนแรงแนะนำให้เกษตรกรใช้กากเมสลิธชา หว่านในนาข้าว - แนะนำเกษตรกรป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดหลังขาว ที่พบการระบาดในพื้นที่โดยวิธีการไถน้าออกจากแปลงนา และควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดีเปียก 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเอง - สนับสนุนเชื้อราเมตาไรเซียมพร้อมแนะนำวิธีการผลิตขยายแก่เกษตรกร หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมี - โรคใบขีดสีน้ำตาล วิธีการป้องกันกำจัดโดยการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าพบโรคระบาดของโรครุนแรง ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม (Carbendazim)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม 3. ดั้วแรด 4. ดั้วงวง 5. โรสสีขามะพร้าว 6. หนอนกินใบมะพร้าว	พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,063 ไร่ การระบาดลดลง 332 ไร่ พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (เลย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,861 ไร่ การระบาดลดลง 100 ไร่ พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,177 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 47 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม กระบี่ พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,144 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร กระบี่ และสงขลา) รวมจำนวน 634 ไร่ การระบาดลดลง 39 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ระยอง ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) รวมจำนวน 151 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 151 ไร่	- รมรณคให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - โรสสีขามะพร้าวเข้าทำลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้น การป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. ดั้วงกหลาย 3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,244 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 47 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 97 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา กระบี่ ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,294 ไร่ การระบาดลดลง 26 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,638 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (นครสวรรค์ อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) รวมจำนวน 98 ไร่ การระบาดคงที่	- ใช้กาดักไฟโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย - ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - รมรณคให้เกษตรกรตัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่าของปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง - พ่นด้วงกหลายด้วยสารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ - แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสุราษฎร์ธานี) รวมจำนวน 277 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 277 ไร่</u>	- เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที
ยางพารา	1. โรคราขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคหนำยางแห้ง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 153 ไร่ <u>การระบาดลดลง 3 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 608,473 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 11,738 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด นครสวรรค์ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,593 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 208 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (มุกดาหาร จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 65 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดของโรคยางพาราให้เกษตรกรรับรู้อย่างต่อเนื่อง - คำนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคราขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกัน ข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถว ถัดไปทั้งสองข้าง - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผิดพันบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรคราขาว โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ และโรคใบร่วงยางพารา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ร่องขวางกับลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามลงสู่ราก
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. โรคใบจุดตากบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 73 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และระยอง) จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่าสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งสะสมของโรค
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. ไรแดงมันสำปะหลัง 5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคโคนเน่าหัวเน่า 7. โรคโคนเน่าหัวเน่า จากอุทกภัย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี และระยอง) จำนวน 63 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 5 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (น่าน กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร และระยอง) จำนวน 16 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา สกลนคร อุบลราชธานี ชลบุรี และระยอง) จำนวน 27 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) จำนวน 74 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และชลบุรี) จำนวน 22 ไร่ <u>การระบาดลดลง 4 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 43 จังหวัด (กำแพงเพชร เชียงราย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 216,521 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 947,606 ไร่</u>	- รณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสาน ในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน Anagyrus lopezi แผลงข้างปีกใส และ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง ในพื้นที่ - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้งเพื่อทำลายตัวหนอน และดักด้แมลงวันหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียม ควบคุม โดยใส่ไปพร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุก ลงในพื้นดิน และให้หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและ เกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผล ต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทาง เฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพุ่มแจ้ และแนะนำเกษตรกร ให้สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ที่พบการระบาด ให้ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคหรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ที่ไม่แสดงอาการของโรค

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	8. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 97,783 ไร่ การระบาดลดลง 113 ไร่	
อ้อย	1. โรคเส้ด้า 2. โรคใบขาวอ้อย	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุทัยธานี และลพบุรี) จำนวน 406 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เพชรบุรี) จำนวน 10 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	- แนะนำให้เกษตรกรถอนต้นที่เป็นโรคเส้ด้าและนำไป ทำลายนอกแปลง และไถทำลายอ้อยตอที่เป็นโรครุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้แหล่งของเชื้อแพร่ระบาดต่อไป - แนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ และหากเจอต้นที่เป็นโรคให้นำไปทำลายนอกแปลงปลูก
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm) 2. โรคราน้ำค้าง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (เชียงใหม่ นอนงบัวลุ่ม จันทบุรี เพชรบุรี ยะลา สงขลา และสตูล) จำนวน 918 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 771 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (พิจิตร) จำนวน 3 ไร่ การระบาดลดลง 362 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง - แนะนำการควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ หากพบการระบาด รุนแรงควรพ่นสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร - แนะนำเกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทาน และคลุมเมล็ดพันธุ์ ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช และถอนต้นที่ แสดงอาการของโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก รวมทั้ง แนะนำการปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน
สับปะรด	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด คือ (ระยอง) จำนวน 2 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และ ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 139 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 102 ไร่	- เพลี้ยแป้ง แนะนำเกษตรกรสำรวจแปลงปลูกสับปะรด อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดให้ใช้สารเคมีในการ ป้องกันกำจัดเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยแป้ง และรัศมีโดยรอบ - ฝนรดน้ำให้กำจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นพาหะของโรคเหี่ยว สับปะรด โดยให้เกษตรกรเฝ้าระวังด้วยหมั่นสำรวจแปลง อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใช้ไตรโคเดอร์มา และชุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันโรค
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. โรครากเน่าโคนเน่า 5. โรคใบดกหรือใบไหม้ 6. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 210 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (พิษณุโลก จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 176 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสงขลา) จำนวน 769 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 105 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,132 ไร่ การระบาดลดลง 221 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา ระนอง และสงขลา) จำนวน 836 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 81 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด ได้แก่ (อุบลราชธานี จันทบุรี ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) รวมจำนวน 564 ไร่ การระบาดลดลง 24 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาด บริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่สำหรับ ต้นที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกร หมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบดกหรือใบไหม้ หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่าง สม่ำเสมอ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรค และเก็บเศษพืชที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่น นำไปทำลาย นอกแปลงปลูก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชใน แปลงปลูก เพื่อลดความชื้นสะสมใต้ทรงพุ่ม ลดการใส่ปุ๋ย ไนโตรเจนสูง ในพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูง - โรคใบจุดสาหร่าย หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไป ทำลาย หรือฝังดิน ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม ไม่ให้ ต้นมีทรงพุ่มแน่น เพื่อให้ทุเรียนได้รับแสงแดด และ อากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ระยอง) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุบลราชธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 73 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ตัดแต่งกิ่งเงาะเพื่อลดปริมาณมด จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้งที่อาศัยอยู่ในดินไต่ขึ้นมาบนต้นเงาะ - โรคใบจุดสาหร่าย แนะนำเกษตรกร ตัดส่วนที่พบโรคเก็บรวบรวมใบที่เป็นโรคและร่วงหล่นอยู่ในบริเวณสวนไปเผาทำลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อลดความชื้นภายในทรงพุ่ม เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ต่อดัน แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 205 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 69 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 174 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 207 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 139 ไร่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลาใกล้คืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนขอนใบอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สังเกตดูที่ใต้ใบมังคุดจะพบรอยทางยาวเป็นเส้นสีขาว
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. มวนลำไย 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และระยอง) จำนวน 72 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 14 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และระยอง) จำนวน 200 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 25 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน พะเยา อุบลราชธานี จันทบุรี และระยอง) จำนวน 651 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 16	- เพลี้ยแป้ง ตัดแต่งกิ่งไปเผาทำลาย หากระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งและควรพ่นสารติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน - มวนลำไย ตัดแต่งกิ่ง ไม่ให้ทรงพุ่มหนาทึบ เพื่อทำลายที่หลบซ่อนและที่พักอาศัยของตัวเต็มวัย หากพบการระบาดจับตัวอ่อน ตัวเต็มวัยและไข่ มาทำลาย แล้วใช้ศัตรูธรรมชาติ ฉีดพ่นก่อนลำไยออกดอก - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ ถอนวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ - โรคราดำ พ่นน้ำเปล่าล้างคราบราดำ เพื่อลดปริมาณเชื้อกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค

10. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

10.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 65)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2565 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 18 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 27 จุด ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองบัวลำภู สมุทรสงคราม กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้

10.2 โรคล้มปัสกีน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 65)

พบการระบาดสะสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 20 พฤศจิกายน 2565 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 631,788 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 10,130 ตัว สัตว์ตายสะสม 67,043 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,320 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 137,403 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 442,946 ราย