

รายงานสถานการณ์แนวโน้มการระบาดของโรคด้านหม่อนไหม (เดือน พฤษภาคม 2569)

ลำดับที่	โรค และแมลงศัตรูหม่อนไหม	จำนวนเกษตรกรที่เกิดการระบาด (ราย)	วิธีการป้องกันกำจัด	หมายเหตุ
	โรคในหม่อนไหม			
1	โรคแกรสเซอร์	13 ราย	ใช้ยาโรยตัวไหม ที่มีส่วนผสมปูนขาว และคลอรีน อัตราส่วน 16 : 1 โรย ในช่วงไหมตื่นนอน และใช้ปูนขาว โรยตัวไหมในช่วงที่หม่อนไหมนอน	บ้านโคก อ.คำม่วง 10 ราย บ้านหนองช้าง อ.สามชัย 3 ราย
	ศัตรูหม่อน			
1	เพลี้ยไฟ	24 ราย	เขตกรรมด้วยวิธีกล เป็นวิธีที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีการเลี้ยงไหมต่อเนื่อง โดยการตัดเผาทำลาย ต้นที่เกิดโรค และการทำลายแมลง พาหะ หรือใช้ไบยาสูบ 50 กรัม + เหล้าขาว 1 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนนำมาฉีดพ่น	บ้านโคก อ.คำม่วง 10 ราย บ้านดงกล้วย อ.ดอนจาน 11 ราย บ้านหนองช้าง อ.สมเด็จ 3 ราย
	โรคหม่อน			
1	ใบด่าง	15 ราย	เขตกรรมด้วยวิธีกล เป็นวิธีที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีการเลี้ยงไหมต่อเนื่อง โดยการตัดเผาทำลาย ต้นที่เกิดโรค และการทำลายแมลง พาหะ เช่น เพลี้ยอ่อน	บ้านโคก อ.คำม่วง 5 ราย บ้านดงกล้วย อ.ดอนจาน 7 ราย บ้านหนองช้าง อ.สมเด็จ 3 ราย

หมายเหตุ : การระบาดของโรค และแมลงศัตรูหม่อนไหม จะมีความรุนแรงแตกต่างกัน และตามสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งแนวทางในการเขตกรรมที่เหมาะสมกับการผลิตหม่อนไหมในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจะต้องพิจารณาวิธีการบริหารจัดการของเกษตรกรรายกลุ่มซึ่งมีรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้เลี้ยงไหมหัตถกรรม และกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายรังไหมให้บริษัท ตัดยอดข้อมูล วันที่ 30 พฤษภาคม 2569