

รายงานสถานการณ์แนวโน้มการระบาดของโรคด้านหม่อนไหม (เดือน กุมภาพันธ์ 2569)

ลำดับที่	โรค และแมลงศัตรูหม่อนไหม	จำนวนเกษตรกรที่เกิดการระบาด (ราย)	วิธีการป้องกันกำจัด	หมายเหตุ
	โรคในหม่อนไหม			
1	โรคแกรสเซอร์	3 ราย	ใช้ยาโรยตัวไหม ที่มีส่วนผสมปูนขาว และคลอรีน อัตราส่วน 16 : 1 โรยในช่วงไหมตื่นนอน	บ้านหนองช้าง อ.สามชัย 2 ราย บ้านม่วงหวาน อ.เขาวง 1 ราย
	โรคหม่อน			
1	ราสนิม	5 ราย 2 โรงเรียน	เขตกรรมด้วยวิธีกล เป็นวิธีที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีการเลี้ยงไหมต่อเนื่อง โดยการเด็ดใบที่เกิดโรคระบาดไปเผา หรือใส่ถุงแล้วนำไปฝังกลบ	บ้านหนองแก่นทราย อ.สามชัย 3 ราย บ้านโคกสำราญ อ.ร่องคำ 2 ราย รร.ด่านแร่ราษฎร์สงเคราะห์ อ.ดอนจาน รร.คำกุงหนองฮี อ.สมเด็จ
2	ราแป้ง	32 ราย	เขตกรรมด้วยวิธีกล เป็นวิธีที่เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีการเลี้ยงไหมต่อเนื่อง โดยการเด็ดใบที่เกิดโรคระบาดไปเผา หรือใส่ถุงแล้วนำไปฝังกลบ	บ้านโคก อ.คำม่วง 15 ราย บ้านดงกล้วย อ.ดอนจาน 7 ราย บ้านโคกสำราญ อ.ร่องคำ 10

หมายเหตุ : การระบาดของโรค และแมลงศัตรูหม่อนไหม จะมีความรุนแรงแตกต่างกัน และตามสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งแนวทางในการเขตกรรมที่เหมาะสมกับการผลิตหม่อนไหมในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจะต้องพิจารณาวิธีการบริหารจัดการของเกษตรกรรายกลุ่มซึ่งมีรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้เลี้ยงไหมหัตถกรรม และกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายรังไหมให้บริษัท ตัดยอดข้อมูล วันที่ 30 มกราคม 2569