



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 (เวลา 15.00 น.)

## 1. สภาพอากาศ

### 1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.



แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เวลา 07:00 น.


ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

สำหรับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน

**สภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้:**

การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก โดยมีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนตกในบางพื้นที่

### 1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 1 พ.ค. 68 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 2 พ.ค. 68



| ที่ | อำเภอ       | จังหวัด   | ปริมาณฝน (มม.) | ความรุนแรง  |
|-----|-------------|-----------|----------------|-------------|
| 1   | อ.เมือง     | บึงกาฬ    | 21.4           | ฝนตกปานกลาง |
| 2   | อ.นาขาง     | บุรีรัมย์ | 21.0           | ฝนตกปานกลาง |
| 3   | อ.เมือง     | นครนายก   | 16.6           | ฝนตกปานกลาง |
| 4   | อ.หล่มสัก   | เพชรบูรณ์ | 16.2           | ฝนตกปานกลาง |
| 5   | อ.ตะกั่วป่า | พังงา     | 15.0           | ฝนตกปานกลาง |

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)  
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

## 2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 68)

### 2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 43,736 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 19,797 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (41,579 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54) มากกว่าปี 2567 จำนวน 2,157 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 37.05 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 139.04 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 32,602 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 41,297 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 17,758 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (39,103 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55) มากกว่าปี 2567 จำนวน 2,194 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 29.01 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 126.31 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 29,629 ล้าน ลบ.ม.

| ภาค      | ขนาดใหญ่        |                       |           |           |        |             | ขนาดกลาง        |                       |           |           |        |             | รวม             |                       |           |           |        |             | รับได้อีก |
|----------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|
|          | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             |           |
|          |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |           |
| เหนือ    | 8               | 24,825                | 13,827    | 56        | 7,082  | 39          | 80              | 1,083                 | 554       | 51        | 463    | 47          | 88              | 25,908                | 14,381    | 56        | 7,545  | 40          | 11,527    |
| ตอน.     | 12              | 8,368                 | 3,302     | 39        | 1,650  | 25          | 226             | 2,061                 | 866       | 42        | 702    | 37          | 238             | 10,429                | 4,168     | 40        | 2,353  | 27          | 6,261     |
| กลาง     | 3               | 1,419                 | 366       | 26        | 306    | 22          | 27              | 419                   | 145       | 35        | 120    | 31          | 30              | 1,838                 | 511       | 28        | 425    | 24          | 1,327     |
| ตะวันตก  | 2               | 26,605                | 18,184    | 68        | 4,907  | 37          | 8               | 164                   | 61        | 37        | 50     | 33          | 10              | 26,769                | 18,245    | 68        | 4,957  | 37          | 8,523     |
| ตะวันออก | 6               | 1,515                 | 512       | 34        | 418    | 29          | 52              | 1,006                 | 370       | 37        | 314    | 33          | 58              | 2,520                 | 882       | 35        | 732    | 31          | 1,638     |
| ใต้      | 4               | 8,194                 | 5,106     | 62        | 3,396  | 52          | 42              | 680                   | 443       | 65        | 390    | 62          | 46              | 8,874                 | 5,549     | 63        | 3,785  | 53          | 3,325     |
| รวม      | 35              | 70,926                | 41,297    | 58        | 17,758 | 37          | 435             | 5,411                 | 2,439     | 45        | 2,039  | 41          | 470             | 76,338                | 43,736    | 57        | 19,797 | 38          | 32,602    |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 13,595 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 6,899 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 7.53 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 55.27 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 11,276 ล้าน ลบ.ม.

| อ่างเก็บน้ำ     | ปริมาณน้ำในอ่างฯ |               | ปริมาณน้ำใช้การได้ |             | ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ |          | ปริมาณน้ำระบาย |          | ปริมาณน้ำรับ<br>ได้อีก |
|-----------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|------------------------|
|                 | ปริมาณน้ำ        | % ความจุอ่างฯ | ปริมาณน้ำ          | % น้ำใช้การ | วันนี้              | เมื่อวาน | วันนี้         | เมื่อวาน |                        |
| ภูมิพล          | 7,445            | 55            | 3,645              | 38          | 3.31                | 7.65     | 20.00          | 20.00    | 6,017                  |
| สิริกิตี        | 5,544            | 58            | 2,694              | 40          | 4.22                | 4.18     | 27.06          | 27.06    | 3,966                  |
| ภูมิพล+สิริกิตี | 12,989           | 57            | 6,339              | 39          | 7.53                | 11.83    | 47.06          | 47.06    | 9,983                  |
| แควน้อยฯ        | 396              | 42            | 353                | 39          | 0.00                | 0.60     | 4.75           | 4.75     | 543                    |
| ป่าสักชลสิทธิ์  | 210              | 22            | 207                | 22          | 0.00                | 0.00     | 3.46           | 3.46     | 750                    |
| รวมทั้งหมด      | 13,595           | 55            | 6,899              | 38          | 7.53                | 12.44    | 55.27          | 55.27    | 11,276                 |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯ บางยาง (82%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 8 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ กว๊าลม (27%) อ่างฯ แม่มอก (25%) อ่างฯ ห้วยหลวง (29%) อ่างฯ จุฬารัตน์ (30%) อ่างฯ ลำตะคอง (16%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (22%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (23%) และอ่างฯ คลองสิยัด (12%)

### 2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำน่าน แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 384 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 387 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.68 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.02 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.18 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.20 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.37 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.37 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 137 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 138 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 114 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 20 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 3 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เชื่อนพระรามหก 10 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 10 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 14 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 31 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 177 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 178 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทอง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทอง) 9 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 3 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 60 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 80 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 25 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สถานี C.29B ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 59 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 18 ลบ.ม./วินาที)

## 2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

| แม่น้ำ    | จุดเฝ้าระวัง                 | ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร) |             |             |             |             |           |           | เกณฑ์ | หมายเหตุ                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                              | 26 เม.ย. 68             | 27 เม.ย. 68 | 28 เม.ย. 68 | 29 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 1 พ.ค. 68 | 2 พ.ค. 68 |       |                                                                                                                                   |
| เจ้าพระยา | ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี       | 0.17                    | 0.17        | 0.17        | 0.17        | 0.17        | 0.18      | 0.18      | ปกติ  | - เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร<br>- เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร<br>- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร |
| เจ้าพระยา | ท่าบ้านบุรี จ.นนทบุรี        | 0.19                    | 0.19        | 0.19        | 0.19        | 0.19        | 0.20      | 0.21      | ปกติ  |                                                                                                                                   |
| เจ้าพระยา | ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม. | 0.21                    | 0.21        | 0.21        | 0.21        | 0.21        | 0.22      | 0.24      | ปกติ  |                                                                                                                                   |

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

## 2.4 สถานการณ์น้ำโขง

| สถานี                    | ระดับตลิ่ง | ระดับน้ำ<br>2 พ.ค. 68 | + สูงกว่าตลิ่ง<br>- ต่ำกว่าตลิ่ง |
|--------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| อ.เชียงแสน จ.เชียงราย    | 12.80      | 2.34                  | -10.46                           |
| อ.เชียงคาน จ.เลย         | 16.00      | 4.96                  | -11.04                           |
| อ.เมือง จ.หนองคาย        | 12.20      | 1.84                  | -10.36                           |
| อ.เมือง จ.นครพนม         | 12.00      | 1.96                  | -10.04                           |
| อ.เมือง จ.มุกดาหาร       | 12.50      | 2.37                  | -10.13                           |
| อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 14.50      | 2.60                  | -11.90                           |

หมายเหตุ ข้อมูลจาก [www.drw.go.th](http://www.drw.go.th)

## 3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2567/68

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2567/68

ทั้งประเทศ จำนวน 15.38 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12.73 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.65 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 8.81 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.05 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.76 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2567/68 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)

ทั้งประเทศ จำนวน 15.75 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 14.07 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.63 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 9.26 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.79 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.42 ล้านไร่

| ขอบเขตพื้นที่                    | พื้นที่แหล่งน้ำ | แผนการเพาะปลูก ปี 2567/68 |               |       | สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2567/68 |               |            | % ผลปลูก<br>ข้าวรอบ 2 |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------------------|---------------|------------|-----------------------|
|                                  |                 | ข้าวรอบที่ 2              | พืชไร่ พืชผัก | รวม   | ข้าวรอบที่ 2                    | พืชไร่ พืชผัก | รวมทั้งหมด |                       |
| ทั้งประเทศ<br>(77 จังหวัด)       | ในเขตชลประทาน   | 10.02                     | 0.62          | 10.64 | 10.01                           | 0.59          | 10.65      | 100                   |
|                                  | นอกเขตชลประทาน  | 2.71                      | 2.03          | 4.74  | 4.06                            | 1.04          | 5.10       | 150                   |
|                                  | รวม             | 12.73                     | 2.65          | 15.38 | 14.07                           | 1.63          | 15.75      | 111                   |
| ลุ่มน้ำเจ้าพระยา<br>(22 จังหวัด) | ในเขตชลประทาน   | 6.47                      | 0.09          | 6.56  | 6.35                            | 0.10          | 6.50       | 99                    |
|                                  | นอกเขตชลประทาน  | 1.58                      | 0.67          | 2.25  | 2.44                            | 0.32          | 2.76       | 154                   |
|                                  | รวม             | 8.05                      | 0.76          | 8.81  | 8.79                            | 0.42          | 9.26       | 110                   |

## พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน (ทั้งประเทศ)

นอกเขตชลประทาน เกินกว่าแผน 1.35 ล้านไร่ 38 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยนาท สระบุรี ตราด นครนายก กาญจนบุรี เพชรบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

## พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)

นอกเขตชลประทาน เกินกว่าแผน 0.86 ล้านไร่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท สระบุรี นครนายก และจังหวัดสุพรรณบุรี

### 4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

4.1 กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ รวมทั้งประเทศ จำนวน 5,400 หน่วย สนับสนุนเครื่องจักร-เครื่องมือแล้ว ตั้งแต่ 1 พ.ย. 67 – 25 เม.ย. 68 ช่วยเหลือสะสมรวม 46 จังหวัด จำนวน 573 หน่วย ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ 555 เครื่อง (ปริมาณน้ำที่สูบ 141,217,134 ลิตร) รถบรรทุกน้ำ 18 คัน (ปริมาณน้ำ 14,760,000 ลิตร)

4.2 กรมปศุสัตว์ สำรองเสบียงสัตว์ 6,484 ตัน ฝูงยังชีพสัตว์ 3,500 ชุด หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 173 ทีม เมล็ดพันธุ์ฝัก 107,000 ของ สนับสนุนเสบียงสัตว์แล้ว 1,911.68 ตัน เกษตรกร 12,302 ราย (สะสม 1 พ.ย. 67 – 8 เม.ย. 68)

### 5. ผลกระทบด้านการเกษตร

#### 5.1 วาตภัย ช่วงภัย 16 ก.พ. 68 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก นครสวรรค์ พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด ปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี เกษตรกร 1,883 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 5,963 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 463 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,685 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 1,814 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 213 ราย พื้นที่ 996 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 683 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 313 ไร่ คิดเป็นเงิน 2.62 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 49 ราย พื้นที่ 141 ไร่ วงเงิน 0.29 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 68)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

#### 5.2 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 20 พ.ย. 67 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 9,064 ราย พื้นที่ 28,151 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 16,311 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,368 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 8,472 ไร่ คิดเป็นเงิน 62.82 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 6,732 ราย พื้นที่ 23,522 ไร่ วงเงิน 52.69 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 68)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ เกษตรกร 9,062 ราย พื้นที่ 19,145 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 9,043 ไร่ บ่อกุ้ง 10,101 ไร่ กระชัง 75,872 ตรม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 9,062 ราย พื้นที่รวม 19,145 ไร่ กระชัง 75,872 ตรม. คิดเป็นเงิน 188.91 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2,029 ราย พื้นที่ 2,614 ไร่ กระชัง 8,426 ตรม. วงเงิน 20.48 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 68)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 204,668 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 12,128,023 ตัว แบ่งเป็น โค 390,074 ตัว กระบือ 13,860 ตัว สุกร 311,672 ตัว แพะ/แกะ 203,429 ตัว และสัตว์ปีก 11,208,988 ตัว แพลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 7,496.10 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 2,807 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 90,755 ตัว แบ่งเป็น โค 3,040 ตัว กระบือ 243 ตัว สุกร 592 ตัว แพะ/แกะ 1,563 ตัว และสัตว์ปีก 85,317 ตัว แพลงหญ้า 143 ไร่ วงเงิน 94.60 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,830 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 57,182 ตัว แพลงหญ้า 111 ไร่ วงเงิน 64.43 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 68)

#### 5.3 ดินโคลนถล่ม ช่วงภัย 16 ก.ค. – 4 ต.ค. 67

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย สุรินทร์ นครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว**

เกษตรกร 1,085 ราย พื้นที่ 1,400 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,218 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 139 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 43 ไร่ คิดเป็นเงิน 9.20 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 796 ราย พื้นที่ 818 ไร่ วงเงิน 5.30 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 68)

**ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ**

#### 5.4 อุทกภัย ช่วงภัย ช่วงภัย 16 ก.ค. - 31 ต.ค. 67

**ด้านพืช** ได้รับความเสียหาย 54 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กระบี่ ตรัง ยะลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 156,633 ราย พื้นที่ 1,204,258 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,060,298 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 130,829 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 13,131 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,733.05 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 132,369 ราย พื้นที่ 1,007,188 ไร่ วงเงิน 1,442.69 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 68)

**ด้านประมง** ได้รับความเสียหาย 46 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตรัง ภูเก็ต ยะลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 10,948 ราย พื้นที่รวม 13,162 ไร่ กระชัง 8,745 ต่อม. คิดเป็นเงิน 68.06 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 10,341 ราย พื้นที่ 12,266 ไร่ กระชัง 8,745 ต่อม. วงเงิน 63.86 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 68)

**ด้านปศุสัตว์** ได้รับความเสียหาย 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม เลย หนองคาย อุบลราชธานี ตราด และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,744 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 102,132 ตัว แบ่งเป็น โค 385 ตัว กระบือ 51 ตัว สุกร 227 ตัว แพะ/แกะ 52 ตัว และสัตว์ปีก 99,694 ตัว แปลงหญ้า 1,819 ไร่ วงเงิน 10.34 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้น** (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 68)

#### 6. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 โดยมีแผนการตั้งหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง 22 หน่วย ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี ระยอง ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา และหน่วยฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

##### สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

- **ภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง** มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี อุทัยธานี อุดรธานี สกลนคร สระบุรี นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (ฮอด ดอยเต่า) พิษณุโลก (วังทอง) เพชรบูรณ์ (เมืองเขาค้อ วังโป่ง) กาญจนบุรี (ศรีสวัสดิ์) อุทัยธานี (บ้านไร่) อุดรธานี (ไชยวาน วังสามหมอ) สกลนคร (พังโคน วาริชภูมิ ส่องดาว วารินเวส สว่างแดนดิน พรรณานิคม นิคมน้ำออน เจริญศิลป์) สระบุรี (แก่งคอย มวกเหล็ก) นครราชสีมา (ปากช่อง วังน้ำเขียว) ชลบุรี (หนองใหญ่ บ่อทอง) จันทบุรี (โป่งน้ำร้อน) ฉะเชิงเทรา (ท่าตะเกียบ) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี หัวหิน สามร้อยยอด)

- **ภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ** ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ลพบุรี) เขื่อนศรีนครินทร์ (กาญจนบุรี) เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร) เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง (นครราชสีมา) เขื่อนคลองสียัด (ฉะเชิงเทรา) เขื่อนปราณบุรี (ประจวบคีรีขันธ์) และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง/เล็ก จำนวน 5 อ่าง

- **ภารกิจการปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อยับยั้งและบรรเทาการเกิดพายุลูกเห็บ** มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือบริเวณพื้นที่ จ.อุดรธานี หลังปฏิบัติการ ไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ จ.อุดรธานี (หนองวัวซอ) ในช่วงเฝ้าระวัง ช่วงเวลา 13.58 – 16.58 น.



สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

- การบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 30 เมษายน 2568 ปฏิบัติการ 145 วัน จำนวน 2,690 เที่ยวบิน (4,277:20 ชั่วโมงบิน) ปริมาณสารฝนหลวงที่ใช้ปฏิบัติการ 965.965 ตัน ปริมาณน้ำประปา 1,625,600 ลิตร โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 10 หน่วย ได้แก่ หน่วยฯ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ดาก แพร่ พิชณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี อุดรธานี นครราชสีมา และหน่วยฯ จังหวัดระยอง ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท สระบุรี และลพบุรี ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พิชณุโลก แพร่ น่าน สุโขทัย พิจิตร ตาก อุดรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พะเยา และแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร บึงกาฬ นครราชสีมา ขอนแก่น นครพนม กาฬสินธุ์ หนองคาย และชัยภูมิ

- การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่การเกษตรและเขื่อนเก็บกักน้ำ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2568 ปฏิบัติการ 55 วัน จำนวน 660 เที่ยวบิน (885:30 ชั่วโมงบิน) ปริมาณสารฝนหลวงที่ใช้ปฏิบัติการ 516.400 ตัน โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วย ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดสุรินทร์ หน่วยฯ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยฯ จังหวัดจันทบุรี หน่วยฯ จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยฯ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หน่วยฯ จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยฯ จังหวัดแพร่ หน่วยฯ จังหวัดพิษณุโลก หน่วยฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยฯ จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยฯ จังหวัดอุดรธานี พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 91.31 ล้านไร่ และมีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ 27 แห่ง และขนาดกลาง/เล็ก 97 แห่ง

- การกำจัดน้ำดับไฟป่าโดยเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 7 วัน จำนวน 138 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำ 69,000 ลิตร พื้นที่ปฏิบัติการช่วยเหลือเทือกเขาบรรทัด จ.ตรัง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชุมชน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.ลำพูน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ฮ่อง จ.เชียงใหม่ ปฏิบัติการโดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

- การกักขังยุงการเกิดพายุลูกเห็บ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2568 ปฏิบัติการ 25 วัน 38 เที่ยวบิน พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์ จำนวน 935 นัด โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 3 หน่วย คือ หน่วยฯ จังหวัดพิษณุโลก หน่วยฯ จังหวัดอุดรธานี และหน่วยฯ จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติการในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน สุโขทัย พิชณุโลก เพชรบูรณ์ อุดรดิตถ์ อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู นครราชสีมา ลพบุรี ขอนแก่น มหาสารคาม นครพนม เลย และจังหวัดมุกดาหาร

## 7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 68)

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                            | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้าว    | 1. หนอนห่อใบข้าว<br>2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว<br>3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล<br>4. แมลงบัว | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชลบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ยะลา และมหาสารคาม)<br>จำนวน 40 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ราชบุรี นครศรีธรรมราช กำแพงเพชร หนองบัวลำภู และตาก)<br>จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (พิจิตร นครสวรรค์ อุดรดิตถ์ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา บึงกาฬ มหาสารคาม และ กรุงเทพมหานคร)<br>จำนวน 374 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (พิจิตร และชัยนาท)<br>จำนวน 284 ไร่ การระบาดลดลง 175 ไร่ | - หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ กำจัดพืชอาศัย และเมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัว/ตร.ม. และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม<br>- เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้น้ำออกจากแปลงนาและปฏิบัติเช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล<br>- เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยต่อมวนข้าวดูดไข่ ระหว่าง 6 : 1- 8 : 1 หรือ/อ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง<br>- กำจัดวัชพืชรอบแปลงนา ก่อนตกกล้าหรือหว่านข้าวเพื่อทำลายพืชอาศัยของแมลงบัว |
| มะพร้าว | 1. แมลงดำหนาม                                                                       | พื้นที่ระบาด 31 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ชุมพร เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา สตูล พังงา กระบี่ ตรัง สมุทรสงคราม ภูเก็ต พัทลุง จันทบุรี มุกดาหาร สมุทรสาคร นครพนม บุรีรัมย์ ขอนแก่น ระยอง กรุงเทพมหานคร ราชบุรี ฉะเชิงเทรา สกลนคร สมุทรปราการ สระแก้ว อุบลราชธานี ปัตตานี และ นครราชสีมา)<br>จำนวน 12,750 ไร่ การระบาดลดลง 128 ไร่                                                                                                       | - ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามกัดกิน ไปเผาทำลาย ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส ควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว หรือแตนเบียนเตตระสติกัส ควบคุมด้งด้แมลงดำหนามมะพร้าว และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ<br>- ตัดทะลายและช่อดอกมะพร้าวที่โรยข้ามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง กำจัดให้นันพ่นสารฆ่าไร ในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกัน                                                                                                                                                                                        |

| ชนิดพืช         | ศัตรูพืช                                                                                             | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2. โรสซีขามะพร้าว<br><br>3. ดั้วงวง<br><br>4. หนอนหัวดำ<br><br>5. ดั้วแรด                            | พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (ชลบุรี สมุทรสาคร ตราก กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี บุรีรัมย์ สมุทรปราการ สงขลา กาฬสินธุ์ นครปฐม ชัยนาท เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว และขอนแก่น)<br>จำนวน 839 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 17 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 19 จังหวัด (ชลบุรี ตราก กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี จันทบุรี สมุทรสาคร บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช เพชรบุรี พังงา ราชบุรี ระยอง ลำพูน สมุทรปราการ ขอนแก่น และนครราชสีมา)<br>จำนวน 1,1157 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 52 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ชลบุรี สงขลา ชุมพร สมุทรสาคร ราชบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์ ปัตตานี ตราก นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร สุรินทร์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครปฐม อุตรดิตถ์ กระบี่ ภูเก็ต อุบลราชธานี นครพนม พังงา กาญจนบุรี ชัยนาท จันทบุรี อำนาจเจริญ สระแก้วหนองบัวลำภู สตูล หนองคาย บุรีรัมย์ ลำปาง ศรีสะเกษ สมุทรปราการ เชียงใหม่ ระยอง สกลนคร มหาสารคาม นราธิวาส สระบุรี ร้อยเอ็ด แพร่ สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา ลำพูน ยะลา และนครนายก)<br>จำนวน 61,344 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 38 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 28 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ชุมพร เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สมุทรสงคราม ตราก สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร สตูล ฉะเชิงเทรา กระบี่ ราชบุรี บุรีรัมย์ จันทบุรี พังงา ระยอง สงขลา ภูเก็ต ขอนแก่น สมุทรปราการ นครปฐม ตรัง นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ปัตตานี และลำพูน)<br>จำนวน 6,447 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 36 ไร่ | ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสซีขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง<br>- ใช้ตาข่ายดักจับดั้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อ โดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดดั้วงวงในระยะหนอน และดักแด้ ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสมกับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของดั้วงวงมะพร้าว<br>- ใช้กับดักฟีโรโมนล่อดั้วแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้ตาข่ายหรือแหจับปลามาซึ่งวางทิศทางลมดักจับดั้วแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม อัตรา 800 กรัม/กองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดดั้วแรดในระยะหนอนและดักแด้ หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก โดยใช้ปริมาณ 1 - 1.5 ลิตร/ต้น ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบาด<br>- ปลอ้ยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ หรือปลอ้ยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ ใช้สารเคมีอามีแกดิน-เบนโซเอท โดยมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น และมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำน้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน หากมีการปลอ้ยแตนเบียนให้ปลอ้ยหลังพ่นสารเคมี 2 สัปดาห์ |
| ปาล์ม<br>น้ำมัน | 1. หนอนปลอกเล็ก<br><br>2. ดั้วแรด<br><br>3. ดั้วงูหลาย<br><br>4. โรคลำต้นเน่า<br><br>5. โรคทะลายเน่า | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ชลบุรี และสงขลา)<br>จำนวน 669 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล กระบี่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี สงขลา ตรัง จันทบุรี ระยอง และร้อยเอ็ด)<br>จำนวน 1,239 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 71 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ชลบุรี สตูล ตรัง กระบี่ ตราก นราธิวาส นครศรีธรรมราช สระบุรี จันทบุรี และสงขลา)<br>จำนวน 506 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 13 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กระบี่ สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สตูล ตราก พังงา และจันทบุรี)<br>จำนวน 11,838 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 22 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ตราก นราธิวาส ชุมพร และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 933 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน<br>- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน<br>- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน<br>- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด<br>- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง<br>- ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ชนิดพืช     | ศัตรูพืช                                                                                                       | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 6. โรคใบจุด<br>7. โรคใบจุดสาหร่าย<br>8. หนอนหัวดำ<br>9. หนอนหน้าแมว                                            | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ชุมพร สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา ระยอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส)<br>จำนวน 88 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 281 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี สกลนคร ตราด และจันทบุรี)<br>จำนวน 706 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี สระบุรี ตรัง ชุมพร สตูล และระยอง)<br>จำนวน 612 ไร่ การระบาดลดลง 60 ไร่                                                                                                                                                                                 | - ตัดทางใบที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาในที่ เก็บเศษซากพืช นำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปลอญแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ยางพารา     | 1. โรคครากขาว<br>2. โรคใบร่วงยางพารา<br>3. โรคหน้ำยางแห้ง<br>4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา                   | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,426 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี พังงา ปัตตานี ตราด นongคาย ชุมพร กระบี่ และสตูล)<br>จำนวน 1,474 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตรัง สกลนคร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ชลบุรี และร้อยเอ็ด)<br>จำนวน 4,732 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา น่าน สุโขทัย อุตรธานี สตูล นongคาย เชียงราย บึงกาฬ พังงา ระยอง เลย หนอง สุราษฎร์ธานี พะเยา นครพนม และกาญจนบุรี)<br>จำนวน 395,689 ไร่ การระบาดคงที่                                                    | - คำนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น<br>- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา<br>- รมรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ<br>- เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือ จนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ                                                                                                                                                                                                                                               |
| กาแฟ        | 1. หนอนกาแฟสีแดง<br>2. ตัวหนอนดียว                                                                             | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่)<br>จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตาก)<br>จำนวน 370 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟ- สีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง<br>- พ่นสารฆ่าแมลงอิมิดาคลอพริด หรือใช้สารฆ่าแมลงคลอร์ ไพรีฟอส ฉีดเข้าตามรูที่หนอนเจาะเข้าไปทำลายแล้วใช้ ดินน้ำมัน หรือปูนปาสเตอร์อุดรูไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มันสำปะหลัง | 1. เพลี้ยแป้ง<br>มันสำปะหลัง<br>2. โรคใบไหม้<br>3. โรคเน่ามันสำปะหลัง<br>4. โรคโคนเน่าหัวเน่า<br>5. โรคพุ่มแจ้ | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (กาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี สกลนคร สุโขทัย สระแก้ว จันทบุรี และนครราชสีมา)<br>จำนวน 2,137 ไร่ การระบาดลดลง 427 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ยโสธร และสกลนคร)<br>จำนวน 20 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี ขอนแก่น ราชบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ระยอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ อุดรดิษฐ์ สกลนคร สุรินทร์ มหาสารคาม และหนองบัวลำภู)<br>จำนวน 17,928 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 661 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สระแก้ว และชลบุรี)<br>จำนวน 114 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว บุรีรัมย์ Mukดาหาร และจังหวัดจันทบุรี)<br>จำนวน 1,156 ไร่ การระบาดคงที่ | - ให้ไถและพรวนดิน และใช้ฟ่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบต่าง<br>- ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน<br>- โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค ปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียน อายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็นทางเลือก สุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง- ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและ ดักด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหาร สามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะ หนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วคส์โอโพลีโพรไวรัส หรือ เอ็นพีวี |



| ชนิดพืช                | ศัตรูพืช                                                                                             | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 6. โรคใบต่าง<br>มันสำปะหลัง                                                                          | พื้นที่ระบาด 37 จังหวัด (นครราชสีมา กาญจนบุรี<br>ขอนแก่น กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ชลบุรี อุทัยธานี<br>ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร สระแก้ว ลพบุรี ระยอง ชัยภูมิ<br>อุบลราชธานี นครสวรรค์ มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร<br>สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยนาท อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ราชบุรี<br>เพชรบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ สุโขทัย<br>อำนาจเจริญหนองบัวลำภู พิจิตรโลก สกลนคร นครพนม<br>จันทบุรี และตาก)<br>จำนวน 806,947 ไร่ <u>การระบาดลดลง 23,357 ไร่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หนอนกระทุ้หอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน<br>- ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย<br>ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ<br>- ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยง<br>การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย<br>มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ<br>- ควรกรร่งแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่<br>ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ข้าวโพด<br>เลี้ยงสัตว์ | 1. หนอนกระทุ้ข้าวโพด<br>ลายจุด (fall armyworm)                                                       | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น<br>มหาสารคาม จันทบุรี สระแก้ว ยะลา และสตูล)<br>จำนวน 26 ไร่ <u>การระบาดลดลง 2 ไร่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ควบคุมการระบาดของหนอนกระทุ้ข้าวโพดลายจุด (FAW)<br>แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่<br>หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สับปะรด                | 1. โรคเหี่ยว                                                                                         | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และประจวบคีรีขันธ์)<br>จำนวน 339 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป่นตอเก่า<br>สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| อ้อย                   | 1. หนอนกออ้อย<br>2. โรคใบขาว<br>3. โรคเส้ดำ                                                          | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กาฬสินธุ์ อุทัยธานี นครราชสีมา<br>ชลบุรี นครสวรรค์ และหนองบัวลำภู)<br>จำนวน 2,989 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 240 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา<br>ชลบุรี และมหาสารคาม)<br>จำนวน 508 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ชลบุรี และ<br>กำแพงเพชร)<br>จำนวน 623 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1 ไร่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน<br>ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง<br>- ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง<br>เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว<br>หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก<br>- โรคเส้ดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ<br>20 ลิตร ผสมสารจับใบและฉีดพ่นในเวลายืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ทุเรียน                | 1. เพลี้ยไฟ<br>2. เพลี้ยไก่แจ้<br>3. เพลี้ยแป้ง<br>4. หนอนเจาะผล<br>5. ไรแดง<br>6. โรครากเน่าโคนเน่า | พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชุมพร<br>นครศรีธรรมราช ระนอง ระยอง ยะลา ปราจีนบุรี<br>และนราธิวาส)<br>จำนวน 1,092 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช<br>สุราษฎร์ธานี ยะลา ตราด ชุมพร นราธิวาส สงขลา<br>กระบี่ และระยอง)<br>จำนวน 910 ไร่ <u>การระบาดลดลง 3 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี ตราด ยะลา<br>ระนอง นครศรีธรรมราช ระยอง และกระบี่)<br>จำนวน 210 ไร่ <u>การระบาดลดลง 5 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช<br>และชุมพร)<br>จำนวน 47 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรีชุมพร<br>นครศรีธรรมราช ระยอง ยะลา กระบี่ ตราด ปราจีนบุรี<br>และนราธิวาส)<br>จำนวน 1,170 ไร่ <u>การระบาดคงเพิ่มขึ้น 5 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ยะลา<br>สงขลา สุราษฎร์ธานี ตราด ระยอง ปัตตานี ตรัง<br>นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่<br>พังงา ภูเก็ต พัทลุง และปราจีนบุรี)<br>จำนวน 3,738 ไร่ <u>การระบาดลดลง 12 ไร่</u> | - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่<br>อิมิดาโคลพริด ฟิโพรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สาร<br>ผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่<br>ไทอะมีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีโทกแซม<br>อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ<br>20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน<br>- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด<br>ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการ<br>ควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร<br>โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย<br>- เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรง<br>ให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไพโรพาร์ไกต์ อัตรา 30 กรัม<br>อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเฮกซ์ไทอะซอกซออัตรา 40 มล.<br>- โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- เมื่อพบการระบาดของโรคใบติดหรือใบไหม้มากควรพ่นสาร<br>ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม<br>คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น<br>เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ<br>- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ<br>หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาด<br>พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                | สถานการณ์                                                                                                                                                | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 7. โรคใบติดหรือใบไหม้   | พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร นราธิวาส ยะลา นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ และสงขลา)<br>จำนวน 327 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่                   | - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ                                                                   |
|         | 8. โรคใบจุดสาหร่าย      | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ยะลา ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และกระบี่)<br>จำนวน 1,036 ไร่ การระบาดลดลง 32 ไร่                      | - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือไซเพอร์เมทริน/ไพฟาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน |
|         | 9. เพลี้ยหอยเกล็ด       | พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตราด สงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ยะลา และนราธิวาส)<br>จำนวน 189 ไร่ การระบาดคงที่                     | - เมื่อพบคราบราสีดํา พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดํา และสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง                                                                        |
|         | 10. เพลี้ยจักจั่นฝอย    | พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระยอง กระบี่ ตราด ยะลา สงขลา และจังหวัดนราธิวาส)<br>จำนวน 865 ไร่ การระบาดลดลง 47 ไร่ | - ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคราที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด                                     |
|         | 11. โรคราดำ             | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระนอง และชุมพร)<br>จำนวน 53 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่                                                                      | - ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน                                                   |
|         | 12. โรคราสีชมพู         | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (นครศรีธรรมราช จันทบุรี ชุมพร ตราด สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกระบี่)<br>จำนวน 283 ไร่ การระบาดคงที่                                  | - มอดเจาะลำต้น ควรตัดและเผาทิ้ง สำหรับส่วนของต้นทุเรียนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้                                                                                                                                   |
|         | 13. มอดเจาะลำต้นทุเรียน | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี ยะลา และสงขลา)<br>จำนวน 84 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่                                                            | - กำจัดตัวเต็มวัยด้วยวงหวดยาว โดยใช้แสงไฟล่อ หรือใช้ตาข่ายตาถี่พันหลวม ๆ รอบต้น เพื่อดักจับตัวเต็มวัยมาทำลาย                                                                                                    |
|         | 14. ตัวหนอนขยายลำต้น    | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร ยะลา และภูเก็ต)<br>จำนวน 9 ไร่ การระบาดคงที่                                                                               | - หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อนให้เขย่ากิ่ง ตัวหนอนคืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดิน สามารถจับทำลายได้ หรือใช้กับดักแสง ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน                                                    |
|         | 15. หนอนกินใบ           | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร และสุรินทร์)<br>จำนวน 220 ไร่ การระบาดลดลง 12 ไร่                                                                 | - หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่ให้รกทึบ และกำจัดวัชพืชในสวนเพื่อลดความชื้น หากพบการระบาดเพียงเล็กน้อย ควรตัดส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกสวน        |
|         | 16. โรคกิ่งแห้ง         | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 281 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่                                                   | - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรกโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร                                                                  |
|         | 17. โรคแอนแทรกโนส       | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชุมพร ยะลา จันทบุรี ตราด และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 378 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 29 ไร่                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 18. หนอนเจาะเมล็ด       | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ภูเก็ต)<br>จำนวน 0.10 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
| เงาะ    | 1. เพลี้ยแป้ง           | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครศรีธรรมราช และจันทบุรี)<br>จำนวน 37 ไร่ การระบาดคงที่                                                                         | - ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง                                                                                                                  |
|         | 2. โรคใบจุดสาหร่าย      | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นราธิวาส และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 265 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่                                                          | - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์                                                                                                  |
|         | 3. หนอนคืบกินใบ         | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 132 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                         | - หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร                                                                                                          |
|         | 4. โรคราแป้ง            | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครศรีธรรมราช และจันทบุรี)<br>จำนวน 60 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่                                                               | - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล                                                                                                      |
|         | 5. เพลี้ยไฟ             | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 9 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                           | - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโพรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สาร                                                                                                       |
|         | 6. หนอนกินช่อดอก        | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                          | - หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ เก็บผลเงาะที่ร่วงหล่นไปฝังหรือเผาไฟ เพื่อป้องกันการระบาด                                                                                                                               |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                                                                                           | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 7. โรคขอบใบแห้ง                                                                                                                                                    | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และระยอง)<br>จำนวน 6 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไอออน 83% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร/สพ<br>วัน 85% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| มังคุด  | 1. เพลี้ยไฟ<br>2. หนอนกินใบ<br>3. หนอนขอนใบ<br>4. โรคใบจุด<br>5. โรคแอนแทรคโนส<br>6. โรคใบจุดสาหร่าย<br>7. โรคใบแห้งและขอบ<br>ใบแห้ง<br>8. เพลี้ยแป้ง<br>9. โรแดง  | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตราด จันทบุรี ชุมพร<br>ระยอง และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 216 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 47 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช<br>ระยอง ชุมพร พังงา และยะลา)<br>จำนวน 410 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 8 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 335 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 8 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 233 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร)<br>จำนวน 40 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง และนราธิวาส)<br>จำนวน 504 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร)<br>จำนวน 33 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 18 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 20 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> | - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้ง โดยการ<br>พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรรพ่น 3 ครั้ง<br>- เมื่อพบใบอ่อนมังคุด ถูกทำลายเกิน 20% ให้พ่นด้วย<br>สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ<br>20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน<br>- เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วย<br>สารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการ<br>ระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน<br>- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน<br>เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 30-80 กรัม<br>- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม<br>อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สาร<br>ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกัน<br>กำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์<br>- เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช<br>โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ<br>- ตัดแต่งกิ่งมังคุด จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง<br>ถูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ย<br>- เมื่อพบโรแดงหรือโรแดงแอฟฟิกันระบาดรุนแรงให้ใช้สาร<br>กำจัดแมลง ได้แก่ ไพโรฟาร์โกลด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ<br>อัตรา 30 มล. หรือเอ็กซ์โทเซซอกซ์อัตรา 40 มล. |
| ลำไย    | 1. เพลี้ยแป้ง<br>2. โรคราดำ<br>3. โรคพุ่มไม้กวาด<br>4. หนอนคืบกินใบ<br>5. โรคก้ามห้อย<br>6. หนอนม้วนใบ<br>7. หนอนเจาะกิ่งและ<br>ลำต้น<br>8. มวนลำไย<br>9. เพลี้ยไฟ | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว<br>และสมุทรสาคร)<br>จำนวน 113 ไร่ <u>การระบาด8'muj</u><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี<br>และสระแก้ว)<br>จำนวน 224 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว)<br>จำนวน 150 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่)<br>จำนวน 50 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่)<br>จำนวน 39 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสมุทรสาคร)<br>จำนวน 5 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี)<br>จำนวน 15 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่)<br>จำนวน 16 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                   | - หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วย<br>สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไอออน อัตรา 30 มล./น้ำ<br>20 ลิตร หรือไพโรทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน<br>- พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร<br>อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออก<br>ซิคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม<br>- หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด<br>ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง<br>- เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือ<br>นำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแต่ไปทำลาย<br>หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น<br>คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปดาไซฮาโลทริน<br>อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาดของ<br>ให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกไรทำลายนำไปเผาทั้งนอกแปลงปลูก<br>- หมั่นตรวจ ถ้าพบให้เก็บทำลาย หากระบาดรุนแรงมาก<br>ควรฉีดพ่นด้วยยาไมโนโครโตฟอส ในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร<br>หรือพ่นด้วยไพโรทรอยด์อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร<br>- ตัดส่วนที่ถูกทำลายที่มีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่<br>ที่มาเล่นไฟกลางคืนไปทำลาย                                              |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช       | สถานการณ์                                                              | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 10. หนอนกินดอก | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 19 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> | - จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย หากพบระบาดมาก<br>ใช้ยาฆ่าแมลงพวก โมโนโครโทพอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี/น้ำ<br>20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร<br>- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในช่วงฤดูแล้งขณะที่อยู่ในระยะ<br>ออกดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช<br>ควรพ่น 3 ครั้ง |

## 8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 เมษายน 2568

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 13 จังหวัด 23 จุด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี มุกดาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้

พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 97 จุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด น่าน นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา และพบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว ในพื้นที่จังหวัดสงขลา