



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 07:00 น.

ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 7 ส.ค. 68 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 8 ส.ค. 68



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.บ้านด่านลานหอย	สุโขทัย	90.5	ฝนตกหนักมาก
2	อ.โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	88.8	ฝนตกหนัก
3	อ.ปากชม	เลย	87.5	ฝนตกหนัก
4	อ.ธลาง	ภูเก็ต	84.3	ฝนตกหนัก
5	อ.ลับแล	อุตรดิตถ์	80.5	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

จากสถานการณ์ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับพายุโซนร้อน “วีภา” ที่ปกคลุมบริเวณใกล้ชายฝั่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ทำให้ประเทศไทย มีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงวันที่ 1 ก.ค. - ปัจจุบัน รวม 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ เลย มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี ยังคงมีสถานการณ์ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสกลนคร

ผลกระทบด้านการเกษตร ช่วงภัย 1 ก.ค. - ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 68)

ด้านพืช พื้นที่ได้รับผลกระทบ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิจิตร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครพนม มุกดาหาร หนองคาย ร้อยเอ็ด บึงกาฬ และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกร 55,482 ราย พื้นที่ 330,659 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 274,903 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 42,581 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 13,175 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 464 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,275 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 400 ไร่ พืชไร่พืชผัก 818 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 57 ไร่ วงเงิน 2,386,268 บาท

ด้านประมง พื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ เกษตรกร 5,302 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 2,848 ไร่ (บ่อปลา 2,485 ไร่/บ่อกุ้ง 363 ไร่) กระชัง 459 ตร.ม. **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครพนม หนองคาย และจังหวัดเกษตรกร 56,504 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 2,345,332 ตัว แบ่งเป็น โค 60,799 ตัว กระบือ 12,302 ตัว สุกร 71,832 ตัว แพะ/แกะ 2,611 ตัว และสัตว์ปีก 2,345,332 ตัว แปลงหญ้า 4,741 ไร่ **อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย**

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

1. กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

1.1 เครื่องสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 33 เครื่อง ได้แก่ เชียงราย(1) แพร่(5) น่าน (6) ตาก(5) พะเยา(1) นครปฐม(4) พระนครศรีอยุธยา(5) สุพรรณบุรี(6)

1.2 กระสอบทราย จำนวน 1,200 ใบ ได้แก่ เชียงใหม่(800 ใบ) แพร่(400 ใบ)

2. กรมปศุสัตว์ ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ สนับสนุนพืชอาหารสัตว์ 123,800 กก. ถูยั้งซีฟอสต์ 201 ถูย ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ 2,958 ชอง รักษาสัตว์ 52,027 ตัว รวมทั้งอพยพสัตว์ 144,627 ตัว

3. กรมประมง โดยกองตรวจการประมง ในวันที่ 25 ก.ค. 2568 ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ให้ความช่วยเหลือ จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ 18 นาย รถยนต์บรรทุกสูง 6 คัน เรือตรวจการประมง 7 ลำ โดยช่วยนำส่งเสบียงอาหาร และน้ำดื่ม พร้อมทั้งอพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็กและคนชรา ในพื้นที่ประสบภัยสู่พื้นที่ปลอดภัย

3. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 68)

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 50,341 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 26,394 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (44,021 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58) มากกว่าปี 2567 จำนวน 6,320 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 195.32 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 184.63 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 26,162 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 47,419 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 23,881 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (41,089 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58) มากกว่า ปี 2567 จำนวน 6,330 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 171.38 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 145.76 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 23,507 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	17,598	71	10,853	60	87	1,145	748	65	655	62	95	25,970	18,346	71	11,509	60	7,623
ตอน.	12	8,368	3,587	43	1,935	29	230	2,122	1,100	52	932	48	242	10,490	4,687	45	2,867	33	5,803
กลาง	3	1,419	274	19	214	16	27	419	157	37	131	33	30	1,838	431	23	345	20	1,407
ตะวันตก	2	26,605	20,137	76	6,860	51	8	164	65	40	54	35	10	26,769	20,202	75	6,914	51	6,566
ตะวันออก	6	1,515	661	44	567	40	52	1,007	518	51	462	49	58	2,521	1,180	47	1,029	43	1,342
ใต้	4	8,194	5,161	63	3,451	53	44	721	334	46	279	42	48	8,916	5,495	62	3,730	52	3,420
รวม	35	70,926	47,419	67	23,881	50	448	5,577	2,922	52	2,514	49	483	76,503	50,341	66	26,394	50	26,162

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 17,171 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 10,475 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 81.63 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 60.48 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 7,701 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	8,671	64	4,871	50	34.22	34.14	5.00	5.00	4,791
สิริกิติ์	8,001	84	5,151	77	43.48	46.04	49.86	50.04	1,509
ภูมิพล+สิริกิติ์	16,672	73	10,022	61	77.70	80.18	54.86	55.04	6,300
แควน้อยฯ	363	39	320	36	2.50	2.86	1.30	1.30	576
ป่าสักชลสิทธิ์	135	14	132	14	1.44	2.98	4.32	4.32	825
รวมทั้งหมด	17,171	69	10,475	58	81.63	86.01	60.48	60.66	7,701

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 7 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ห้วยหลวง (27%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (26%) อ่างฯ ลำตะคอง (21%) อ่างฯ สำนางรอง (28%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (14%) อ่างฯ ทับสลา (19%) และอ่างฯ คลองสิียด (17%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯ สิริกิติ์ (84%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำวัง แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำยม ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,148 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,157 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +20.35 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 5.35 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 750 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 700 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.65 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.78 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +10.04 ม.รทก. (เมื่อวาน +9.78 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 177 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 176 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 140 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 35 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 2 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 10 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน - ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 71 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 45 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 15 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 17 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 218 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 208 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 18 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 11 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 70 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 71 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 48 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สถานี C.29B ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 655 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 706 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		2 ส.ค. 68	3 ส.ค. 68	4 ส.ค. 68	5 ส.ค. 68	6 ส.ค. 68	7 ส.ค. 68	8 ส.ค. 68		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม.	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

3.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 7 ส.ค. 68	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	5.28	-7.52
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	10.78	-5.22
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	8.96	-3.24
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	10.53	-1.47
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	10.75	-1.75
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	12.32	-2.18

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

4. ผลกระทบด้านการเกษตร

4.1 อุทกภัย ช่วงภัย 23 ก.พ. 68 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย อุบลราชธานี สุพรรณบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 83,722 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 532,911 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 463,367 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 55,193 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 14,351 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 8,262 ราย พื้นที่ 75,280 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 68,180 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,958 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 142 ไร่ คิดเป็นเงิน 105.71 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 333 ราย พื้นที่ 2,532 ไร่ วงเงิน 3,849,451 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 68)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ เกษตรกร 6,075 ราย พื้นที่ 3,494 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 3,094 ไร่ บ่อกุ้ง 400 ไร่ กระชัง 516 ตรม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 436 ราย พื้นที่รวม 358 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 321 ไร่ บ่อกุ้ง 37 ไร่ กระชัง 57 ตรม. คิดเป็นเงิน 1,947,435 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 62 ราย พื้นที่ 93 ไร่ กระชัง 57 ตรม. วงเงิน 708,587 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 68)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย และจังหวัดพัทลุง เกษตรกร 102,318 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 3,865,920 ตัว แบ่งเป็น โค 182,825 ตัว กระบือ 52,161 ตัว สุกร 137,019 ตัว แพะ/แกะ 4,633 ตัว และสัตว์ปีก 3,489,282 ตัว แปลงหญ้า 13,352 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 68)

4.2 วาตภัย ช่วงภัย 16 ก.พ. 68 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก แพร่ นครสวรรค์ พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ปทุมธานี สระบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,744 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 10,914 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 818 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 4,115 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 5,981 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 884 ราย พื้นที่ 1,697 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 106 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 754 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 838 ไร่ คิดเป็นเงิน 4,959,692 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 756 ราย พื้นที่ 1,601 ไร่ วงเงิน 4,571,326 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. 68)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เกษตรกร 1 ราย กระชัง 50 ตรม. คิดเป็นเงิน 18,400 บาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 โดยมีแผนการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 22 หน่วย ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี ระยอง ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา และหน่วยฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2568

- การกิจการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง มีเป้าหมายช่วยเหลือบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ปละ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (สังขละบุรี ทองผาภูมิ) อุทัยธานี (บ้านไร่ ห้วยคต) สุพรรณบุรี (ด่านช้าง) ราชบุรี (บ้านโป่ง โพธาราม ปากท่อ จอมบึง) เพชรบุรี (หนองหญ้าปล้อง) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี หัวหิน)

- การกิจการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ (กาญจนบุรี) และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง/เล็ก จำนวน 1 อ่าง

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2568

- การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและเติมน้ำต้นทุนในพื้นที่การเกษตรและเขื่อนกักเก็บน้ำ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 5 สิงหาคม 2568 ปฏิบัติการ 140 วัน จำนวน 1,682 เที่ยวบิน (2,338:03 ชั่วโมงบิน) ปริมาณสารฝนหลวงที่ใช้ปฏิบัติการ 1,319.15 ตัน ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 63 จังหวัด พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง 133.13 ล้านไร่ และมีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ 29 แห่ง และขนาดกลาง/เล็ก 179 แห่ง

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 68)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ยะลา และกำแพงเพชร) จำนวน 12 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ กำจัดพืชอาศัย และเมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัว/ตร.ม. และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม
	2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครศรีธรรมราช และตาก) จำนวน 6 ไร่ การระบาดคงที่	- เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้น้ำออกจากแปลงนา
	3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชลบุรี และนครราชสีมา) จำนวน 54 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ ระหว่าง 6 :1- 8 :1 หรือ/อ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง
	4. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ และปราจีนบุรี) จำนวน 239 ไร่ การระบาดลดลง 271 ไร่	- ใช้น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าว ใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
	5. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี ปราจีนบุรี มุกดาหาร กาฬสินธุ์ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชัยนาท นครพนม นครราชสีมา สกลนคร เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ มหาสารคาม อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) จำนวน 4,966 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 619 ไร่	- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร
	6. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชัยนาท แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ ยะลา และกำแพงเพชร) จำนวน 225 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 225 ไร่	- เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
มะพร้าว	1. ดั้วงแรด 2. หนอนหัวดำ 3. แมลงดำหนาม 4. ดั้วงวง 5. โรสสีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 28 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ชุมพร สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตราด สตูล กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา กระบี่ จันทบุรี ราชบุรี ระยอง สมุทรปราการ ภูเก็ต สงขลา เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ขอนแก่น พังงา ตรัง นครปฐม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และปัตตานี) จำนวน 6,371 ไร่ <u>การระบาดลดลง 18 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 43 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ราชบุรี สงขลา ชุมพร สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์ ตราด ปัตตานี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา อุดรธานี กรุงเทพมหานคร กาฬสินธุ์ กระบี่ สุรินทร์ นครราชสีมา ภูเก็ต บุรีรัมย์ พังงา จันทบุรี นครพนม อุบลราชธานี สระแก้วหนองคาย นครปฐม สมุทรปราการ ระยอง อำนาจเจริญ ชัยนาท สตูล กาญจนบุรี มุกดาหาร สระบุรี ร้อยเอ็ด สุโขทัย สกลนคร หนองบัวลำภู และยะลา) จำนวน 53,383 ไร่ <u>การระบาดลดลง 1,181 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ชุมพร เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตราด สงขลา กระบี่ พังงา ตรัง สตูล สมุทรสงคราม ภูเก็ต จันทบุรี เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร บุรีรัมย์ ระยอง กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา นครพนม พัทลุง นครราชสีมา สมุทรปราการ สระแก้ว และอุบลราชธานี) จำนวน 8,672 ไร่ <u>การระบาดลดลง 233 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ตราด กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร พังงา ราชบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต และลำพูน) จำนวน 1,019 ไร่ <u>การระบาดลดลง 62 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา กาฬสินธุ์ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สระแก้ว ชุมพร ตราด และชัยนาท) จำนวน 723 ไร่ <u>การระบาดลดลง 67 ไร่</u>	- ปลอยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของ หนอนหัวดำ หรือปลอยแตนเบียนไข่หริโครแกรมมา เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ ใช้สารเคมีอามีแกคติน-เบนโซเอท โดยมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น และมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวเกะทิ และมะพร้าวที่ทำน้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ - ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนาม กัดกินไปเผาทำลาย ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส ควบคุม หนอนแมลงดำหนามมะพร้าว หรือแตนเบียนเตตระสตีดส์ ควบคุมด้กแด่แมลงดำหนามมะพร้าว และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ - ใช้ตาข่ายดักจับด้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อ โดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงวงในระยะหนอน และดักแด้ ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสม กับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงวงมะพร้าว - ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้ตาข่ายหรือแหจับปลามาซึ่งชาวทิศทางลมดักจับด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไรเซียม อัตรา 800 กรัม/กองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและ มะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะ หนอนและดักแด้ หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมี ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอ มะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก โดยใช้ปริมาณ 1 - 1.5 ลิตร/ต้น ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบาด - ตัดทะลายและขอดอกมะพร้าวที่โรสสีขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทั้งนอกแปลง กำจัดให้แน่นพ่นสารฆ่าไร ในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็ท่างกัน ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรสสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดย เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน
ปาล์ม น้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก 2. หนอนหัวดำ 3. หนอนหน้าแมว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช และชลบุรี) จำนวน 825 ไร่ <u>การระบาดลดลง 27 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี นครราชสีมา สกลนคร และจันทบุรี) จำนวน 825 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ระยอง สุราษฎร์ธานี สระบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 147 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน - ปลอยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ - การใช้วิธีกล ตัดใบ และใช้กับดักแสงไฟ การใช้ชีววิธี โดยพ่น แบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส และการใช้สารเคมี โดยพ่น สารฆ่าแมลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล นครศรีธรรมราช ชลบุรี ตรัง กระบี่ สงขลา ภูเก็ต ระยอง สระแก้ว และร้อยเอ็ด) จำนวน 1,318 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับดั้วแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอนและดักแด้
	5. ดั้วกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง กระบี่ ตราน นราธิวาส นครศรีธรรมราช สระบุรี และ จันทบุรี) จำนวน 515 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 11 ไร่	- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอกปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ
	6. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ชลบุรี สตูล ตราน พังงา และจันทบุรี) จำนวน 11,983 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 173 ไร่	- กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาราดหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ
	7. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราน และนครศรีธรรมราช) จำนวน 938 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ข้อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง
	8. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ชุมพร สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา ระยอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 89 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ตัดทางใบที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาพื้นที่ เก็บเศษซากพืช นำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปลอยแตนเบียนบราคอน (Bacon hebetor) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ
	9. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร) จำนวน 915 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 94 ไร่	- ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ยางพารา	1. โรคครากขาว	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราน กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,632 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 45 ไร่	- คำนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น
	2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (น่าน สุโขทัย อุตรธานี นนทบุรี สงขลา ปังกาฬ นครศรีธรรมราช ระนอง ระยอง เลย กระบี่ ลำปาง นครพนม สุราษฎร์ธานี พังงา และกาญจนบุรี) จำนวน 14,110 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 230 ไร่	- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
	3. โรคใบร่วงยางพารา	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ตราน นนทบุรี ชุมพร ตรัง จันทบุรี กระบี่ และพังงา) จำนวน 1,570 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 101 ไร่	- หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา
	4. โรคคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ปัตตานี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 760 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- รมรณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ
	5. โรคเส้นดำ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ นราธิวาส และตราน) จำนวน 144 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ
	6. อาการเปลือกแห้ง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ตรัง สกลนคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตราน นครศรีธรรมราช สุโขทัย และชลบุรี) จำนวน 5,122 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่	- เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยเคมีในช่วงปลายฤดูฝนตามคำแนะนำ เพื่อให้ใบที่ผลิออกมาใหม่สมบูรณ์และแก่เร็ว พันระยะอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
กาแฟ	1. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟ-สีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. โรคใบไหม้ 3. โรแดงมันสำปะหลัง 4. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง 5. โรคโคนเน่าหัวเน่า 6. โรคพุ่มแจ้	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ชลบุรี ราชบุรี สกลนคร สุโขทัย สระแก้ว บุรีรัมย์ และจันทบุรี) จำนวน 1,087 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 34 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชัยนาทบุรีรัมย์ ยโสธร และสกลนคร) จำนวน 306 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ชลบุรี บุรีรัมย์ ระยอง ราชบุรี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ สกลนคร สุรินทร์ มหาสารคาม เพชรบุรี และขอนแก่น) จำนวน 16,629 ไร่ การระบาดลดลง 5,685 ไร่ พื้นที่ระบาด 38 จังหวัด (นครราชสีมา กาญจนบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชลบุรี ปราจีนบุรี กำแพงเพชร บุรีรัมย์ อุทัยธานี สระแก้ว อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ชัยภูมิ ระยอง นครสวรรค์ มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ ชัยนาท ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อุดรธานี ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย อุดรดิตถ์ สกลนคร จันทบุรี ตาก นครพนม อำนาจเจริญหนองบัวลำภู และพิจิตร) จำนวน 914,966 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8,373.55 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สระแก้ว ชลบุรี และสกลนคร) จำนวน 118 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว บุรีรัมย์ และจันทบุรี) จำนวน 1,112 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียนอายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง-ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและดักแด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหารสามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะหนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วคลีโอโพลีโดโรไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรยกร่องแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัดตาก นครสวรรค์ ยะลา เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว กาฬสินธุ์ สตูล และขอนแก่น) จำนวน 694 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 310 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป็นตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว 3. โรคเส้ดำ 4. ดั้วหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชลบุรี เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา) จำนวน 1,645 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร หนองบัวลำภู อุดรธานี และอุทัยธานี) จำนวน 27,799 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,138 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุทัยธานี และขอนแก่น) จำนวน 156 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (บุรีรัมย์ และขอนแก่น) จำนวน 167 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชยปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาวหมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก - โรคเส้ดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบและฉีดพ่นในเวลาเย็น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 1,065 ไร่ การระบาดคงที่	- เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโปรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร
	2. เพลี้ยไก่แจ้	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา สุราษฎร์ธานี ตราด ชุมพร กระบี่ สงขลา นราธิวาส ระยอง และพังงา) จำนวน 968 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 17 ไร่	- เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอามีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอามีโทกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน
	3. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ชุมพร ยะลา จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ตราด นครศรีธรรมราช ระยอง และกระบี่) จำนวน 354 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย
	4. หนอนเจาะผล	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา และจันทบุรี) จำนวน 163 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไพโรพาร์ไกต์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซัลอัตรา 40 มล.
	5. ไรแดง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระยอง กระบี่ ตราด และนราธิวาส) จำนวน 945 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	- โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
	6. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด ยะลา สงขลา ระยอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี กระบี่ ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต สตูล และจังหวัดระนอง) จำนวน 4,465 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 78 ไร่	- เมื่อพบการระบาดโรคใบติดหรือใบไหม้มากควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ
	7. โรคใบติดหรือใบไหม้	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ยะลา จันทบุรี ตราด ชุมพร นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี และระนอง) จำนวน 550 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่	- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคร้ายคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
	8. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ยะลา ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และกระบี่) จำนวน 1,186 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่	- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ
	9. เพลี้ยหอยเกล็ด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และนราธิวาส) จำนวน 774 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่	- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือไซเพอร์เมทริน/ไพซาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน
	10. เพลี้ยจักจั่นฝอย	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตราด ระยอง ปราจีนบุรี กระบี่ สงขลา ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 994 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 47 ไร่	- เมื่อพบคราบราสีดำ พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดำ และสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง
	11. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตราด และสุรินทร์) จำนวน 104 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคราที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด
	12. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (นครศรีธรรมราช จันทบุรี ชุมพร ตราด สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกระบี่) จำนวน 193 ไร่ การระบาดคงที่	- ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
	13. มอดเจาะลำต้น ทุเรียน	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี ยะลา ตราด และสงขลา) จำนวน 108 ไร่ การระบาดคงที่	- มอดเจาะลำต้น ควรตัดและเผาทิ้ง สำหรับส่วนของต้น ทุเรียนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้

- หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน ให้เขย่ากิ่ง ตัวหนอนคืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดิน สามารถจับทำลายได้ หรือใช้กับดักแสง ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	14. หนอนกินใบ 15. โรคกิ่งแห้ง 16. โรคแอนแทรคโนส 17. หนอนเจาะเมล็ด 18. โรคผลเน่าทุเรียน	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตราด และ สุรินทร์) จำนวน 314 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 19 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด ยะลา จันทบุรี ปราจีนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสงขลา) จำนวน 697 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร ยะลา และจันทบุรี) จำนวน 420 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด จังหวัด (ยะลา ปัตตานี ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส) จำนวน 774 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา และกระบี่) จำนวน 185 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่ให้รกทึบ และกำจัดวัชพืชในสวนเพื่อลดความชื้น หากพบการระบาดเพียงเล็กน้อย ควรตัดส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกสวน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นตรวจตราผลทุเรียนในแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงผลใกล้แก่ หากพบอาการผลเป็นจุดเน่า ควรทำการฉีดพ่นสารเคมี เช่น เมตาแลกซิล 25% WP หรือ เมตาแลกซิลผสมแมนโคเซป หรือ ฟอสเอทิล อะลูมิเนียม 80% WP ให้ทั่วทั้งต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 55 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 300 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 186 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 22 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และจันทบุรี) จำนวน 145 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ 4. โรคใบจุด 5. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 270 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระยอง นราธิวาส พังงา และยะลา) จำนวน 408 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 332 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และระยอง) จำนวน 270 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร นราธิวาส และตรัง) จำนวน 571 ไร่ การระบาดลดลง 11 ไร่	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้ง โดยการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง - เมื่อพบใบอ่อนมังคุด ถูกทำลายเกิน 20% ให้พ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน - เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 30-80 กรัม - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ - ตัดแต่งกิ่งมังคุด จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ย - เมื่อพบไรแดงหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 80 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน
	2. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 270 ไร่ การระบาดคงที่	- พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบตาไซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม
	3. โรคพุ่มไม้กวาด	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 163 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง
	4. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 24 ไร่ การระบาดคงที่	- เชยาก็ให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแต่ไปทำลาย
	5. โรคโรก้ามะหยี่	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 50 ไร่ การระบาดคงที่	- หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปดาไซฮาโลทรีน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร
	6. หนอนม้วนใบ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 42 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาด ให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกโรทำลายนำไปเผาทั้งนอกแปลงปลูก
	7. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- หมั่นตรวจ ถ้าพบให้เก็บทำลาย หากระบาดรุนแรงมาก ควรฉีดพ่นด้วยยาโมโนโครโตฟอส ในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยไพรีทรอยด์อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร - ตัดส่วนที่ถูกทำลายที่มีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่ที่มาเล่นไฟกลางคืนไปทำลาย - จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย หากพบระบาดมาก ใช้ยาฆ่าแมลงพวก โมโนโครโตฟอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในช่วงฤดูแล้งขณะที่อยู่ในดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3 ครั้ง

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2568

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 12 จังหวัด 16 จุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา ศรีสะเกษ เลย สุรินทร์ อุบลราชธานี มุกดาหาร อุดรธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ และพบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 1 จุด ในพื้นที่จังหวัดเลย

พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 134 จุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด น่าน กำแพงเพชร อุดรดิตถ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา