



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  
วันที่ 22 มกราคม 2568 (เวลา 15.00 น.)

## 1. สภาพอากาศ

### 1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอย และยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่งบริเวณยอดดอย ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็น และระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้ง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้ : การระบายของอากาศไม่ดีและลมอ่อน ทำให้การสะสมของฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากถึงมาก

### 1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 21 ม.ค. 68 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 22 ม.ค. 68



| ที่ | อำเภอ   | จังหวัด       | ปริมาณฝน (มม.) | ความรุนแรง   |
|-----|---------|---------------|----------------|--------------|
| 1   | อ.เมือง | นครศรีธรรมราช | 0.1            | ฝนตกเล็กน้อย |

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)  
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

## 2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 68)

### 2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 57,673 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 33,731 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (56,231 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) มากกว่าปี 2567 จำนวน 1,442 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 34.79 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 153.74 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 18,679 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 53,989 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 30,360 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (52,201 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) มากกว่า ปี 2567 จำนวน 1,697 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 27.13 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 132.99 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,042 ล้าน ลบ.ม.

| ภาค      | ขนาดใหญ่        |                       |           |           |        |             | ขนาดกลาง        |                       |           |           |        |             | รวม             |                       |           |           |        |             | รับได้อีก |
|----------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|
|          | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             |           |
|          |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |           |
| เหนือ    | 8               | 24,825                | 19,071    | 77        | 12,326 | 68          | 80              | 1,083                 | 899       | 83        | 808    | 81          | 88              | 25,908                | 19,970    | 77        | 13,134 | 69          | 5,952     |
| ตอน.     | 12              | 8,368                 | 5,520     | 66        | 3,868  | 58          | 226             | 2,061                 | 1,374     | 67        | 1,209  | 64          | 238             | 10,429                | 6,894     | 66        | 5,077  | 59          | 3,535     |
| กลาง     | 3               | 1,419                 | 933       | 66        | 873    | 64          | 27              | 419                   | 262       | 63        | 236    | 60          | 30              | 1,838                 | 1,195     | 65        | 1,109  | 63          | 643       |
| ตะวันตก  | 2               | 26,605                | 21,428    | 81        | 8,151  | 51          | 8               | 164                   | 86        | 53        | 75     | 49          | 10              | 26,769                | 21,514    | 80        | 8,225  | 61          | 5,255     |
| ตะวันออก | 6               | 1,515                 | 950       | 63        | 856    | 60          | 52              | 1,006                 | 625       | 62        | 569    | 60          | 58              | 2,520                 | 1,575     | 62        | 1,424  | 60          | 945       |
| ใต้      | 4               | 8,194                 | 5,996     | 73        | 4,286  | 66          | 42              | 680                   | 529       | 78        | 475    | 76          | 46              | 8,874                 | 6,525     | 74        | 4,761  | 67          | 2,349     |
| รวม      | 35              | 70,926                | 53,898    | 76        | 30,360 | 64          | 435             | 5,411                 | 3,775     | 70        | 3,372  | 68          | 470             | 76,338                | 57,673    | 76        | 33,731 | 64          | 18,679    |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 18,939 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 12,243 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 67) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 8.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 66.43 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 5,932 ล้าน ลบ.ม.

| อ่างเก็บน้ำ     | ปริมาณน้ำในอ่างฯ |               | ปริมาณน้ำใช้การได้ |             | ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ |          | ปริมาณน้ำระบาย |          | ปริมาณน้ำ<br>รับได้อีก |
|-----------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|------------------------|
|                 | ปริมาณน้ำ        | % ความจุอ่างฯ | ปริมาณน้ำ          | % น้ำใช้การ | วันนี้              | เมื่อวาน | วันนี้         | เมื่อวาน |                        |
| ภูมิพล          | 9,683            | 72            | 5,883              | 61          | 3.27                | 3.13     | 31.00          | 31.00    | 3,779                  |
| สิริกิตี        | 7,857            | 83            | 5,007              | 75          | 2.95                | 5.20     | 28.07          | 28.00    | 1,653                  |
| ภูมิพล+สิริกิตี | 17,540           | 76            | 10,890             | 67          | 6.22                | 8.33     | 59.07          | 59.00    | 5,432                  |
| แควน้อยฯ        | 729              | 78            | 686                | 77          | 0.75                | 0.73     | 2.59           | 2.59     | 210                    |
| ป่าสักชลสิทธิ์  | 670              | 70            | 667                | 70          | 1.12                | 1.12     | 4.77           | 4.76     | 290                    |
| รวมทั้งหมด      | 18,939           | 76            | 12,243             | 67          | 8.10                | 10.17    | 66.43          | 66.35    | 5,932                  |

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปของความจุอ่างฯ จำนวน 7 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ สิริกิตี (83%) อ่างฯ แม่งัดสมบูรณ์ชล (105%) อ่างฯ อ่างฯ กี้วลม (89%) อ่างฯ กี้วคอบหมา (95%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (81%) อ่างฯ หนองปลาไหล (90%) และอ่างฯ บางยาง (87%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯ ลำตะคอง (26%)

## 2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 486 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 483 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.10 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.60 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 80 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 90 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.64 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.59 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.49 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.61 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 145 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 143 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 116 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช ) 20 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 9 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 10 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 10 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 75 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 64 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 9 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 42 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 205 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 205 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 16 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 9 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 65 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 81 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 34 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 139 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 124 ลบ.ม./วินาที)

## 2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

| แม่น้ำ    | จุดเฝ้าระวัง                | ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร) |            |            |            |            |            |            | เกณฑ์ | หมายเหตุ                                                                          |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           |                             | 16 ม.ย. 68              | 17 ม.ย. 68 | 18 ม.ย. 68 | 19 ม.ย. 68 | 20 ม.ย. 68 | 21 ม.ย. 68 | 22 ม.ย. 68 |       |                                                                                   |
| เจ้าพระยา | ปากคลองลำแล จ.ปทุมธานี      | 0.16                    | 0.16       | 0.16       | 0.16       | 0.16       | 0.16       | 0.16       | ปกติ  | - เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร<br>- เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร |
| เจ้าพระยา | ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี      | 0.19                    | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.19       | 0.20       | 0.20       | ปกติ  | - เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร                                      |
| เจ้าพระยา | ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม. | 0.20                    | 0.21       | 0.22       | 0.21       | 0.20       | 0.21       | 0.21       | ปกติ  |                                                                                   |

## 2.4 สถานการณ์น้ำโขง

| สถานี                    | ระดับตลิ่ง | ระดับน้ำ<br>22 ธ.ค. 68 | + สูงกว่าตลิ่ง<br>- ต่ำกว่าตลิ่ง |
|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------------|
| อ.เชียงแสน จ.เชียงราย    | 12.80      | 2.43                   | -10.37                           |
| อ.เชียงคาน จ.เลย         | 16.00      | 4.39                   | -11.61                           |
| อ.เมือง จ.หนองคาย        | 12.20      | 1.44                   | -10.76                           |
| อ.เมือง จ.นครพนม         | 12.00      | 1.59                   | -10.41                           |
| อ.เมือง จ.มุกดาหาร       | 12.50      | 1.91                   | -10.59                           |
| อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 14.50      | 2.35                   | -12.15                           |

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


## 3. การจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2567/68

**แผนการจัดการน้ำ** โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2567/68 (วันที่ 1 พ.ย.67 ถึง 30 เม.ย.68) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้งานได้ จำนวน 39,405 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดการน้ำทั่วประเทศ จำนวน 29,170 ล้าน ลบ.ม.

**ผลการจัดการน้ำ** ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 12,294 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 ของแผนจัดการน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใช้น้ำไป 66.43 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 4,009 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45 ของแผนจัดการน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

| พื้นที่          | แผนการจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2567/68 (1 พ.ย.67 - 30 เม.ย.68) |                        |          |            |        | ผลการจัดการน้ำ |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|--------|----------------|----------------|
|                  | อุปโภค-บริโภค                                                   | รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ | การเกษตร | อุตสาหกรรม | รวม    | ปริมาณน้ำ      | % แผนจัดการน้ำ |
| ทั่วประเทศ       | 3,050                                                           | 8,765                  | 16,555   | 800        | 29,170 | 12,294         | 42             |
| ลุ่มน้ำเจ้าพระยา | 1,150                                                           | 1,305                  | 6,410    | 135        | 9,000  | 4,009          | 45             |



## 4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2567/68

**แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2567/68**

**ทั่วประเทศ** จำนวน 15.38 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12.73 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.65 ล้านไร่  
**ลุ่มน้ำเจ้าพระยา** จำนวน 8.81 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.05 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.76 ล้านไร่

**ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2567/68** (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2568)

**ทั่วประเทศ** จำนวน 10.70 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 9.64 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.06 ล้านไร่  
**ลุ่มน้ำเจ้าพระยา** จำนวน 7.45 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.10 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.35 ล้านไร่

| ขอบเขตพื้นที่                    | พื้นที่แหล่งน้ำ | แผนการเพาะปลูก ปี 2567/68 |               |       | สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2567/68 |               |                | % ผลปลูก<br>ข้าวรอบ 2<br>เทียบกับแผน |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
|                                  |                 | ข้าวรอบที่ 2              | พืชไร่ พืชผัก | รวม   | ข้าวรอบที่ 2                    | พืชไร่ พืชผัก | รวม<br>ทั้งหมด |                                      |
| ทั่วประเทศ<br>(77 จังหวัด)       | ในเขตชลประทาน   | 10.02                     | 0.62          | 10.64 | 7.95                            | 0.41          | 8.36           | 79                                   |
|                                  | นอกเขตชลประทาน  | 2.71                      | 2.03          | 4.74  | 1.69                            | 0.65          | 2.34           | 62                                   |
|                                  | รวม             | 12.73                     | 2.65          | 15.38 | 9.64                            | 1.06          | 10.70          | 76                                   |
| ลุ่มน้ำเจ้าพระยา<br>(22 จังหวัด) | ในเขตชลประทาน   | 6.47                      | 0.09          | 6.56  | 5.97                            | 0.15          | 6.12           | 92                                   |
|                                  | นอกเขตชลประทาน  | 1.58                      | 0.67          | 2.25  | 1.13                            | 0.20          | 1.33           | 72                                   |
|                                  | รวม             | 8.05                      | 0.76          | 8.81  | 7.10                            | 0.35          | 7.45           | 88                                   |

## 5. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 68)

### 5.1 อุทกภัยภาคใต้ ช่วงภัย 20 พ.ย. 67 - ปัจจุบัน

**ด้านพืช** ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ตรัง ปัตตานี ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 91,641 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 187,557 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 56,804 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 14,107 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 116,646 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 9,044 ราย พื้นที่ 28,853 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 16,316 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,439 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 9,098 ไร่ คิดเป็นเงิน 65.50 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 540 ราย พื้นที่ 1,747 ไร่ วงเงิน 3,214 ล้านบาท

**ด้านประมง** ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 11,149 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 26,320 ไร่ (บ่อปลา 15,601 ไร่ บ่อกุ้ง 10,719 ไร่) กระชัง 76,003 ตอม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 9,360 ราย พื้นที่รวม 20,931 ไร่ กระชัง 73,193 ตอม. คิดเป็นเงิน 175.04 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 554 ราย พื้นที่ 414 ไร่ กระชัง 432 ตอม. วงเงิน 2.16 ล้านบาท

**ด้านปศุสัตว์** ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 204,668 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 12,128,023 ตัว แบ่งเป็น โค 390,074 ตัว กระบือ 13,860 ตัว สุกร 311,672 ตัว แพะ/แกะ 203,429 ตัว และสัตว์ปีก 11,208,988 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 7,496.10 ไร่

### 5.2 ดินโคลนถล่ม ช่วงภัย 16 ก.ค. - 4 ต.ค. 67

**ด้านพืช** ได้รับความเสียหาย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เลย สุรินทร์ และจังหวัดหนองคาย **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 895 ราย พื้นที่ 1,124 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 963 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 116 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 44 ไร่ คิดเป็นเงิน 7.86 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 502 ราย พื้นที่ 525 ไร่ วงเงิน 3.12 ล้านบาท

**ด้านประมง และด้านปศุสัตว์** ไม่ได้รับผลกระทบ

### 5.3 อุทกภัย ช่วงภัย ช่วงภัย 16 ก.ค. - 31 ต.ค. 67

**ด้านพืช** ได้รับความเสียหาย 53 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กระบี่ ตรัง ยะลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 156,682 ราย พื้นที่ 1,204,729 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 1,061,219 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 130,350 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 13,160 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,733.45 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 60,240 ราย พื้นที่ 387,869 ไร่ วงเงิน 552.74 ล้านบาท

**ด้านประมง** ได้รับความเสียหาย 46 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตรัง ภูเก็ต ยะลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 10,992 ราย พื้นที่รวม 13,310 ไร่ กระชัง 8,593 ตอม. คิดเป็นเงิน 68.72 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 5,343 ราย พื้นที่ 5,424 ไร่ กระชัง 6,505 ตอม. วงเงิน 28.10 ล้านบาท

**ด้านปศุสัตว์** ได้รับความเสียหาย 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม มหาสารคาม เลย หนองคาย อุบลราชธานี ตราด และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,413 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 140,491 ตัว แบ่งเป็น โค 197 ตัว กระบือ 34 ตัว สุกร 128 ตัว แพะ/แกะ 52 ตัว และสัตว์ปีก 140,080 ตัว แปลงหญ้า 500 ไร่ วงเงิน 13.66 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,120 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 96,726 ตัว แปลงหญ้า 170 ไร่ วงเงิน 7.02 ล้านบาท

## 6. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 19 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ แพร่ พิจิตรโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี ระยอง ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

### สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 22 มกราคม 2568

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567

- หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ ระยอง กาญจนบุรี และหน่วยฯ อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ติดตาม เฝ้าระวังและช่วงชิงสภาพอากาศ 1 หน่วย คือ หน่วยฯ จังหวัดตาก

### สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 21 มกราคม 2568)

การปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นปฏิบัติการ 51 วัน จำนวน 830 เที่ยวบิน (1,339:55 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 201,360 ตัน ปริมาณการใช้น้ำ 624,240 ลิตร ปฏิบัติการ จำนวน 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยฯ อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ตาก ระยอง กาญจนบุรี และหน่วยฯ จังหวัดแพร่ ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พิจิตรโลก แพร่ น่าน สุโขทัย พิจิตร และอุดรดิตถ์

## 7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 68)

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                | สถานการณ์                                                                                                                             | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้าว    | 1. โรคไหม้ข้าว          | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร อุบลราชธานี ชัยนาท และฉะเชิงเทรา)<br>จำนวน 159 ไร่ การระบาดลดลง 210 ไร่ | - ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร                                                                                            |
|         | 2. หนอนห่อใบข้าว        | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร ชลบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา และระนอง)<br>จำนวน 88 ไร่ การระบาดคงที่       | - กำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัยของหนอนกระทู้กล้า ถ้ามีความจำเป็นในการใช้สารเคมีควรสวมหน้ากากได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 20 มล. หรือเฟนิโตรไทออน อัตรา 30 มล. เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลาย        |
|         | 3. เพลี้ยกระโดดหลังขาว  | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 867 ไร่ การระบาดลดลง 432 ไร่                       | - หากสำรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว ป้องกันโดย ฟันเชื้อราชีวเวอร์เรีย อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว แต่หากสถานการณ์รุนแรงและจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลง ควรใช้อัตราตามฉลากแนะนำ                                                     |
|         | 4. เพลี้ยไฟ             | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาญจนบุรี)<br>จำนวน 1 ไร่ การระบาดคงที่                                                                       | - หมั่นสำรวจแปลงข้าวอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เซฟวิน 85% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร                                                                                                       |
|         | 5. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ฉะเชิงเทรา และพัทลุง)<br>จำนวน 534 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 347 ไร่                          | - เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ใช้สาร อีโทเฟนพรอกซ์ คาร์โบซัลแฟน ไอโซไพแรcarb ฟิโนบูคาร์บ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่น ทุก 7 วัน                                                                                                         |
|         | 6. โรคขอบใบแห้ง         | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครราชสีมา สกลนคร ชัยนาท และราชบุรี)<br>จำนวน 36 ไร่ การระบาดคงที่                                            | - ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่น ทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคขอบใบข้าว แนะนำให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไอโซไพแรcarb คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ สเตอโรโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตตราไซคลิน |
|         | 7. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ สกลนคร และ จันทบุรี)<br>จำนวน 21 ไร่ การระบาดคงที่                                                  | - ไอโซไพแรcarb ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 8. โรคใบสีส้ม           | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กาฬสินธุ์ และสกลนคร)<br>จำนวน 5 ไร่ การระบาดคงที่                                                             | - แนะนำเกษตรกรการใช้แสงไฟล่อแมลงและทำลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง                                                                                                                                                                                                 |
|         | 9. แมลงบั่ว             | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (พิจิตร พิจิตรโลก อุทัยธานี และชัยนาท)<br>จำนวน 2,849 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1,296 ไร่                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ชนิดพืช         | ศัตรูพืช                                                                                      | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 10. โรคใบขีดสีน้ำตาล                                                                          | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา มหาสารคาม และสกลนคร)<br>จำนวน 54 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงในระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก<br>- ใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัม/ไร่ สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ หากพบโรคระบาดของโรครุนแรงในระยะแตกกอ ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| มะพร้าว         | 1. หนอนหัวดำ<br><br>2. ดั้วงวง<br><br>3. แมลงดำหนาม<br><br>4. ดั้วแรด<br><br>5. ไรสีขามะพร้าว | พื้นที่ระบาด 29 จังหวัด (นครราชสีมา มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 43,750 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 113 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี จันทบุรี กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช เพชรบุรี พังงา ระยอง และบุรีรัมย์)<br>จำนวน 1,073 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (นครราชสีมา มุกดาหาร กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 12,692 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 84 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (นครราชสีมา ร้อยเอ็ด กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สงขลา ปัตตานี สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 5,891 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี จันทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สระแก้ว ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร ตราด และชัยนาท)<br>จำนวน 480 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 11 ไร่</u> | - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปลอ่ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปลอ่ยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปลอ่ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกตินเบนโซเอท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน<br>- ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้<br>- แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงดำหนามกัดกินไปเผาทำลาย ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเตส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว<br>- ป้องกันกำจัดให้น้ำมันพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง<br>- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และเก็บเศษซากพืชนำไปเผานอกแปลงทันที |
| ปาล์ม<br>น้ำมัน | 1. หนอนปลอกเล็ก<br><br>2. ดั้วแรด<br><br>3. ดั้วกู่หลาย                                       | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ชลบุรี และสตูล)<br>จำนวน 518 ไร่ <u>การระบาดลดลง 5 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล กระบี่ นครศรีธรรมราช ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ตรัง และร้อยเอ็ด)<br>จำนวน 1,160 ไร่ <u>การระบาดลดลง 25 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ ชลบุรี สตูล ตราด สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และจันทบุรี)<br>จำนวน 873 ไร่ <u>การระบาดลดลง 47 ไร่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน<br>- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียมเพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน<br>- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ชนิดพืช     | ศัตรูพืช                                                                                                | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 4. โรคลำต้นเน่า<br><br>5. โรคทะลายเน่า<br><br>6. โรคใบจุด<br><br>7. โรคใบจุดสาหร่าย<br><br>8. หนอนหัวดำ | พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,580 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 39 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตราด นราธิวาส นครศรีธรรมราช และระนอง) จำนวน 47 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง ชุมพร สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 78 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 344 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจันทบุรี) จำนวน 761 ไร่ การระบาดคงที่                                  | - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิดโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด<br>- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง<br>- ตัดแต่งใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ<br>- ตัดแต่งใบที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาในที่ เก็บเศษซากพืช นำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ |
| ยางพารา     | 1. โรครากขาว<br><br>2. โรคใบร่วงยางพารา<br><br>3. โรคหนำียงแห้ง<br><br>4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา   | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,494 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ตราด หนองคาย กระบี่ ชุมพร ปัตตานี พังงา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 3,152 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ร้อยเอ็ด สกลนคร ชลบุรี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,700 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (ยะลา นราธิวาส สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง น่าน สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สตูล อุตรดิตถ์ พังงา หนองคาย บึงกาฬ เชียงราย กระบี่ พะเยา ระนอง เลย ภูเก็ต และระยอง) จำนวน 9,087 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 696,011 ไร่ | - คำนวณหาวิธีการป้องกันกำจัดโรครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาตามากกว่า 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น<br>- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา<br>- รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ<br>- เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือ จนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ                                                                                                     |
| กาแฟ        | 1. โรคราสนิม<br><br>2. หนอนกาแฟสีแดง<br><br>3. มอดเจาะเมล็ดกาแฟ                                         | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และชุมพร) จำนวน 24 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง<br>- เมื่อสำรวจพบมอดเจาะผลกาแฟให้วางกับดักสารล่อ (เมทิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ อัตรา 1 : 1) อัตรา 5-10 กับดัก/ไร่ และเดิมสารล่อทุก ๆ 2 สัปดาห์ และใช้เชื้อราบีวเวเรีย DOA B18 (Beauveria bassiana DOA B18) อัตรา 1 - 2 ถุง/น้ำ 10 ลิตร ผสมสารจับใบฉีดพ่นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต                                                                                                                                                                                                 |
| มันสำปะหลัง | 1. เพลี้ยแป้ง<br>มันสำปะหลัง<br><br>2. ไรแดงมันสำปะหลัง                                                 | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (แพร่ ศรีสะเกษ สกลนคร สระบุรี อุบลราชธานี จันทบุรี ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 307 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 42 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา กาฬสินธุ์ อุทัยธานี ชลบุรี อุตรดิตถ์ ตาก สุรินทร์ สกลนคร ระยอง บุรีรัมย์ และหนองบัวลำภู) จำนวน 428 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 105 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง<br>- ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน<br>- ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและ ดักด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหาร สามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะ                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ชนิดพืช                | ศัตรูพืช                                                                             | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า<br>4. โรคพุ่มแจ้<br>5. โรคใบไหม้<br>6. โรคใบด่าง<br>มันสำปะหลัง | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี ลำพูน นครราชสีมา และสกลนคร)<br>จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชลบุรี)<br>จำนวน 316 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ศรีสะเกษ)<br>จำนวน 131 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 41 จังหวัด (นครราชสีมา กาญจนบุรี อุบลราชธานี ลพบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุทัยธานี ปราจีนบุรี ชลบุรี กำแพงเพชร นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ สระแก้ว ระยอง ยโสธร มหาสารคาม บุรีรัมย์ ชัยนาท สระบุรี มุกดาหาร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุดรธานี เพชรบูรณ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี ร้อยเอ็ด อุดรดิตถ์ เพชรบุรี พิจิตร สุโขทัย หนองบัวลำภู ตาก พิชญโลก สกลนคร เลย นครพนม จันทบุรี และหนองคาย)<br>จำนวน 1,229,950 ไร่ การระบาดลดลง 16,870 ไร่ | หนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พบด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วอลโวโวลิวโรไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน<br>- ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ<br>- ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี้ยง การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ<br>- ควรกรร่งแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม<br>- โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค ปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียน อายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็นทางเลือก สุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง |
| ข้าวโพด<br>เลี้ยงสัตว์ | 1. หนอนกระทู้ข้าวโพด<br>ลายจุด (fall armyworm)                                       | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี สตูล และมหาสารคาม)<br>จำนวน 24 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สับปะรด                | 1. โรคเหี่ยว                                                                         | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และประจวบคีรีขันธ์)<br>จำนวน 325 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและปักตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| อ้อย                   | 1. หนอนกออ้อย<br>2. โรคใบขาว                                                         | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา อุดรธานี และ ขอนแก่น)<br>จำนวน 119 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา และ มหาสารคาม)<br>จำนวน 236 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้ อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปลอ้ยแต่นเบียนไซไตรโครแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง<br>- ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ทุเรียน                | 1. เพลี้ยไฟ<br>2. เพลี้ยไก่แจ้<br>3. เพลี้ยแป้ง<br>4. หนอนเจาะผล<br>5. ไรแดง         | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 705 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 36 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ตราด นครศรีธรรมราช ยะลา จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา กระบี่ ระนอง ระยอง สตูล และพังงา)<br>จำนวน 450 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร ตราด จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช และกระบี่)<br>จำนวน 122 ไร่ การระบาดลดลง 62 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครศรีธรรมราช และชุมพร)<br>จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ราษฎร์ธานี ระยอง จันทบุรี นครศรีธรรมราช ตราด ชุมพร ระนอง และยะลา)<br>จำนวน 1,108 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 33 ไร่                                                                 | - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโพรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สาร ผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอะมีทอกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีทอกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน<br>- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการ ควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย<br>- เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์โกด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซีอัตรา 40 มล.<br>- โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา                                                                  |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช              | สถานการณ์                                                                                                                                                                                      | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 6. โรครากเน่าโคนเน่า  | พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตราด สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา ระยอง ปัตตานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ภูเก็ต และระนอง)<br>จำนวน 4,204 ไร่ การระบาดลดลง 245 ไร่ | - เมื่อพบการระบาดของโรคใบติดหรือใบไหม้มากควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ          |
|         | 7. โรคใบติดหรือใบไหม้ | พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (สงขลา ยะลา จันทบุรี ตราด ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,212 ไร่ การระบาดลดลง 39 ไร่                                                     | - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาด พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช                                                                                           |
|         | 8. โรคใบจุดสาหร่าย    | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ยะลา นครศรีธรรมราช ตราด และสงขลา)<br>จำนวน 960 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 23 ไร่                                                                | - หากพบเพลี้ยหอยเกิดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสม ไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาด รุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ                                                                    |
|         | 9. เพลี้ยหอยเกล็ด     | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด จันทบุรี ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ และยะลา)<br>จำนวน 197 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่                                                                       | - เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือ ไซเปอร์เมทรินโฟซาลอน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้ สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน |
|         | 10. เพลี้ยจักจั่นฝอย  | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ตราด ระยอง กระบี่ ระนอง และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 750 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่                                                         | - เมื่อพบคราบราสีดํา พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดํา และ สารเหนียวที่แมลงปากดูดซับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อ สาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง                                                                        |
|         | 11. โรคราดำ           | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร)<br>จำนวน 64 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่                                                                                  | - ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบ อาการของโรคราดำที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด                                     |
|         | 12. โรคราสีชมพู       | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่)<br>จำนวน 196 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 40 ไร่                                                                    | - ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัด ด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน                                                    |
|         | 13. หนอนเจาะเมล็ด     | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สตูล)<br>จำนวน 0.15 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| เงาะ    | 1. เพลี้ยแป้ง         | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 24 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                              | - ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกอบ โคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง                                                                                                                    |
|         | 2. โรคใบจุดสาหร่าย    | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงราย จันทบุรี นราธิวาส และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 233 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่                                                                                  | - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่ง ทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์                                                                                                     |
|         | 3. หนอนคืบกินใบ       | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 126 ไร่ การระบาดลดลง 25 ไร่                                                                                                                         | - หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกร พ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร                                                                                                           |
|         | 4. โรคราแป้ง          | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และจันทบุรี)<br>จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                     | - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่น นำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล                                                                                                       |
| มังคุด  | 1. เพลี้ยไฟ           | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ตราด จันทบุรี ชุมพร ระยอง และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 256 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่                                                                                        | - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้งขณะที่ มังคุดอยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง                                                                            |
|         | 2. หนอนกินใบ          | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ระยอง ชุมพร และระนอง)<br>จำนวน 379 ไร่ การระบาดลดลง 23 ไร่                                                                                      | - เมื่อพบใบอ่อนมังคุด ถูกทำลายเกิน 20% ให้พ่นด้วย สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน                                                                       |
|         | 3. หนอนขอนใบ          | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 309 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่                                                                                                          | - เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วย สารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการ                                                                                                      |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                             | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 4. โรคใบจุด<br>5. โรคแอนแทรคโนส<br>6. โรคใบจุดสาหร่าย                | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 189 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร)<br>จำนวน 40 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส)<br>จำนวน 475 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่                                                                                                               | ระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน<br>- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มั่งคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 30-80 กรัม<br>- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ลำไย    | 1. เพลี้ยแป้ง<br>2. โรคคราดำ<br>3. โรคพุ่มไม้กวาด<br>4. หนอนคืบกินใบ | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร)<br>จำนวน 96 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา สระแก้ว และจันทบุรี)<br>จำนวน 239 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว)<br>จำนวน 120 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ | - หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน<br>- พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม<br>- หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง<br>- เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแต่ไปทำลาย หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมบ์ดาไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร |

## 8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 21 มกราคม 2568

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 5 จังหวัด 5 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปราชินบุรี บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้

พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 104 จุด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี สงขลา ชลบุรี บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร สุรินทร์ ระยอง ปราชินบุรี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ ฉะเชิงเทรา เลย สมุทรปราการสระแก้ว นครนายก พัทลุง มหาสารคาม ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช มุกดาหาร เชียงราย อุตรดิตถ์ และจังหวัดยโสธร และไม่พบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่