



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 16 ตุลาคม 2568 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 07:00

ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงจากเมื่อวาน เว้นแต่ภาคใต้มีเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประเทศไทย อ่าวไทย และทะเลอันดามัน ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 15 ต.ค. 68 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 16 ต.ค. 68



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.แม่ใจ	พะเยา	62.3	ฝนตกหนัก
2	อ.สอยดาว	จันทบุรี	54.8	ฝนตกหนัก
3	อ.กำแพงแสน	นครปฐม	43.4	ฝนตกหนัก
4	อ.เด่นชัย	แพร่	42.2	ฝนตกหนัก
5	อ.คีรีมาศ	สุโขทัย	35.4	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 68)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 66,833 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 87 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 42,883 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (61,612 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81) มากกว่าปี 2567 จำนวน 5,221 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 420.01 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 235.65 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 9,697 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 62,237 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 88 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 38,698 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (57,524 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81) มากกว่าปี 2567 จำนวน 4,713 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 298.65 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 141.18 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 8,714 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	23,482	95	16,737	93	87	1,145	1,037	91	945	90	95	25,970	24,520	94	17,682	92	1,469
ตอน.	12	8,368	7,507	90	5,855	87	230	2,122	1,923	91	1,753	90	242	10,490	9,430	90	7,608	88	1,060
กลาง	3	1,419	1,071	75	1,011	74	27	419	345	82	319	81	30	1,838	1,416	77	1,330	76	421
ตะวันตก	2	26,605	23,201	87	9,924	74	8	164	92	57	81	53	10	26,769	23,294	87	10,006	74	3,475
ตะวันออก	6	1,515	1,216	80	1,122	79	52	1,009	884	88	828	87	58	2,524	2,100	83	1,950	82	430
ใต้	4	8,194	5,759	70	4,048	62	44	721	314	44	259	39	48	8,916	6,073	68	4,308	60	2,843
รวม	35	70,926	62,237	88	38,698	82	448	5,579	4,596	82	4,185	81	483	76,506	66,833	87	42,883	82	9,697

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 23,477 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 94 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 16,781 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 92) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 123.88 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 65.29 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 1,401 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ ได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	12,463	93	8,663	90	41.04	45.11	9.94	4.99	999
สิริกิตี	9,213	97	6,363	96	36.13	33.40	25.10	30.01	297
ภูมิพล+สิริกิตี	21,676	94	15,026	92	77.17	78.51	35.04	35.00	1,296
แควน้อยฯ	946	101	903	101	14.49	13.98	12.96	12.96	-
ป่าสักชลสิทธิ์	855	89	852	89	32.22	31.85	17.29	12.96	105
รวมทั้งหมด	23,477	94	16,781	92	123.88	124.34	65.29	60.92	1,401

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 21 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (93%) อ่างฯ สิริกิตี (97%) อ่างฯ แม่งัดสมบูรณ์ชล (103%) อ่างฯ แม่กวดุมธรรมา (88%) อ่างฯ กิ่วคอหมา (95%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (101%) อ่างฯ แม่มอก (103%) อ่างฯ ห้วยหลวง (95%) อ่างฯ น้ำอูน (98%) อ่างฯ จุฬาภรณ์ (96%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (97%) อ่างฯ ลำปาว (95%) อ่างฯ สิรินคร (93%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (89%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (85%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (91%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (96%) อ่างฯ บางพระ (101%) อ่างฯ หนองปลาไหล (94%) อ่างฯ ประแสร์ (100%) และอ่างฯ นฤปดินทรจินดา (101%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำพระสทิ้ง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำน่าน แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำยม แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,742 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,673 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +24.40 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.30 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,300 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,300 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.53 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.15 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +15.47 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.47 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 229 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 230 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 180 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 49 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 194 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 186 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 144 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 143 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 26 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 54 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 315 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 273 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 35 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 11 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 115 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 101 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 53 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สถานี C.29B ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,099 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,094 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		10 ต.ค. 68	11 ต.ค. 68	12 ต.ค. 68	13 ต.ค. 68	14 ต.ค. 68	15 ต.ค. 68	16 ต.ค. 68		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร - เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าบ้านบุปรี จ.นนทบุรี	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	ปกติ	
เจ้าพระยา	ท่าข้ามกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 16 ต.ค. 68	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	4.58	-8.22
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	9.80	-6.20
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	7.38	-4.82
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	7.40	-4.60
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	7.30	-5.20
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	9.68	-4.82

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

3.1 กรมชลประทาน ให้ความช่วยเหลือเครื่องจักร - เครื่องมือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 68 – 12 ต.ค. 68 รวม 1,616 หน่วย แบ่งเป็น เครื่องสูบน้ำ 1,127 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 351 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 25 คัน และเครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ 113 หน่วย

3.2 กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหารและเมล็ดพันธุ์พืชผักแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร (พริก/มะเขือเปราะ) จำนวน 17,000 ต้น เมล็ดพันธุ์พืชผัก (คะน้า/กวางตุ้ง) จำนวน 9,500 ซอง และเตรียมหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 10,240 ขวด และเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 17,830 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด

3.3 กรมปศุสัตว์ อพยพสัตว์ จำนวน 325,135 ตัว หย้าอาหารสัตว์พระราชทาน 300,590 กิโลกรัม ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ/ยาปฏิชีวนะ วิตามิน) 43,476 ซอง รักษาสัตว์ 46 ตัว ฝังซากสัตว์ 437 ตัว พร้อมทั้งจัดตั้งสถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยมีสัตว์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสุขภาพสัตว์ให้ด้วย

3.4 กรมประมง โดยกองตรวจการประมง ได้จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ 4 ชุด รถยนต์ 4 คัน เรือตรวจการประมง 4 ลำ ช่วยนำส่งเสบียงอาหาร และน้ำดื่ม พร้อมทั้งอพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็กและคนชรา ในพื้นที่ประสบภัยสู่พื้นที่ปลอดภัย

4. ผลกระทบด้านการเกษตร

4.1 อุทกภัย ช่วงภัย 23 ส.ค. 68 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 48 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 165,768 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,212,328 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,039,456 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 165,718 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 7,155 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 33,858 ราย พื้นที่ 278,768 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 258,032 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 19,559 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 1,177 ไร่ คิดเป็นเงิน 389.25 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 504 ราย พื้นที่ 1,155 ไร่ วงเงิน 1.99 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 68)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 5,362 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 8,120 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 7,525 ไร่ บ่อกุ้ง 595 ไร่ กระชัง 2,858 ตรม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 946 ราย พื้นที่ 1,139 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,039 ไร่ บ่อกุ้ง 100 ไร่ กระชัง 80 ตรม. วงเงิน 6,071,727 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 133 ราย พื้นที่ 96 ไร่ กระชัง 80 ตรม. วงเงิน 478,772 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 68)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ระยอง และจังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร 28,939 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 8,138,554 ตัว แบ่งเป็น โค 79,604 ตัว กระบือ 24,563 ตัว สุกร 93,724 ตัว แพะ/แกะ 11,639 ตัว และสัตว์ปีก 7,929,024 ตัว แปลงหญ้า 7,918 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** 389,573 ตัว แบ่งเป็น โค 64 ตัว กระบือ 24 ตัว สุกร 219 ตัว แพะ 33 ตัว และ สัตว์ปีก 389,573 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 68)

4.2 วาตภัย ช่วงภัย 16 ก.พ. 68 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก แพร่ นครสวรรค์ พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ปทุมธานี สระบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,799 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 11,006 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 826 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 4,144 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 6,036 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,070 ราย พื้นที่ 1,858 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 113 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 794 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 951 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,509,282 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,014 ราย พื้นที่ 1,827 ไร่ วงเงิน 5,380,849 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค. 68)

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เกษตรกร 1 ราย กระชัง 50 ตรม. คิดเป็นเงิน 18,400 บาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

5. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 68)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (อุทัยธานี ลำพูน จันทบุรี นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ ตราด หนองคาย และ ยะลา) จำนวน 62 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 38 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ กำจัดพืชอาศัย และเมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัว/ตร.ม. และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม
	2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช จันทบุรี ตาก และ	- เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้น้ำออกจากแปลงนา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	นครราชสีมา) จำนวน 1,805 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ลำพูน ขอนแก่น ชลบุรี มหาสารคาม ตาก สุรินทร์ จันทบุรี นครพนม และ อุบลราชธานี)	- เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัย ต่อมวนเขียวตูดใช้ ระหว่าง 6 :1- 8 :1 หรือ/อ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น ให้ใช้ สารกำจัดแมลง
	4. เพลี้ยไฟ	จำนวน 947 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 37 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุรินทร์ ปราจีนบุรี อุทัยธานี และนครราชสีมา)	- ใช้น้ำท่วมยอด้ข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟ ตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าว ใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
	5. โรคไหม้ข้าว	จำนวน 240 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ลำพูน กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ อุดรธานี ขอนแก่น เพชรบูรณ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี จันทบุรี สกลนคร และ หนองบัวลำภู)	- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร
	6. หนอนกอข้าว	จำนวน 6,856 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 215 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (มหาสารคาม พิษณุโลก สุรินทร์ จันทบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร และยะลา)	- เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลาย หนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
	7. โรคขอบใบแห้ง	จำนวน 171 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 17 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (บุรีรัมย์ มหาสารคาม จันทบุรี อุดรธานี และศรีสะเกษ)	- ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่น ทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้ สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไอโซโพรไพโอเลน คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์ เซตริฟโตมัยซินซิลเพต+ออกซิเตทตราไซคลิน
	8. โรคใบสีส้ม	จำนวน 149 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 890 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ปราจีนบุรี และกาฬสินธุ์)	- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงใน ระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก
	9. โรคใบขีดสีน้ำตาล	จำนวน 22 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 201 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี และบุรีรัมย์)	- ใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัม/ไร่ สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ หากพบโรคระบาดของ โรครุนแรงในระยะแตกกอ ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกัน กำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม เนื่องจากเชื้อสาเหตุทำให้เกิดโรคเมล็ดด่าง
	10. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว	จำนวน 56 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 110 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และ อุดรธานี)	- สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ใช้แสงไฟล่อแมลงและ ทำลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง ปลูกข้าวพร้อม ๆ กัน และ ปลอยพื้นนาว่างไว้ระยะหนึ่ง เพื่อตัดวงจรชีวิตของแมลง
	11. แมลงบัว	จำนวน 374 ไร่ <u>พื้นที่ระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครพนม ตาก อุดรธานี และ นครราชสีมา)	- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงใน ระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก
มะพร้าว	1. ด่างแรด	พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สมุทรสาคร ชุมพร เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สตูล กระบี่ ระยอง สงขลา จันทบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น พังงา เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ตรัง นครปฐม ภูเก็ต หนองบัวลำภู และร้อยเอ็ด)	- ตัดทำลายและขุดตอมะพร้าวที่โรส้ขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง กำจัดให้น้ำพ่นสารฆ่าไร ในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกัน ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่โรส้ขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดย เลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน
	2. หนอนหัวดำ	จำนวน 6,293 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 235 ไร่ พื้นที่ระบาด 40 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา ราชบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ สมุทรสงคราม ตรัง ปัตตานี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กรุงเทพมหานคร กระบี่ สุรินทร์ นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี จันทบุรี	- ปลอยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของ หนอนหัวดำ หรือปลอยแตนเบียนไซทริโครแกรมมา เพื่อ ควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ ใช้สารเคมีอิมามิกติน-เบนโซเอท โดยมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น และมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำ น้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ
			- ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงค้ำหนาม

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. แมลงดำหนาม	อุบลราชธานี พังงา สระแก้ว ภูเก็ต สตูล หนองคาย สมุทรปราการ ระยอง พัทลุง อำนาจเจริญ กาญจนบุรี หนองบัวลำภู สระบุรี ร้อยเอ็ด สุโขทัย และสกลนคร) จำนวน 42,549 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1,635 ไร่	กักกินไปเผาทำลาย ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส ควบคุม หนอนแมลงดำหนามมะพร้าว หรือแตนเบียนเตตระสติคัส ควบคุมด้กัแมลงดำหนามมะพร้าว และอนุรักษ์ศัตรู ธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ
	4. โรสี้ขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชุมพร ชลบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตราด สงขลา กระบี่ พังงา สตูล ตรัง สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์ จันทบุรี ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครพนม กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี พัทลุง และนครราชสีมา) จำนวน 6,751 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 231 ไร่	- ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อ โดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียม เพื่อกำจัดด้วงงวงในระยะหนอน และดักด้ว ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชั้นผสม กับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงงวงมะพร้าว
	5. ด้วงงวง	พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา จันทบุรี กาฬสินธุ์ นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ชุมพร ตราด และชัยนาท) จำนวน 664 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 5 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้ตาข่ายหรือแหจับปลามาซึ่งวางทิศทางลมดักจับด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาโรเซียม อัตรา 800 กรัม/กองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและ มะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะ หนอนและดักด้ว หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมี ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอ มะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก
		พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (ตราด ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช เพชรบุรี พังงา ราชบุรี สงขลา กาฬสินธุ์ และขอนแก่น) จำนวน 705 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 190 ไร่	
ปาล์ม น้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชลบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 834 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 10 ไร่	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน
	2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชลบุรี สกลนคร และจันทบุรี) จำนวน 810 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 53 ไร่	- ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ
	3. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (ร้อยเอ็ด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี กระบี่ สตูล ตรัง สงขลา ฉะเชิงเทรา สระบุรี จันทบุรี ระยอง และสระแก้ว) จำนวน 1,160 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักด้ว และระยะตัวหนอนและดักด้ว
	4. ด้วงกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล สระบุรี ตรัง กระบี่ ตราด สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และจันทบุรี) จำนวน 468 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 121 ไร่	- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณ โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ
	5. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา สตูล พังงา จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 11,685 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่	- กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อ ในธรรมชาติ และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาราดหรือฉีดพ่นบริเวณ รอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ
	6. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ตราด สระแก้ว ชุมพร สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 972 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่	- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบ เป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง
	7. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 87 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ตัดทางใบที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาทันที เก็บเศษซากพืช นำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	8. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 4,718 ไร่ การระบาดลดลง 63 ไร่	- ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ยางพารา	1. โรคครากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคเส้นดำ 5. อาการเปลือกแห้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,210 ไร่ การระบาดลดลง 50 ไร่ พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (นราธิวาส นครศรีธรรมราช ยะลา ตรัง สงขลา ปัตตานี พังงา พัทลุง น่าน สุโขทัย อุตรธานี สุราษฎร์ธานี หนองคาย บึงกาฬ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ลำปาง ตราด ภูเก็ต นครพนม และกาญจนบุรี) จำนวน 388,326 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4,947.28 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สุโขทัย ตราด หนองคาย ชุมพร ระนอง นครพนม กระบี่ และพังงา) จำนวน 2,847 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ นราธิวาส ตราด และสกลนคร) จำนวน 154 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตรัง สกลนคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตราด และนครศรีธรรมราช) จำนวน 6,674 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่	- แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาดูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรังค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ - เมื่อพบอาการโรคเป็นรอยบุ๋มเพียงเล็กน้อย ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราทาบริเวณที่ถูกทำลาย เพื่อรักษาโรค - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางไหลนานผิดปกติและน้ำยางจางลง หรือน้ำยางหยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีด ควรหยุดกรีด 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง
กาแฟ	1. หนอนกาแฟสีแดง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟ-สีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง
มันสำปะหลัง	1. โรคใบด่างมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคพุ่มแจ้ 5. โรแดงมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 38 จังหวัด (นครราชสีมา กำแพงเพชร กาญจนบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี ชลบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ สระแก้ว อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ระยอง นครสวรรค์ มหาสารคาม ยโสธร สระบุรี สุรินทร์ ชัยนาท อุตรธานี ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ เพชรบุรี สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร จันทบุรี สกลนคร หนองบัวลำภู นครพนม และตาก) จำนวน 1,224,275 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9,026 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ชลบุรี ชัยนาท สกลนคร สระแก้ว บุรีรัมย์ นครราชสีมา จันทบุรี และอุบลราชธานี) จำนวน 1,289 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 31 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (มหาสารคาม สระแก้ว เพชรบูรณ์ ชลบุรี บุรีรัมย์ และสกลนคร) จำนวน 627 ไร่ การระบาดลดลง 627 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี) จำนวน 978 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 63 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ชลบุรี บุรีรัมย์ ระยอง กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ มหาสารคาม และขอนแก่น) จำนวน 4,060 ไร่ การระบาดลดลง 2,158 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรกร่อนแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิโดล-อะลูมิเนียม - โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรครุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียนอายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง-ใช้วิธีเกษตรกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและดักแด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหารสามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะหนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วอลโวโลสโครไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระทุ้หอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชัยนาท โสธร อุบลราชธานี และสกลนคร) จำนวน 301 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่	
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm) 2. โรคใบไหม้แผลใหญ่	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา ตาก เชียงใหม่ ยะลา จันทบุรี กาฬสินธุ์ สระแก้ว พัทลุง ขอนแก่น สตูล และสงขลา) จำนวน 3,379 ไร่ การระบาดลดลง 419 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตาก) จำนวน 500 ไร่ การระบาดคงที่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 305 ไร่ การระบาดคงที่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและปักตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว 3. โรคเส้ดำ 4. ด่างหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 1,401 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ มุกดาหาร และหนองบัวลำภู) จำนวน 21,809 ไร่ การระบาดลดลง 819 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุทัยธานี และบุรีรัมย์) จำนวน 264 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (บุรีรัมย์ และขอนแก่น) จำนวน 264 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย ปลอ่ยแทนเป็นไขไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว - หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก - โรคเส้ดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบและฉีดพ่นในเวลายืน
ทุเรียน	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. เพลี้ยหอยเกล็ด 5. หนอนเจาะผล 6. โรแดง 7. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ยะลา ชุมพร จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่) จำนวน 409 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และกระบี่) จำนวน 917 ไร่ การระบาดลดลง 76 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา สุราษฎร์ธานี ตราด ชุมพร สงขลา ตรัง กระบี่ นราธิวาส สตูล และพังงา) จำนวน 1,029 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ยะลา ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระยอง และนราธิวาส) จำนวน 337 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร นครศรีธรรมราช และจันทบุรี) จำนวน 75 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตราด และนราธิวาส) จำนวน 801 ไร่ การระบาดลดลง 37 ไร่ พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด ยะลา ระยอง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา นราธิวาส ตรัง กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ตาก ภูเก็ต และสตูล) จำนวน 4,618 ไร่ การระบาดลดลง 41 ไร่	- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโพรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอามีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอามีโทกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์โกต์ อัตรา 30 กรัม อะมิพรอส อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซ็อกซ์อัตรา 40 มล. - โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - เมื่อพบการระบาดของโรคใบติดหรือใบไหม้ มักควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช - หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	8. โรคใบติดหรือใบไหม้ 9. โรคใบจุดสาหร่าย 10. เพลี้ยจักจั่นฝอย 11. โรคราดำ 12. โรคราสีชมพู 13. มอดเจาะลำต้น ทุเรียน 14. หนอนกินใบ 15. โรคกิ่งแห้ง 16. โรคแอนแทรคโนส 17. หนอนเจาะเมล็ด 18. โรคผลเน่าทุเรียน	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ยะลา จันทบุรี ชุมพร ตราด นราธิวาส สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 622 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ยะลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และตราด) จำนวน 1,186 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 61 ไร่ พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด ระยอง นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี สงขลา กระบี่ ยะลา นครราชสีมา พัทลุง และนราธิวาส) จำนวน 1,018 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ชุมพร และพังงา) จำนวน 128 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตราด สุราษฎร์ธานี สงขลา ภูเก็ต และกระบี่) จำนวน 180 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี ยะลา ตราด และสงขลา) จำนวน 139 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร ระยอง และสุรินทร์) จำนวน 439 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ปราจีนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตราด และปราจีนบุรี) จำนวน 457 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 48 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร ยะลา และจันทบุรี) จำนวน 432 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (พัทลุง ยะลา นราธิวาส และนครศรีธรรมราช) จำนวน 538 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และยะลา) จำนวน 19 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่	- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือ ไซเปอร์เมทริน/ไพเพาโซน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน - เมื่อพบคราบราสีดำ พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดำ และสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง - ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคราที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด - ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน - มอดเจาะลำต้น ควรตัดและเผาทิ้ง สำหรับส่วนของต้นทุเรียนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้ - หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน ให้เขย่ากิ่ง ตัวหนอนคืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดิน สามารถจับทำลายได้ หรือใช้กับดักแสง ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน - หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่ให้รกทึบ และกำจัดวัชพืชในสวนเพื่อลดความชื้น หากพบการระบาดของเพี้ยเล็กน้อย ควรตัดส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกสวน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโปรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นตรวจตราผลทุเรียนในแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงผลใกล้แก่ หากพบอาการผลเป็นจุดเน่า ควรทำการฉีดพ่นสารเคมี เช่น เมตาแลกซิล 25% WP หรือ เมตาแลกซิลผสมแมนโคเซป หรือ ฟอสเอทธิล อะลูมิเนียม 80% WP ให้ทั่วทั้งต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคใบจุดสาหร่าย 3. หนอนคืบกินใบ 4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 55 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 295 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 188 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 143 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร) จำนวน 159 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 7 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระยอง พังงา และยะลา) จำนวน 479 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 29 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ระยอง และพังงา) จำนวน 353 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้ง โดยการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง - เมื่อพบหนอนคืบกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ 30-80 กรัม - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโปรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สาร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. โรคใบจุด 5. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และ ชุมพร) จำนวน 277 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร นราธิวาส และตรัง) จำนวน 584 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่	ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกไซด์ไฮดรอกไซด์ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ - เมื่อพบโรแดงหรือโรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคคราตา 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. หนอนคืบกินใบ 5. โรคโรก้ามะหยี่ 6. หนอนม้วนใบ 7. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 79 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 274 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 194 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 39 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 41 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทยอน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกไซด์ไฮดรอกไซด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม - หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักด้วไปทำลาย หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปดาไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาดของให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกโรทำลายนำไปเผาทิ้งนอกแปลงปลูก - หมั่นตรวจ ถ้าพบให้เก็บทำลาย หากระบาดรุนแรงมาก ควรฉีดพ่นด้วยยาโมโนโครโทฟอส ในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยไพรีทรอยด์อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร - ตัดส่วนที่ถูกทำลายที่มีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่ที่มาเล่นไฟกลางคืนไปทำลาย - จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย หากพบระบาดมาก ใช้ยาฆ่าแมลงพวก โมโนโครโทฟอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในช่วงฤดูแล้งขณะที่อยู่ในดอกติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3 ครั้ง

6. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2568

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 14 จังหวัด 26 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ มุกดาหาร อุตรดิตถ์ และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัด ควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ ทั้งนี้ พบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 1 จุด ในพื้นที่จังหวัดระยอง

พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 103 จุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย อุตรดิตถ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา