




รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น.

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อ่าวไทยตอนบนและท่าฝั่งบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ถึงปานกลาง เนื่องจากมีการระบายอากาศดี

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 3 ก.พ. 69 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 4 ก.พ. 69



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	นราธิวาส	3.2	ฝนตกเล็กน้อย
2	อ.เมือง	พัทลุง	2.8	ฝนตกเล็กน้อย
3	อ.เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี	1.4	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 69)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 61,834 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 37,887 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2568 (55,803 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73) มากกว่าปี 2568 จำนวน 6,031 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 30.46 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 187.34 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 14,677 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 57,536 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 33,997 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2568 (52,245 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) มากกว่าปี 2568 จำนวน 5,291 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 21.12 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 164.86 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 13,396 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รบก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รบก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รบก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รบก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รบก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รบก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	21,275	86	14,530	80	87	1,145	1,013	89	921	88	95	25,970	22,289	86	15,451	81	3,686
ตอน.	12	8,368	5,928	71	4,276	64	230	2,122	1,622	76	1,455	75	242	10,490	7,550	72	5,731	66	2,940
กลาง	3	1,419	929	65	869	64	27	419	318	76	293	75	30	1,838	1,247	68	1,162	66	590
ตะวันตก	2	26,605	22,532	85	9,255	69	8	164	132	81	121	79	10	26,769	22,664	85	9,376	70	4,105
ตะวันออก	6	1,515	855	56	760	54	52	1,009	691	68	635	67	58	2,524	1,546	61	1,395	59	979
ใต้	4	8,194	6,017	73	4,306	66	44	721	521	72	466	70	48	8,916	6,538	73	4,772	67	2,378
รวม	35	70,926	57,536	81	33,997	72	448	5,579	4,298	77	3,890	75	483	76,506	61,834	81	37,887	72	14,677

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 21,029 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 85 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 14,333 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 11.14 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 83.24 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 3,842 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับ ได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	11,849	88	8,049	83	8.39	8.42	45.00	45.00	1,613
สิริกิติ์	7,923	83	5,073	76	2.75	5.12	30.03	30.07	1,587
ภูมิพล+สิริกิติ์	19,772	86	13,122	80	11.14	13.54	75.03	75.07	3,200
แควน้อยฯ	685	73	642	72	0.00	0.00	4.32	4.32	254
ป่าสักชลสิทธิ์	572	60	569	60	0.00	0.00	3.89	3.90	388
รวมทั้งหมด	21,029	85	14,333	79	11.14	13.54	83.24	83.29	3,842

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 8 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (88%) อ่างฯ สิริกิติ์ (83%) อ่างฯ แม่จัดสมบูรณ์ชล (99%) อ่างฯ แม่กวอดมธรา (88%) อ่างฯ กิ่วคอหมา (103%) อ่างฯ จุฬารักษ์ (86%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (90%) และอ่างฯ ประแสร์ (82%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯ คลองสิยัด (18%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 656 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 679 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.70 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.00 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 210 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 210 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.36 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.42 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +6.77 ม.รทก. (เมื่อวาน +6.77 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 209 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 211 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 156 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 50 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่น ๆ 3 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 19 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 19 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 129 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 136 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 31 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 54 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 243 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 243 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 34 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่า-กระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 11 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 40 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 100 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 58 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สถานี C.29B ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,144 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,153 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		29 ม.ค. 69	30 ม.ค. 69	31 ม.ค. 69	1 ก.พ. 69	2 ก.พ. 69	3 ก.พ. 69	4 ก.พ. 69		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าบ้านบุรี จ.นนทบุรี	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ท่าน้ำกรมชลประทานสามเสน กทม.	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 4 ก.พ. 69	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	1.84	-10.96
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.62	-11.38
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.62	-10.58
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.66	-10.34
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.06	-10.44
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.53	-11.97


หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2568/69

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2568/69 (วันที่ 1 พ.ย. 68 ถึง 30 เม.ย. 69) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 47,516 ล้าน ลบ.ม. โดยวางแผนจัดสรรน้ำชลประทานตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ เพื่อการอุปโภค - บริโภค 2,748 ล้าน ลบ.ม. การรักษาระบบนิเวศและอื่น ๆ 8,090 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 478 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 18,247 ล้าน ลบ.ม. สำหรับกลุ่มน้ำพระยา ปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 17,745 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำชลประทานแยกเป็น เพื่ออุปโภค - บริโภค 1,150 ล้าน ลบ.ม. การรักษาระบบนิเวศ และอื่น ๆ 1,305 ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม 135 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 6,910 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั้งประเทศ (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแหล่งน้ำอื่น ๆ) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 68 - ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 15,107 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้น้ำใช้ไป 83.24 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 6,385 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47 ของแผนจัดสรรน้ำ

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2568/69 (1 พ.ย.68 - 30 เม.ย.69)					หน่วย : ล้าน ลบ.ม.	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	2,748	8,090	18,247	478	29,563	15,107	45
ลุ่มเจ้าพระยา	1,150	1,305	6,910	135	9,500	6,385	47



4. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2568/69

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2568/69

ทั้งประเทศ จำนวน 15.60 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12.86 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.74 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 8.59 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.80 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.79 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2568/69 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2569)

ทั้งประเทศ จำนวน 11.56 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 10.30 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.26 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 7.46 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.07 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.39 ล้านไร่

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2568/69			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2568/69			% ผลปลูก ข้าวรอบ 2 เทียบกับแผน
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม ทั้งหมด	
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	10.05	0.67	10.72	7.66	0.45	8.11	76
	นอกเขตชลประทาน	2.81	2.07	4.88	2.64	0.81	3.45	94
	รวม	12.86	2.74	15.60	10.30	1.26	11.56	80
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.27	0.08	6.35	5.44	0.09	5.53	87
	นอกเขตชลประทาน	1.53	0.71	2.24	1.63	0.30	1.93	107
	รวม	7.80	0.79	8.59	7.07	0.39	7.46	91

5. ผลกระทบด้านการเกษตร

5.1 อุทกภัย (ภาคใต้) ช่วงภัย 11 พ.ย. 68 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 242,791 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 207,948 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 67,372 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 11,981 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 128,595 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 20,244 ราย พื้นที่ 66,220 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 46,276 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 2,948 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 16,996 ไร่ วงเงิน 136,645,814 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 4,664 ราย พื้นที่ 10,657 ไร่ วงเงิน 26,541,848 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 69)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 9,805 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 17,636 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 10,672 ไร่ บ่อกุ้ง 6,964 ไร่ กระชัง 121,838 ตรม. **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 5,849 ราย พื้นที่ 5,636 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 3,672 ไร่ บ่อกุ้ง 1,964 ไร่ กระชัง 121,798 ตรม. วงเงิน 85,152,689 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 710 ราย พื้นที่ 449 ไร่ กระชัง 3,744 ตรม. วงเงิน 3,920,405 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 69)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 213,567 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 13,975,659 ตัว แบ่งเป็น โค 437,706 ตัว กระบือ 8,145 ตัว สุกร 275,715 ตัว แพะ/แกะ 211,061 ตัว และสัตว์ปีก 13,043,032 ตัว แผลงหญ้า 8,176 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 2,165 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 303,976 ตัว แบ่งเป็น โค 2,155 ตัว กระบือ 146 ตัว สุกร 2,018 ตัว แพะ/แกะ 457 ตัว สัตว์ปีก 340,730 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 69)

5.2 อุทกภัย ช่วงภัย 23 ส.ค. 68 – 11 พ.ย. 68

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 53 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุดรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรสาคร ราชบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 248,053 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,695,142 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,365,918 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 314,232 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 14,992 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 167,234 ราย พื้นที่ 1,252,131 ไร่

แบ่งเป็น ข้าว 1,079,677 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 163,546 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 8,909 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,806,647,341 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 59,272 ราย พื้นที่ 437,602 ไร่ วงเงิน 612,189,749 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 69)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 37 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 7,380 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 14,788 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 11,773 ไร่ บ่อกุ้ง 3,015 ไร่ กระชัง 6,980 ตรม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,380 ราย พื้นที่ 14,788 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 11,773 ไร่ บ่อกุ้ง 3,015 ไร่ กระชัง 6,980 ตรม. วงเงิน 93,261,769 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 2,788 ราย พื้นที่ 3,850 ไร่ กระชัง 3,343 ตรม. วงเงิน 24,342,061 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.พ. 69)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 34 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 40,580 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 9,123,958 ตัว แบ่งเป็น โค 151,883 ตัว กระบือ 29,093 ตัว สุกร 109,713 ตัว แพะ/แกะ 15,567 ตัว และสัตว์ปีก 8,817,702 ตัว แปลงหญ้า 8,271 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 105 ราย สัตว์ตายและสูญหาย 392,196 ตัว แบ่งเป็น โค 59 ตัว กระบือ 14 ตัว สุกร 157 ตัว แพะ/แกะ 35 ตัว และสัตว์ปีก 391,931 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่ วงเงิน 719,920 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 39 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 2,064 ตัว แปลงหญ้า 2 ไร่ วงเงิน 701,920 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 69)

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 68)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. หนอนห่อใบข้าว	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กำแพงเพชร ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ตราน หนองคาย และยะลา) จำนวน 370 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ กำจัดพืชอาศัย และเมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว และพบใบข้าวถูกทำลายในข้าวอายุ 15-40 วัน ให้ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม
	2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 5 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ไถน้าออกจากแปลงนา
	3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (พัทลุง ชัยภูมิ ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี และ) จำนวน 1,118 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 909 ไร่	- ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว แบบเปียกสลับแห้ง เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัย จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง
	4. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ปราจีนบุรี) จำนวน 180 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- กำจัดวัชพืชในนาข้าว เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัยให้หว่านปุ๋ยยูเรียเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว
	5. โรคไหม้ข้าว	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชัยภูมิ กำแพงเพชร บุรีรัมย์ ขอนแก่น ราชบุรี และสกลนคร) จำนวน 591 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 40 ไร่	- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ ฟันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก ฟันเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร
	6. หนอนกอข้าว	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กำแพงเพชร พิษณุโลก ขอนแก่น บุรีรัมย์ สกลนคร กาฬสินธุ์ และยะลา) จำนวน 349 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ไถน้าท่วและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
	7. โรคขอบใบแห้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (บุรีรัมย์ และฉะเชิงเทรา) จำนวน 114 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่นทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช
	8. โรคใบสีส้ม	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาฬสินธุ์) จำนวน 9 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- กำจัดวัชพืช และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะนำโรค ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ
	9. โรคใบขีดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และบุรีรัมย์) จำนวน 33 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- สามารถลดความรุนแรงของโรค โดยใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ หากพบโรคระบาดของโรครุนแรงในระยะแตกกอ ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	10. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (กาฬสินธุ์) จำนวน 3 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 371 ไร่	- ใช้แสงไฟล่อแมลงและทำลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง ปลูกข้าวพร้อม ๆ กัน และปล่อยพืชนาวางไว้ระยะหนึ่ง เพื่อตัดวงจรชีวิตของแมลง
มะพร้าว	1. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 28 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สมุทรสาคร ชุมพร เพชรบุรี สตูล สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ตราด กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ระยอง กระบี่ พังงา นครราชสีมา สมุทรปราการ จันทบุรี สระแก้ว ตรัง ขอนแก่น นครปฐม ราชบุรี ภูเก็ต กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด และระนอง) จำนวน 6,197 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่	- ตัดทำลายและช่อดอกมะพร้าวที่โรยไข่มาพร้าวเข้าทำลาย นำไปเผาทำลายนอกแปลง ให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะ มะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็ก ห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน
	2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 38 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา สมุทรสงคราม ตราด ราชบุรี ชัยนาท ขอนแก่น ปัตตานี ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ ระยอง นครราชสีมา กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ กระบี่ พังงา กรุงเทพมหานคร นครพนม อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี หนองคาย สมุทรปราการ สตูล ภูเก็ต กาญจนบุรี อำนาจเจริญ สุรินทร์ สระแก้ว ร้อยเอ็ด สุโขทัย และสกลนคร) จำนวน 29,712 ไร่ การระบาดลดลง 206 ไร่	- ปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของ หนอนหัวดำ หรือปล่อยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา เพื่อ ควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ ใช้สารเคมีอามิแก็กดิน- เบนโซเอท โดยมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น และมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวหน้าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำ น้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ
	3. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชุมพร ชลบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตราด กระบี่ สงขลา สมุทรสงคราม พังงา สตูล ตรัง เพชรบูรณ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง นครพนม ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อุดรธานี และนครราชสีมา) จำนวน 6,279 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 123 ไร่	- ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนาม กัดกินไปเผาทำลาย ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเตส ควบคุม หนอนแมลงดำหนามมะพร้าว หรือแตนเบียนเตตระสติคัส ควบคุมตักแต่แมลงดำหนามมะพร้าว และอนุรักษ์ศัตรู ธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ
	4. โรยไข่มาพร้าว	พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (สุพรรณบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ จันทบุรี สงขลา กาฬสินธุ์ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ชุมพร เพชรบุรี ตราด และชัยนาท) จำนวน 700 ไร่ การระบาดลดลง 366 ไร่	- ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อ โดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงงวงในระยะหนอน และดักแด้ ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชั้นผสม กับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงงวงมะพร้าว
	5. ดั้วงวง	พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตราด กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช พังงา เพชรบุรี จันทบุรี ราชบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา) จำนวน 655 ไร่ การระบาดลดลง 37 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้ตาข่ายหรือแหจับปลามาซึ่งวางทิศทางลมดักจับด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไรเซียม อัตรา 800 กรัม/กองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและ มะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะ หนอนและดักแด้ หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมี ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณ โคนมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก
ปาล์ม น้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชลบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 876 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 36 ไร่	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน
	2. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชลบุรี สกลนคร และจันทบุรี) จำนวน 573 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่	- ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ
	3. ดั้วแรด	พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (ตรัง สตูล ชุมพร ชลบุรี นครศรีธรรมราช สระแก้ว สุราษฎร์ธานี กระบี่ ฉะเชิงเทรา สงขลา ระนอง สระบุรี จันทบุรี ระยอง และร้อยเอ็ด) จำนวน 1,025 ไร่ การระบาดลดลง 52 ไร่	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอนและดักแด้ - หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณ โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	4. ตัวงูหลาบ 5. โรคลำต้นเน่า 6. โรคทะลายเน่า 7. โรคใบจุด 8. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง ตรวดี นราธิวาส จันทบุรี สระบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และกระบี่) จำนวน 399 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระยอง สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ สตูล พังงา และจันทบุรี) จำนวน 11,630 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 69 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ยะลา สุราษฎร์ธานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช ตรวดี สระแก้ว สงขลา และชุมพร) จำนวน 1,064 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 103 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร และนราธิวาส) จำนวน 4,599 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 181 ไร่	เช่น เชฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ - กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อ ในธรรมชาติ และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาโรคหรือฉีดพ่นบริเวณ รอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ - ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ข้อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบ เป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง - ตัดทางใบที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาในที่ เก็บเศษซากพืช นำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปลอ่ยแต่นเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุม ระยะหนอนของหนอนหัวดำ - ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผา ทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้ สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ยางพารา	1. โรคครากขาว 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. อาการเปลือกแห้ง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และตรวดี) จำนวน 2,133 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (นราธิวาส ยะลา สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี สตูล พังงา พัทลุง น่าน เลย แพร่ บึงกาฬ สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี สุโขทัย กระบี่ อุตรธานี ระนอง นครพนม พะเยา ลำปาง และภูเก็ต) จำนวน 1,522,170 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4,581 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี สุโขทัย หนองคาย ชุมพร ตรวดี นครพนม ระนอง พังงา และสตูล) จำนวน 3,110 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 49 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตรัง สกลนคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรวดี นครศรีธรรมราช และชลบุรี) จำนวน 6,752 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- คำนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาขนาดกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีต 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่ง น้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ - เมื่อพบอาการโรคเป็นรอยบุ๋มเพียงเล็กน้อย ใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดเชื้อราทาบริเวณที่ถูกทำลาย เพื่อรักษาโรค - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางไหลนานผิดปกติและน้ำยางจางลง หรือน้ำยาง หยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีต ควรหยุดกรีต 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง
กาแฟ	1. หนอนกาแฟสีแดง 2. หนอนเจาะกิ่ง 3. มอดเจาะผลกาแฟ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 9 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และตาก) จำนวน 313 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ตาก สงขลา ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 206 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 183 ไร่	- หากพบการเข้าทำลายของหนอนกาแฟสีแดง/หนอนเจาะกิ่ง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง และฉีดพ่น สารฆ่าแมลงเพนิโตรโซน - วางกับดักสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ (เมทิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ อัตรา 1 : 1) เต็มสารล่อทุก ๆ 2 สัปดาห์ ใช้เชื้อราบีวเวเรีย DOA B18 ผสมสารจับใบฉีดพ่นอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
มันสำปะหลัง	1. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 36 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น กาญจนบุรี กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ อุทัยธานี ชลบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ นครสวรรค์ อำนาจเจริญ ระยอง มหาสารคาม ยโสธร อุตรธานี มุกดาหาร สุรินทร์ ชัยนาท ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สระบุรี พิจิตร สุโขทัย เพชรบุรี นครพนม สกลนคร จันทบุรี และเลย) จำนวน 1,028,623 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 33,986 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ชลบุรี ยโสธร สกลนคร สระแก้ว บุรีรัมย์ จันทบุรี และอุบลราชธานี) จำนวน 790 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยง การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรยกร่องแปลงปลูกเพื่อไม่ให้หน้าท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิอิล-อะลูมิเนียม

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคพุ่มแจ้ 5. โรคน้ำมันสำปะหลัง 6. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อุดรดิตถ์ และเพชรบูรณ์) จำนวน 2,462 ไร่ การระบาดลดลง 244 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (นครสวรรค์ กำแพงเพชร สระแก้ว ชลบุรี กาฬสินธุ์ ระยอง กาญจนบุรี อุดรธานี จันทบุรี สกลนคร และอุดรดิตถ์) จำนวน 5,627 ไร่ การระบาดลดลง 547 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ มหาสารคาม และขอนแก่น) จำนวน 20,120 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 12,005 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชัยนาท ยโสธร อุบลราชธานี และสกลนคร) จำนวน 301 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่	- โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียนอายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง-ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและดักแด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหารสามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะหนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วคีโอโพลีอีโดรไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (อุดรดิตถ์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ เชียงใหม่ จันทบุรี กาฬสินธุ์ สระแก้ว ชลบุรี ขอนแก่น และสตูล) จำนวน 100 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 32 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ตราด ราชบุรี ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 283 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและปั่นตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว 3. โรคเส้ดำ 4. ด่างหนวดยาว	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี และบุรีรัมย์) จำนวน 2,350 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 0.25 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม ชัยภูมิ มุกดาหาร และนครราชสีมา) จำนวน 21,083 ไร่ การระบาดลดลง 552 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุทัยธานี และบุรีรัมย์) จำนวน 264 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และขอนแก่น) จำนวน 919 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชยปล่อยแตนเบียนไต่โรครุกรณา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาวหมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก - โรคเส้ดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบและฉีดพ่นในเวลาเย็น
ทุเรียน	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. หนอนเจาะผล 5. เพลี้ยหอยเกล็ด 6. ไรแดง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ยะลา ชุมพร จันทบุรี ตราด นครศรีธรรมราช และกระบี่) จำนวน 289 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา ระยอง กระบี่ และตราด) จำนวน 1,202 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 205 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา ตราด ชุมพร กระบี่ สงขลา ตรัง นราธิวาส ระยอง และพังงา) จำนวน 970 ไร่ การระบาดลดลง 100 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 684 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ยะลา จันทบุรี ตราด ชุมพร กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ระยอง และนราธิวาส) จำนวน 297 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระยอง กระบี่ ตราด นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,119 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 150 ไร่	- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโปรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอามีทอกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอามีทอกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไพโรพาร์ไกด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซัลอัตรา 40 มล. - โรคราโคนาโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - เมื่อพบการระบาดโรคใบดิดหรือใบไหม้มากควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. โรครากรเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 20 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ยะลา ตราด สงขลา ระยอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส กระบี่ พังงา ปัตตานี ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พัทลุง ตาก ภูเก็ต สตูล และนนทบุรี) จำนวน 4,498 ไร่ การระบาดลดลง 134 ไร่	- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสำหรับให้ตัดใบ หรือ ส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรครายังคงระบาดพ่นด้วยสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช
	8. โรคใบติดหรือใบไหม้	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (สงขลา ยะลา จันทบุรี นราธิวาส นครราชสีมา ชุมพร ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง) จำนวน 1,146 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่	- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสม ไวโตอยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาด รุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ
	9. โรคใบจุดสำหรับ	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ยะลา ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ นราธิวาส นครราชสีมา และเพชรบูรณ์) จำนวน 1,356 ไร่ การระบาดลดลง 57 ไร่	- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือ ไซเพอร์เมทรินโฟฟาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้ สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน
	10. เพลี้ยจักจั่นฝอย	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ตราด นครศรีธรรมราช กระบี่ ระยอง ยะลา พัทลุง นครราชสีมา และนราธิวาส) จำนวน 675 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- เมื่อพบคราบราสีดํา พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดํา และ สารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อ สาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง
	11. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ชุมพร และพังงา) จำนวน 125 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบ อาการของโรคราที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด
	12. โรคราสีชมพู	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 188 ไร่ การระบาดคงที่	- ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัด ด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
	13. มอดเจาะลำต้น ทุเรียน	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชุมพร ยะลา จันทบุรี ตราด และนราธิวาส) จำนวน 145 ไร่ การระบาดคงที่	- มอดเจาะลำต้น ควรตัดและเผาทิ้ง สำหรับส่วนของต้น ทุเรียนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้
	14. หนอนกินใบ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ชุมพร และสุรินทร์) จำนวน 274 ไร่ การระบาดลดลง 6 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน ให้เขย่ากิ่ง ตัวหนอนคืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดิน สามารถจับ ทำลายได้ หรือใช้กับดักแสง ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน
	15. โรคกิ่งแห้ง	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ปราจีนบุรี ชุมพร ตราด กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 519 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่	- หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วง ที่มีฝนตกชุก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่ให้รกทึบ และกำจัด วัชพืชในสวนเพื่อลดความชื้น หากพบการระบาดเพียง เล็กน้อย ควรตัดส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกสวน
	16. โรคแอนแทรคโนส	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ยะลา ชุมพร จันทบุรี และ ระยอง) จำนวน 523 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่	- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโคน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สาร ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร
	17. หนอนเจาะเมล็ด	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช สงขลา และ ยะลา) จำนวน 96 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 0.02 ไร่	- หมั่นตรวจตราผลทุเรียนในแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ ในช่วงผลใกล้แก่ หากพบอาการผลเป็นจุดเน่า ควรทำการ ฉีดพ่นสารเคมี เช่น เมตาแลกซิล 25% WP หรือ เมตาแลก ซิลผสมแมนโคแซป หรือ ฟอสเอทิล อะลูมิเนียม 80% WP ให้ทั่วทั้งต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง
	18. โรคผลเน่าทุเรียน	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และจันทบุรี) จำนวน 11 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครศรีธรรมราช) จำนวน 240 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกอบ โคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง
	2. โรคใบจุดสำหรับ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนราธิวาส) จำนวน 244 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่	- ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสำหรับเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่ง ทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์
	3. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 192 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่	- หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกร พ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
	4. โรคราแป้ง	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 86 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่	- โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่น นำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และพังงา) จำนวน 197 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้ง โดยการ พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง
			- เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ 4. โรคน้ำจืด 5. โรคน้ำจืดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง ระยอง พังงา และยะลา) จำนวน 595 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ระยอง และพังงา) จำนวน 336 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช พังงา และชุมพร) จำนวน 234 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 10 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ระยอง นราธิวาส ตรัง และพังงา) จำนวน 569 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 23 ไร่	สารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มดกัดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 30-80 กรัม - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโนน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ - เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ - เมื่อพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราดำ 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. หนอนคืบกินใบ 5. โรคโรก้ามะหยี่ 6. หนอนม้วนใบ 7. มวนลำไย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร) จำนวน 100 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 289 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 244 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 27 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 28 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่) จำนวน 44 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี) จำนวน 13 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทยอน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟลูพรีน อัตรา 40-50 กรัม - หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแด้ไปทำลาย หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปดาไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาด ให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกโรทำลายนำไปเผาทั้งนอกแปลงปลูก - หมั่นตรวจ ถ้าพบให้เก็บทำลาย หากระบาดรุนแรงมาก ควรฉีดพ่นด้วยยาโมโนโครโทพอส ในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยไพรีทรอยด์อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร - ตัดส่วนที่ถูกทำลายที่มีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่ที่มาเล่นไฟกลางคืนไปทำลาย - จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย หากพบระบาดมาก ใช้ยาฆ่าแมลงพวก โมโนโครโทพอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 15 จังหวัด 29 จุด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สงขลา ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง สระแก้ว นครราชสีมา เลย มุกดาหาร อุตรดิตถ์ และนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัด ควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคได้ ทั้งนี้ พบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 3 จุด ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร นครราชสีมา และศรีสะเกษ