




ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com  
http:// www.moac.go.th

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  
วันที่ 1 กันยายน 2567 (เวลา 12.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 06.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 1 กันยายน 2567  
เวลา 01:00 น.

ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 3-6 ก.ย. 67 ร่องมรสุมกำลังปานกลางจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 31 ส.ค. 67 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 1 ก.ย. 67



| ที่ | อำเภอ       | จังหวัด   | ปริมาณฝน (มม.) | ความรุนแรง  |
|-----|-------------|-----------|----------------|-------------|
| 1   | อ.เชียงคาน  | เลย       | 57.0           | ฝนตกหนัก    |
| 2   | อ.เมือง     | ลำพูน     | 29.6           | ฝนตกปานกลาง |
| 3   | อ.สันป่าตอง | เชียงใหม่ | 27.3           | ฝนตกปานกลาง |
| 4   | อ.ดอกคำใต้  | พะเยา     | 27.0           | ฝนตกปานกลาง |
| 5   | อ.ท่าตูม    | สุรินทร์  | 24.2           | ฝนตกปานกลาง |

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)  
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

## 2. สถานการณ์อุทกภัย น้ำไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 - ปัจจุบัน พื้นที่ประสบอุทกภัย 39 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา พิจิตร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุดรดิตถ์ นครพนม หนองคาย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิชญ์โลก เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี สระบุรี และจังหวัดภูเก็ต รายละเอียด ดังนี้

| จังหวัด             | ยังคงมีสถานการณ์                                                                                     | แนวโน้ม                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เชียงราย         | เทิง ป่าแดด เมือง ขุนตาล พญาเม็งราย เวียงชัย เชียงแสน                                                | ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3 - 4 วัน                                                                                                      |
| 2. น่าน             | ทุ่งช้าง เชียงกลาง ปัว ท่าวังผา เฉลิมพระเกียรติ บ่อเกลือ เมืองน่าน ภูเพียง สันติสุข บ้านหลวง เวียงสา | ปริมาณฝนลดลง คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 5 - 7 วัน                                                                                                  |
| 3. พะเยา            | เมือง ภูซาง เชียงม่วน เชียงคำ ปง ดอกคำใต้                                                            | ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3 - 4 วัน                                                                                                      |
| 4. พิจิตร           | สากเหล็ก สามง่าม                                                                                     | ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้น และขยายเป็นวงกว้าง เนื่องจากมีฝนตกมาเพิ่มเติมมาในพื้นที่และมีน้ำไหลบ่ามาจาก จังหวัดพิษณุโลก คาดว่าหากไม่มีฝนตกมาเพิ่ม จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ภายใน 1 - 2 วัน |
| 5. แพร่             | วังชิ้น                                                                                              | ปัจจุบันน้ำลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังสถานการณ์ เนื่องจากภาคเหนือตอนบนยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกสะสม                                                         |
| 6. แม่ฮ่องสอน       | เมือง ปางมะผ้า                                                                                       | ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3 - 4 วัน                                                                                                      |
| 7. ลำปาง            | วังเหนือ สบปราบ                                                                                      | ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1 - 2 วัน                                                                                                      |
| 8. ลำพูน            | ลี้                                                                                                  | ปัจจุบันไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรม แต่อยู่ในระหว่างเฝ้าระวังสถานการณ์                                                                                                        |
| 9. สุโขทัย          | เมือง สวรรคโลก ศรีนคร ศรีสำแลย์ ศรีสำโรง กงไกรลาศ                                                    | ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่และมวลน้ำสะสมจากแม่น้ำยมตอนบนเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมในหลายพื้นที่                                                                |
| 10. อุดรดิตถ์       | ปากท่า                                                                                               | ปัจจุบันยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น                                                                                                                                 |
| 11. นครพนม          | เมือง ศรีสงคราม                                                                                      | ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1 - 2 วัน                                                                                                      |
| 12. หนองคาย         | เมือง ท่าบ่อ เฝ้าไร่ โพนพิสัย รัตนวาปี สังคม ศรีเชียงใหม่                                            | ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2 - 3 วัน                                                                                                      |
| 13. อุดรธานี        | เมือง ไชยวาน หนองหาน กุมภวาปี ศรีธาตุ พิบูลย์รักษ์ เพ็ญ ประจักษ์ศิลปาคม กู่แก้ว ทุ่งฝน               | ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3 - 4 วัน                                                                                                      |
| 14. พระนครศรีอยุธยา | เสนา บางบาล ผักไห่                                                                                   | ระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ                                                                                                                     |
| 15. สุพรรณบุรี      | สองพี่น้อง                                                                                           | ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง หากไม่ได้รับมวลน้ำจากภาคเหนือ คาดว่าจะสามารถเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว                                                                |
| 16. อ่างทอง         | โพธิ์ทอง วิเศษชัยชาญ                                                                                 | ระดับน้ำเพิ่มขึ้น น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร                                                                                                                                 |

### 3. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 67)

**ด้านพืช** ได้รับผลกระทบ 33 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 121,708 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 758,377 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 641,576 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 89,080 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 27,721 ไร่

**ด้านประมง** ได้รับผลกระทบ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และจังหวัดภูเก็ต เกษตรกร 13,107 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 10,514 ไร่ (บ่อปลา 9,938 ไร่/บ่อกุ้ง 577 ไร่) กระชัง 80,807 ตร.ม.

**ด้านปศุสัตว์** ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครพนม หนองคาย มหาสารคาม อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 54,026 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 3,290,033 ตัว แบ่งเป็น โค 86,342 ตัว กระบือ 18,139 ตัว สุกร 74,129 ตัว แพะ/แกะ 3,584 ตัว และสัตว์ปีก 3,107,839 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,476.55 ไร่

### 4. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

4.1 สนับสนุนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย (ณ วันที่ 30 ส.ค.67) จังหวัดน่าน จำนวน 800 ชุด โดยรวมทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 ส.ค. 67 จำนวน 17,490 ชุด แบ่งเป็น เชียงราย(2,730) พะเยา(1,300) แพร่(8,100) และจังหวัดน่าน(5,000) สนับสนุนอาหารแห้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา 360 ชุด

4.2 กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ รวม 5,382 หน่วย แบ่งเป็น เครื่องสูบน้ำ 2,289 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 617 เครื่อง และเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 2,476 หน่วย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66 – ปัจจุบัน ดำเนินการช่วยเหลือแล้ว 646 หน่วย แบ่งเป็น เครื่องสูบน้ำ 533 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 50 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 7 คัน และเครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ 56 หน่วย

4.3 กรมปศุสัตว์ อพยพสัตว์ จำนวน 230,305 ตัว ให้อาหารสัตว์พระราชทาน 100,565 กิโลกรัม ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ/ยาปฏิชีวนะ วิตามิน) 11,641 ซอง รักษาสัตว์ 7,082 ตัว ฝูงยังชีพสัตว์ 45 ฝูง

4.4 กรมประมง โดยกองตรวจการประมง จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ เรือตรวจการประมง ช่วยนำส่งเสบียงอาหาร และน้ำดื่ม ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แพร่ น่าน สุโขทัย

4.5 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

- ศูนย์ขยายพันธุ์พืช จำนวน 10 แห่ง จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืชไว้พร้อมแล้ว ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่เกษตรกรสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็นอาหารลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเพิ่มรายได้ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก จำนวน 92,000 ซอง ประกอบด้วย พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจียบเขียว ต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร จำนวน 28,000 ซอง และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น

- ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จำนวน 9 แห่ง ได้ดำเนินการจัดเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ทั้งแบบพร้อมใช้ และหัวเชื้อขยายพร้อมสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการพ่นพองกันเชื้อสาเหตุโรคพืชสำหรับพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล หลังน้ำลด

- ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรการเกษตร ที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย

4.6 กรมการข้าว เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคเหนือ จำนวน 5,200 ตัน

4.7 กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมสารเร่งซูปเปอร์ พด.6 เพื่อบำบัดน้ำเสีย

## 5. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 67)

### 5.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 47,805 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 23,863 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (43,136 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55) มากกว่าปี 2566 จำนวน 5,669 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 376.05 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 172.06 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 28,532 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 44,813 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 63 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 21,274 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2566 (39,392 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56) มากกว่า ปี 2566 จำนวน 5,421 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 322.16 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 123.22 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 26,113 ล้าน ลบ.ม.

| ภาค      | ขนาดใหญ่        |                       |            |           |        |             | ขนาดกลาง        |                       |            |           |        |             | รวม             |                       |            |           |        |             | รับได้อีก |
|----------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|
|          | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาตรน้ำ |           |        |             |           |
|          |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ    | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |           |
| เหนือ    | 8               | 24,825                | 14,568     | 59        | 7,823  | 43          | 80              | 1,083                 | 781        | 72        | 691    | 70          | 88              | 25,908                | 15,349     | 59        | 8,513  | 45          | 10,559    |
| ตอน.     | 12              | 8,368                 | 4,006      | 48        | 2,354  | 35          | 226             | 2,061                 | 1,222      | 59        | 1,055  | 56          | 238             | 10,429                | 5,228      | 50        | 3,409  | 40          | 5,201     |
| กลาง     | 3               | 1,419                 | 398        | 28        | 338    | 25          | 27              | 419                   | 186        | 44        | 161    | 41          | 30              | 1,838                 | 584        | 32        | 499    | 29          | 1,253     |
| ตะวันตก  | 2               | 26,605                | 20,369     | 77        | 7,092  | 53          | 8               | 164                   | 46         | 28        | 35     | 23          | 10              | 26,769                | 20,415     | 76        | 7,127  | 53          | 6,353     |
| ตะวันออก | 6               | 1,515                 | 833        | 55        | 738    | 52          | 52              | 1,006                 | 498        | 50        | 442    | 47          | 58              | 2,520                 | 1,331      | 53        | 1,180  | 50          | 1,190     |
| ใต้      | 4               | 8,194                 | 4,640      | 57        | 2,929  | 45          | 42              | 679                   | 259        | 38        | 205    | 33          | 46              | 8,874                 | 4,899      | 55        | 3,134  | 44          | 3,975     |
| รวม      | 35              | 70,926                | 44,813     | 63        | 21,274 | 45          | 435             | 5,411                 | 2,992      | 55        | 2,589  | 52          | 470             | 76,337                | 47,805     | 63        | 23,863 | 46          | 28,532    |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 14,209 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,513 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 165.06 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 23.73 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 10,662 ล้าน ลบ.ม.

| อ่างเก็บน้ำ     | ปริมาณน้ำในอ่างฯ |               | ปริมาณน้ำใช้การได้ |             | ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ |          | ปริมาณน้ำระบาย |          | ปริมาณน้ำรับ<br>ได้อีก |
|-----------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|------------------------|
|                 | ปริมาณน้ำ        | % ความจุอ่างฯ | ปริมาณน้ำ          | % น้ำใช้การ | วันนี้              | เมื่อวาน | วันนี้         | เมื่อวาน |                        |
| ภูมิพล          | 6,256            | 46            | 2,456              | 25          | 68.74               | 71.61    | 3.00           | 5.00     | 7,206                  |
| สิริกิตี        | 7,263            | 76            | 4,413              | 66          | 67.30               | 91.82    | 2.99           | 2.96     | 2,247                  |
| ภูมิพล+สิริกิตี | 13,519           | 59            | 6,869              | 42          | 136.04              | 163.43   | 5.99           | 7.96     | 9,453                  |
| แควน้อยฯ        | 409              | 44            | 366                | 41          | 17.95               | 17.25    | 3.89           | 3.89     | 530                    |
| ป่าสักชลสิทธิ์  | 282              | 29            | 279                | 29          | 11.07               | 10.11    | 13.85          | 13.86    | 678                    |
| รวมทั้งหมด      | 14,209           | 57            | 7,513              | 41          | 165.06              | 190.79   | 23.73          | 25.71    | 10,662                 |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)+1

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ จำนวน 10 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (25%) อ่างฯ น้ำพุ (25%) อ่างฯ จุฬารัตน์ (28%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (7%) อ่างฯ ลำตะคอง (23%) อ่างฯ สิรินคร (28%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (29%) อ่างฯ ทับเสลา (13%) อ่างฯ กระเสียว (16%) และอ่างฯ คลองสียัด (25%)

### 5.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำวัง แม่น้ำน่าน แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำตาปี ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำปิง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำยม ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,485 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,390 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +21.44 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 4.26 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหล 1,399 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,349 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.19 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.93 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +12.46 ม.รทก. (เมื่อวาน +12.28 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 94 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 88 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 76 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 17 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เชื่อนพระรามหก 228 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 221 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 28 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 25 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 11 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 3 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 108 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 106 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 15 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 8 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 26 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 29 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,425 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,477 ลบ.ม./วินาที)

### 5.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

| แม่น้ำ    | จุดเฝ้าระวัง                | ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร) |            |            |            |            |            |           | เกณฑ์ | หมายเหตุ                                       |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|------------------------------------------------|
|           |                             | 26 ส.ค. 67              | 27 ส.ค. 67 | 28 ส.ค. 67 | 29 ส.ค. 67 | 30 ส.ค. 67 | 31 ส.ค. 67 | 1 ก.ย. 67 |       |                                                |
| เจ้าพระยา | ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี      | 0.12                    | 0.12       | 0.07       | 0.12       | 0.11       | 0.10       | 0.10      | ปกติ  | - เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร                |
| เจ้าพระยา | ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี      | 0.15                    | 0.14       | 0.14       | 0.13       | 0.12       | 0.11       | 0.10      | ปกติ  | - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร |
| เจ้าพระยา | ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม. | 0.16                    | 0.15       | 0.15       | 0.14       | 0.13       | 0.12       | 0.11      | ปกติ  | - เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร   |

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

### 5.4 สถานการณ์น้ำโขง

| สถานี                    | ระดับตลิ่ง | ระดับน้ำ<br>1 ก.ย. 67 | + สูงกว่าตลิ่ง<br>- ต่ำกว่าตลิ่ง |
|--------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| อ.เชียงแสน จ.เชียงราย    | 12.80      | 5.40                  | -7.40                            |
| อ.เชียงคาน จ.เลย         | 16.00      | 12.59                 | -3.41                            |
| อ.เมือง จ.หนองคาย        | 12.20      | 11.32                 | -0.88                            |
| อ.เมือง จ.นครพนม         | 12.00      | 10.80                 | -1.20                            |
| อ.เมือง จ.มุกดาหาร       | 12.50      | 10.10                 | -2.40                            |
| อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 14.50      | 10.85                 | -3.65                            |

หมายเหตุ ข้อมูลจาก [www.drw.go.th](http://www.drw.go.th)

## 6. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 16 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

**สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2567**

- **ภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง** มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเหลือบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม นครสวรรค์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ การเกษตร จ.นครราชสีมา(สีคิ้ว สูงเนิน ปักธงชัย วังน้ำเขียว โชคชัย ครบุรี เสงสัย เมือง หนองบุญมาก ห้วยแถลง ลำทะเมนชัย) บุรีรัมย์(โนนสุวรรณ ปะคำ ประโคนชัย นางรอง โนนดินแดง หนองกี่ พลับพลาชัย คูเมือง สตึก แคนดง) มหาสารคาม(พยัคฆภูมิพิสัย) สุรินทร์(ชุมพลบุรี) นครสวรรค์(ไพศาล ท่าตะโก เมือง) กาญจนบุรี(ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ เลาขวัญ) สุพรรณบุรี(ด่านช้าง) ราชบุรี(บ้านคา จอมบึง เมือง โพธาราม ปากท่อ วัดเพลง) เพชรบุรี(หนองหญ้าปล้อง เขาย้อย แก่งกระจาน ท่ายาง ชะอำ) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน ปรานบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี เมือง)



- การกักการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ ทำให้มีฝนตกบริเวณ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำแชะ(นครราชสีมา) เขื่อนลำน้ำรอง(บุรีรัมย์) อ่างเก็บน้ำกระเสียว(สุพรรณบุรี) เขื่อนปราณบุรี (ประจวบคีรีขันธ์) และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 38 อ่าง

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 29 สิงหาคม 2567)

การปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นปฏิบัติการ จำนวน 3,189 เที่ยวบิน (4,781:27 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 133.025 ตัน ปริมาณการใช้น้ำ 283,800 ลิตร และปฏิบัติการโดย Ground Base Generator (GBG) จำนวน 19 ครั้ง พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 1,181 นัด รายงานพื้นที่ฝนตก รวม 70 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตรวต นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

## 7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 67)

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้าว    | 1. โรคไหม้ข้าว          | พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี จันทบุรี และพังงา)<br>จำนวน 578 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 162 ไร่                                                                                                                        | - ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก พ่นเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 2. หนอนกระทู้กล้า       | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และอุบลราชธานี)<br>จำนวน 355 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 13 ไร่                                                                                                                                                                                                                 | - กำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัยของหนอนกระทู้กล้า ถ้ามีความจำเป็นในการใช้ สารเคมีควรสวมหน้ากากได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 20 มล. หรือเพนโตรไทออน อัตรา 30 มล. เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลาย                                                                                                                                                       |
|         | 3. แมลงหี้ยข้าว         | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อ่างทอง)<br>จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 960 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                    | - เมื่อพบแมลงหี้ยข้าวเป็นจำนวนมาก กรณีที่จำเป็นต้องใช้สารเคมี สามารถใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยใช้อัตราตามคำแนะนำในฉลาก                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 4. หนอนห่อใบข้าว        | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ อ่างทอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี)<br>จำนวน 423 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 79 ไร่                                                                                                                                                                                             | - หากสำรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว ป้องกันโดย พ่นเชื้อราบีเวอร์เรีย อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว โดยการระบายออกเป็นครั้งคราวแบบ เปียกสลับแห้ง แต่หากสถานการณ์รุนแรงและจำเป็นต้องใช้ สารเคมีกำจัดแมลง ควรใช้ในอัตราตามฉลากแนะนำ                                                                                                                                                     |
|         | 5. เพลี้ยกระโดดหลังขาว  | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 251 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 51 ไร่                                                                                                                                                                                                               | - หมั่นสำรวจแปลงข้าวอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 6. เพลี้ยไฟ             | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และกรุงเทพมหานคร)<br>จำนวน 6 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 5 ไร่                                                                                                                                                                                                                                    | - เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ใช้สาร อีโทเฟนพรอกซ์ คาร์โบซัลแฟน ไอโซพอร์ทคาร์บ ฟิโนบูคาร์บ โดยเลือกใช้ สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่น ทุก 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 7. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (น่าน ขอนแก่น อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี)<br>จำนวน 542 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 429 ไร่                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| มะพร้าว | 1. หนอนหัวดำ            | พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรวต ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 43,117 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 219 ไร่ | - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปลอ่ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปลอ่ยแตนเบียน ไชทริโครแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปลอ่ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนโซเอท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน<br>- แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงดำหนาม กัดกินไปเผาทำลาย ปลอ่ยแตนเบียนอะซีโคเดส 3-5 ครั้ง เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว |

| ชนิดพืช         | ศัตรูพืช          | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                              | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2. แมลงดำหนาม     | พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (นครพนม กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 12,764 ไร่ <u>การระบาดลดลง 16 ไร่</u> | - ป้องกันกำจัดให้น้ำมันพ่นสารฆ่าไรในระยยะมะพร้าวติดจัน จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ควรใช้ สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง<br>- ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และ เก็บเศษซากพืชนำไปเผานอกแปลงทันที และหมั่นสำรวจ สวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ |
|                 | 3. โรสสีขามะพร้าว | พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร สงขลา และชุมพร)<br>จำนวน 427 ไร่ <u>การระบาดลดลง 4 ไร่</u>                                                                                             | - ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักด้                                                                                                                                                                            |
|                 | 4. ด้วงวง         | พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 916 ไร่ <u>การระบาดลดลง 15 ไร่</u>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | 5. ด้วงแรด        | พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา และ สุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 5,323 ไร่ <u>การระบาดลดลง 21 ไร่</u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ปาล์ม<br>น้ำมัน | 1. ด้วงแรด        | พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 1,345 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 42 ไร่</u>                                                                                                           | - ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักด้ และระยะตัวหนอน                                                                                                                                                                           |
|                 | 2. ด้วงกุหลาบ     | พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 486 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 228 ไร่</u>                                                                                                                               | - หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณ โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน                                                                                                                                                               |
|                 | 3. หนอนปลอกเล็ก   | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 891 ไร่ <u>การระบาดลดลง 46 ไร่</u>                                                                                                                                                                  | - พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน                                                                                                                                                                   |
|                 | 4. โรคลำต้นเน่า   | พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 12,103 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 12 ไร่</u>                                                                                                  | - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 5. โรคทะลายเน่า   | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร นราธิวาส สงขลา และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 170 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                       | - ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบ เป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง                                                                                                                                                                         |
|                 | 6. โรคใบจุด       | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ยะลา นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 112 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่</u>                                                                                                                                          | - ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผา ทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ                                                                                                                                                   |

| ชนิดพืช             | ศัตรูพืช                                                                                                                                    | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 7. โรคใบจุดสาหร่าย                                                                                                                          | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 351 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 40 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ยางพารา             | 1. โรคครากขาว<br><br>2. โรคใบร่วงยางพารา<br><br>3. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา<br><br>4. โรคหน้ำยางแห้ง                                     | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 2,056 ไร่ การระบาดลดลง 14 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (น่าน แพร่ บึงกาฬ กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช พังงา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 3,240 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 527 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (น่าน แพร่ สุโขทัย หนองคาย กระบี่ นราธิวาส ปัตตานี พังงา ยะลา และสงขลา)<br>จำนวน 127,483 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3,019 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ยโสธร สกลนคร ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 4,872 ไร่ การระบาดลดลง 13 ไร่                                                                                                                                                                                                                       | - คำนแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนาดูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น<br>- ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา<br>- รมรังค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ<br>- เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือ จนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| กาแฟ                | 1. โรคราสนิม<br><br>2. หนอนกาแฟสีแดง                                                                                                        | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่)<br>จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่)<br>จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| มันสำปะหลัง         | 1. เพลี้ยแป้ง<br>มันสำปะหลัง<br><br>2. ไรแดงมันสำปะหลัง<br><br>3. โรคใบด่าง<br>มันสำปะหลัง<br><br>4. โรคโคนเน่าหัวเน่า<br><br>5. โรคพุ่มแจ้ | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สกลนคร จันทบุรี ชลบุรี และสระแก้ว)<br>จำนวน 152 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ ชลบุรี และระยอง)<br>จำนวน 8,740 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 33 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี)<br>จำนวน 373,271 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 156,160 ไร่<br><br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา และชลบุรี)<br>จำนวน 83 ไร่ การระบาดคงที่<br><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กาฬสินธุ์ สุรินทร์ จันทบุรี และชลบุรี)<br>จำนวน 480 ไร่ การระบาดคงที่ | - ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง<br>- ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน<br>- ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและ ดักด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหาร สามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะ หนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วอลโวไลโอโพลีโวลไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระทุ้งหอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน<br>- ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ<br>- ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยง การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ<br>- ควรกรร่งแปลงปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิธ-อะลูมิเนียม |
| ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ | 1. หนอนกระทุ้งข้าวโพด<br>ลายจุด (fall amylworm)                                                                                             | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (เชียงใหม่ อุทัยธานี นครราชสีมา จันทบุรี สระแก้ว ยะลา และสตูล)<br>จำนวน 522 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 25 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - ควบคุมการระบาดของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สับปะรด             | 1. โรคเหี่ยว                                                                                                                                | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ตราด ระยอง และ ประจวบคีรีขันธ์)<br>จำนวน 461 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 16 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป็นตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                                                                                                         | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อ้อย    | 1. หนอนกออ้อย<br>2. โรคราขาว<br>3. โรคเส้ดำ<br>4. ดั้วหนวดยาว                                                                                                                    | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (นครราชสีมา)<br>จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ขอนแก่น และนครราชสีมา)<br>จำนวน 192 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 42 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สระแก้ว)<br>จำนวน 153 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (อุทัยธานี)<br>จำนวน 240 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน<br>ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง<br>- ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคราขาว<br>หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคและแมลงพาหะ เมื่อพบการระบาดของโรครุนแรงควรไถทำลายต่ออ้อย<br>- เมื่อพบกออ้อยเริ่มแสดงอาการเส้ดำ ควรตัดเส้ดำออก<br>ขณะเริ่มปรากฏอาการ ก่อนที่เยื่อหุ้มเส้ดำจะหลุดออก<br>นำใส่ถุงไปทำลายนอกแปลงปลูก<br>- ในแหล่งที่พบการระบาด หลังวางท่อนพันธุ์ควรมีการฉีดพ่นด้วยสารแขวนลอยของเชื้อราเขียว จิงกลบ จะสามารถป้องกันตัวหนอนได้ประมาณ 1 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ทุเรียน | 1. เพลี้ยไฟ<br>2. เพลี้ยไก่แจ้<br>3. เพลี้ยแป้ง<br>4. ไรแดง<br>5. โรครากเน่าโคนเน่า<br>6. โรคราไหมหรือใบไหม้<br>7. โรคราใบจุดสาหร่าย<br>8. เพลี้ยหอยเกล็ด<br>9. เพลี้ยจักจั่นฝอย | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 769 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 15 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 282 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 13 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และยะลา)<br>จำนวน 191 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 13 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 707 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 91 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (เลย จันทบุรี ตรด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 4,705 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 71 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตรด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 298 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 3 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตรด กระบี่ ชุมพร ปัตตานี ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 806 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 6 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตรด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสงขลา)<br>จำนวน 139 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 8 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตรด ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 930 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่ | - เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโพรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอะมีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีโทกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน<br>- เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ดส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย<br>- เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์โกต์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซีอัตรา 40 มล. โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน<br>- โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- เมื่อพบการระบาดของโรคราไหมหรือใบไหม้มากควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบให้ทั่วทั้งต้น<br>- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคราใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบหรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรครายังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช<br>- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ<br>- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือไซเพอร์เมทริน/ฟิซาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                             | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 10. โรคราดำ<br>11. โรคราสีชมพู<br>12. หนอนเจาะผล<br>13. หนอนเจาะเมล็ด                                | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร ยะลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 140 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 6 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตรวาท กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 140 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ชุมพร และยะลา)<br>จำนวน 10 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล)<br>จำนวน 1,152 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 495 ไร่                                                                                                                                                                                          | - เมื่อพบคราบราสีดํา พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดํา และสารเหนียวที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง<br>- ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคราที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด<br>- ท่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เงาะ    | 1. เพลี้ยแป้ง<br>2. โรคใบจุดสาหร่าย<br>3. หนอนคืบกินใบ<br>4. โรคราแป้ง                               | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และนราธิวาส)<br>จำนวน 15 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงราย จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส)<br>จำนวน 193 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 11 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 19 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และจันทบุรี)<br>จำนวน 17 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>                                                                                                                                                                                                                                             | - ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง<br>- ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์<br>- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ในระยะที่ต้นเงาะแตกใบอ่อนถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร<br>- โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มังคุด  | 1. เพลี้ยไฟ<br>2. หนอนกินใบ<br>3. หนอนซอนใบ<br>4. โรคใบจุด<br>5. โรคแอนแทรคโนส<br>6. โรคใบจุดสาหร่าย | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตรวาท ระยอง ชุมพร และนราธิวาส)<br>จำนวน 222 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 7 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี)<br>จำนวน 286 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 13 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)<br>จำนวน 226 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง นราธิวาส และชุมพร)<br>จำนวน 207 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 45 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร)<br>จำนวน 79 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และนราธิวาส)<br>จำนวน 348 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่ | - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้งขณะที่มังคุดอยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง<br>- เมื่อพบใบอ่อนมังคุด ถูกทำลายเกิน 20% ให้พ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน<br>- เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน<br>- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 30-80 กรัม หรือคาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม<br>- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วต้น |
| ลำไย    | 1. เพลี้ยแป้ง<br>2. โรคราดำ                                                                          | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสมุทรสาคร)<br>จำนวน 87 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 21 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา และจันทบุรี)<br>จำนวน 235 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 4 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทยอน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน<br>- พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟลูทริน อัตรา 40-50 กรัม<br>- หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                             | สถานการณ์                                                                                                                                                     | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 3. โรคพุ่มไม้กวาด<br>4. หนอนคืบกินใบ | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 89 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และจันทบุรี)<br>จำนวน 12 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 6 ไร่ | ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง<br>- เขี่ยกิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแด้ไปทำลาย<br>หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมบ์ดาไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร |

## 8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 67)

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค 15 จุด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี สงขลา สระแก้ว เลย มหาสารคาม มีพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 100 จุด ประกอบด้วย อุบลราชธานี สงขลา ชลบุรี สุรินทร์ กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู เลย ฉะเชิงเทรา ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี มหาสารคาม สมุทรปราการ ตาก นครพนม นครราชสีมา พัทลุง มุกดาหาร สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร ชัยภูมิ พิจิตร สุพรรณบุรี และพบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มที่จังหวัด อุบลราชธานี สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 19 สิงหาคม 2567 ทั้งหมด 30 จังหวัด 203 จุด คือ ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครนายก อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร นครราชสีมา เลย มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก อุตรดิตถ์ พิจิตร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้