




ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com
[http:// www.moac.go.th](http://www.moac.go.th)

รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

วันที่ 7 มกราคม 2568 (เวลา 08.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 06.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้นวันที่ 7 มกราคม 2568 เวลา 01.00 น.

ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้ง รวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองในระยะนี้: ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก โดยคาดว่าจะมีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันคงที่ เนื่องจากอัตราการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงปานกลาง และลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 6 ม.ค. 68 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 7 ม.ค. 68



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เมือง	นราธิวาส	80.8	ฝนตกหนัก
2	อ.เมือง	นครศรีธรรมราช	10.7	ฝนตกปานกลาง
3	อ.เมือง	สงขลา	1.7	ฝนตกเล็กน้อย
4	อ.เมือง	พัทลุง	1.6	ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 – 7 มกราคม 2568 พื้นที่ประสบอุทกภัย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง ชุมพร นราธิวาส ตรัง ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.1 ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ตรัง ปัตตานี ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 91,641 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 187,557 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 56,804 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 14,107 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 116,646 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 8,079 ราย พื้นที่ 26,968 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 16,147 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 3,040 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 7,781 ไร่ คิดเป็นเงิน 55.37 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 470 ราย พื้นที่ 1,643 ไร่ วงเงิน 2.92 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 2568)

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 13,950 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 30,396 ไร่ (บ่อปลา 18,445 ไร่ บ่อกุ้ง 11,951 ไร่) กระชัง 107,691 ตอม. (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 2568)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 204,668 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 12,128,023 ตัว แบ่งเป็น โค 390,074 ตัว กระบือ 13,860 ตัว สุกร 311,672 ตัว แพะ/แกะ 203,429 ตัว และสัตว์ปีก 11,208,988 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 7,496.10 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 2568)

2.2 การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

2.2.1 กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องสูบน้ำ 65 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ 27 เครื่อง

2.2.2 กรมประมง โดยกองตรวจการประมง ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 18 ธ.ค. 2567 ได้ดำเนินการช่วยเหลือ ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ยะลา ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี ให้ความช่วยเหลือ จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ 58 นาย รถยนต์/รถยนต์บรรทุกสูง 69 คัน เรือ 23 ลำ โดยช่วยนำส่งเสบียงอาหารและน้ำดื่ม พร้อมทั้งอพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็ก และคนชรา ในพื้นที่ประสบภัยสู่พื้นที่ปลอดภัย

2.2.3 กรมปศุสัตว์ อพยพสัตว์ จำนวน 441,931 ตัว (โค 101,151 ตัว กระบือ 2,180 ตัว สุกร 824 ตัว แพะ 18,286 ตัว แกะ 2,239 ตัว สัตว์ปีก 317,251 ตัว เกษตรกร 62,383 ราย) สนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 1,091,740 กิโลกรัม ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (ยาถ่ายพยาธิ/แร่ธาตุ อื่นๆ) 1,147 ของ รักษาสัตว์ 797 ตัว ฝูงยังชีพสัตว์ 603 ฝูง

2.2.4 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เตรียมพร้อมช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ เตรียมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด (กอป.) 2,800 ขวด และเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 5,500 กิโลกรัม เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุซอง (กขพ.) จำนวน 66,235 ซอง สำหรับฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด

3. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 68)

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 59,801 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 78 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 35,860 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (58,353 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) มากกว่าปี 2567 จำนวน 1,448 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 36.81 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 136.41 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 16,562 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 55,804 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 32,265 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (54,020 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 76) มากกว่า ปี 2567 จำนวน 1,784 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 28.84 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 122.41 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 15,148 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาตรน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	20,026	81	13,281	73	80	1,083	930	86	839	85	88	25,908	20,956	81	14,120	74	4,978
ตอน.	12	8,368	5,930	71	4,278	64	226	2,061	1,476	72	1,310	69	238	10,429	7,406	71	5,588	65	3,023
กลาง	3	1,419	1,011	71	951	70	27	419	276	66	251	64	30	1,838	1,287	70	1,203	69	550
ตะวันตก	2	26,605	21,875	82	8,598	65	8	164	88	54	77	51	10	26,769	21,963	82	8,675	64	4,806
ตะวันออก	6	1,515	1,056	70	962	68	52	1,006	685	68	629	66	58	2,520	1,741	69	1,591	67	779
ใต้	4	8,194	5,906	72	4,196	65	42	680	542	80	488	78	46	8,874	6,448	73	4,683	66	2,426
รวม	35	70,926	55,804	79	32,265	68	435	5,411	3,997	74	3,595	72	470	76,338	59,801	78	35,860	68	16,562

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 19,923 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13,227 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 73) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 7.21 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 65.43 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 4,948 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	10,147	75	6,347	66	4.98	2.38	31.00	31.00	3,315
สิริกิตี	8,265	87	5,415	81	2.23	4.68	27.94	28.01	1,245
ภูมิพล+สิริกิตี	18,412	80	11,762	72	7.21	7.06	58.94	59.01	4,560
แควน้อยฯ	768	82	725	81	0.00	0.00	2.59	2.59	171
ป่าสักชลสิทธิ์	744	77	741	77	0.00	0.00	3.90	3.46	216
รวมทั้งหมด	19,923	80	13,227	73	7.21	7.06	65.43	65.06	4,948

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปของความจุอ่างฯ จำนวน 11 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ สิริกิตี (87%) อ่างฯ แม่งัดสมบูรณ์ชล (107%) อ่างฯ อ่างฯ ก้วลม (92%) อ่างฯ ก้วคอบมา (104%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (82%) อ่างฯ ลำปาว (82%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (82%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (82%) อ่างฯ บางพระ (81%) อ่างฯ หนองปลาไหล (93%) และอ่างฯ ประแสร์ (81%)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 1 อ่างฯ คือ อ่างฯ ลำตะคอง (29%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 500 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 506 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +18.15 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 7.55 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 90 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 90 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.75 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.81 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.61 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.61 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 151 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 156 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 122 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 21 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 8 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 10 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 10 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 69 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 69 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิศิลป์) 11 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 36 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 215 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 218 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 19 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 9 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 70 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 80 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 37 ลบ.ม./วินาที

อ่าวไทย สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 272 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 167 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		31 ธ.ค. 67	1 ม.ค. 68	2 ม.ค. 68	3 ม.ค. 68	4 ม.ค. 68	5 ม.ค. 68	6 ม.ค. 68		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	ปกติ	- เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร - เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร - เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกพรุ จ.นนทบุรี	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	ปกติ	
เจ้าพระยา	ทำนบกพรุชลประทานสามเสน กทม.	0.21	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

3.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 6 ม.ค. 68	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.28	-10.52
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	5.35	-10.65
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	2.05	-10.15
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.96	-10.04
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	2.25	-10.25
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.53	-11.97

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th


4. การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2567/68

แผนการจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้ง ปี 2567/68 (วันที่ 1 พ.ย.67 ถึง 30 เม.ย.68) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ปริมาณน้ำต้นทุนสามารถใช้การได้ จำนวน 39,405 ล้าน ลบ.ม. โดยการวางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ จำนวน 29,170 ล้าน ลบ.ม.

ผลการจัดสรรน้ำ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – ปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 9,456 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 32 ของแผนจัดสรรน้ำ ส่วนในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) วันนี้ใช้น้ำไป 65.43 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงปัจจุบัน ใช้น้ำไปแล้ว 2,958 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33 ของแผนจัดสรรน้ำ

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่	แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2567/68 (1 พ.ย.67 - 30 เม.ย.68)					ผลการจัดสรรน้ำ	
	อุปโภค-บริโภค	รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ	การเกษตร	อุตสาหกรรม	รวม	ปริมาณน้ำ	% แผนจัดการจัดสรรน้ำ
ทั่วประเทศ	3,050	8,765	16,555	800	29,170	9,456	32
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	1,150	1,305	6,410	135	9,000	2,958	33



5. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2567/68

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2567/68

ทั่วประเทศ จำนวน 15.38 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 12.73 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.65 ล้านไร่

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 8.81 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.05 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.76 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2567/68 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2568)

ทั่วประเทศ จำนวน 8.27 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 7.44 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.83 ล้านไร่

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 6.16 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 5.83 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.33 ล้านไร่

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2567/68			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2567/68			% ผลปลูก ข้าวรอบ 2 เทียบกับแผน
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม ทั้งหมด	
ทั่วประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	10.02	0.62	10.64	6.21	0.32	6.53	62
	นอกเขตชลประทาน	2.71	2.03	4.74	1.23	0.51	1.74	45
	รวม	12.73	2.65	15.38	7.44	0.83	8.27	58
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.47	0.09	6.56	4.90	0.15	5.05	76
	นอกเขตชลประทาน	1.58	0.67	2.25	0.93	0.18	1.11	59
	รวม	8.05	0.76	8.81	5.83	0.33	6.16	72

6. ผลกระทบด้านการเกษตร (ช่วงภัย 16 ก.ค. - ปัจจุบัน) ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 68

6.1 ดินโคลนทับถม

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เลย สุรินทร์ และจังหวัดหนองคาย **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 1,203 ราย พื้นที่ 1,678 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,109 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 116 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 61 ไร่ คิดเป็นเงิน 11.09 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 568 ราย พื้นที่ 624 ไร่ วงเงิน 3.79 ล้านบาท

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.2 อุทกภัย

ด้านพืช ได้รับความเสียหาย 53 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม นครนายก ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กระบี่ ตรัง ยะลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี **สำรวจพบความเสียหายสิ้นเชิงแล้ว** เกษตรกร 156,434 ราย พื้นที่ 1,202,605 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,062,046 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 127,385 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 13,174 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,728.75 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 43,101 ราย พื้นที่ 239,230 ไร่ วงเงิน 350.99 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 46 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ตรัง ภูเก็ต ยะลา สตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 11,049 ราย พื้นที่รวม 13,366 ไร่ กระชัง 8,701 ตอม. คิดเป็นเงิน 69.02 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 5,163 ราย พื้นที่ 5,134 ไร่ กระชัง 6,505 ตอม. วงเงิน 26.74 ล้านบาท

ด้านปศุสัตว์ ได้รับความเสียหาย 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครพนม มหาสารคาม เลย หนองคาย อุบลราชธานี ตราด และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,401 ราย สัตว์ตาย/สูญหายรวม 139,906 ตัว แบ่งเป็น โค 197 ตัว กระบือ 34 ตัว สุกร 128 ตัว แพะ/แกะ 52 ตัว และสัตว์ปีก 139,495 ตัว แปลงหญ้า 395 ไร่ วงเงิน 13.54 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,077 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 93,716 ตัว แปลงหญ้า 142 ไร่ วงเงิน 6.71 ล้านบาท

7. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 19 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี กาญจนบุรี ระยอง ลพบุรี จันทบุรี สระแก้ว ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ เติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวมทั้งสถานการณ์ PM 2.5

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 5 มกราคม 2568

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567

- หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงและตัดแปรสภาพอากาศ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยฯ จังหวัดตาก แพร่ ระยอง กาญจนบุรี และหน่วยฯ อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ติดตาม เฝ้าระวังและช่วงชิงสภาพอากาศ 1 หน่วย คือ หน่วยฯ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 – 5 มกราคม 2568)

การปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นปฏิบัติการ 35 วัน จำนวน 575 เที่ยวบิน (922:45 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 157.86 ตัน ปริมาณการใช้น้ำ 397,080 ลิตร **ปฏิบัติการ จำนวน 6 หน่วย** ได้แก่ หน่วยฯ อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ ตาก ระยอง กาญจนบุรี และหน่วยฯ จังหวัดแพร่ **ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่** กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก แพร่ น่าน ลพบุรี สุโขทัย สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี นครนายก และจังหวัดนครราชสีมา

8. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 68)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคไหม้ข้าว 2. หนอนห่อใบข้าว 3. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 4. เพลี้ยไฟ 5. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 6. โรคขอบใบแห้ง 7. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 8. โรคใบสีส้ม 9. แมลงบั่ว 10. โรคใบขีดสีน้ำตาล	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ชัยนาท เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา สกลนคร อุบลราชธานี และนครราชสีมา) จำนวน 165 ไร่ <u>การระบาดลดลง 3 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชลบุรี สกลนคร อ่างทอง นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี ยะลา นครราชสีมา และมหาสารคาม) จำนวน 131 ไร่ <u>การระบาดลดลง 5 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (เชียงใหม่ น่าน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี และนครศรีธรรมราช) จำนวน 1,299 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร และกาญจนบุรี) จำนวน 1 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตาก อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ น่าน อุทัยธานี สระบุรี มหาสารคาม และฉะเชิงเทรา) จำนวน 212 ไร่ <u>การระบาดลดลง 35 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สกลนคร ชัยนาท ราชบุรี และนครราชสีมา) จำนวน 36 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ จันทบุรี และสกลนคร) จำนวน 21 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (สกลนคร และกาฬสินธุ์) จำนวน 5 ไร่ <u>การระบาดลดลง 70 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุทัยธานี พิจิตร ชัยนาท และพิษณุโลก) จำนวน 1,391 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 555 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (สกลนคร มหาสารคาม และนครราชสีมา) จำนวน 54 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก พ่นเชื้อราไตรโครเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร - กำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัยของหนอนกระทู้กล้า ถ้ามีความจำเป็นในการใช้สารเคมีควรสวมหน้ากากได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 20 มล. หรือเพนิโตรไทออน อัตรา 30 มล. เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวถูกทำลาย - หากสำรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว ป้องกันโดยพ่นเชื้อราบีเวอร์เรีย อัตรา 250 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว แต่หากสถานการณ์รุนแรงจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลง ควรใช้อัตราตามฉลากแนะนำ - หมั่นสำรวจแปลงข้าวอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไธออน 83% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เซฟวิน 85% ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ใช้สาร อีโทเฟนพรอกซ์ คาร์โบซัลแฟน ไอโซไพแรcarb ฟิโนบูคาร์บ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่น ทุก 7 วัน - ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่นทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไอโซไพโรไทโอเลน คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ สเตร์พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตตราไซคลิน ไฮโดรคลอไรด์ ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต - แนะนำเกษตรกรใช้แสงไฟล่อแมลงและทำลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง - ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงในระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเรน บูโพรเฟนิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก - ใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัม/ไร่ สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ หากพบโรคระบาดของโรครุนแรงในระยะแตกกอ ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม เนื่องจากเชื้อสาเหตุทำให้เกิดโรคเมล็ดต่าง
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 27 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร เพชรบุรี สงขลา ชุมพร ตรด กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช สมุทรสงคราม นครราชสีมา พังงา ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา ปัตตานี กระบี่ จันทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี นราธิวาส สุรินทร์ สตูล สระแก้ว ระยอง และมุกดาหาร) จำนวน 43,583 ไร่ <u>การระบาดลดลง 48 ไร่</u>	- ปลอ้ยแตนเบียนบราคอนกำจัดหนอนหัวดำ อัตราไร่ละ 200 ตัว โดยปลอ้ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ปลอ้ยแตนเบียนไซทริโครแกรมมา อัตราไร่ละ 10 แผ่น ๆ ละ 2,000 ตัว โดยปลอ้ย 12 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน และใช้สารเคมีอิมามิกตินเบนโซเอท โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน - แนะนำตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและแมลงค้ำหนามกัดกินไปเผาทำลาย ปลอ้ยแตนเบียนอะซีโคเตส 3-5 ครั้ง

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ตราด สตูล สงขลา พังงา กระบี่ สมุทรสงคราม ตรัง ภูเก็ต จันทบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี กรุงเทพมหานคร ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สระแก้ว และนครราชสีมา) จำนวน 12,502 ไร่ การระบาดลดลง 20 ไร่	เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว - ป้องกันกำจัดให้น้ำมันพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่น จนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ควรใช้ สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย และ เก็บเศษซากพืชนำไปเผานอกแปลงทันที - ใช้กับดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไธเลียซึม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักด้
	3. ไรสีขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี จันทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สระแก้ว ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร ตราด และชัยนาท) จำนวน 510 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่	
	4. ด้วงวง	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี จันทบุรี กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช เพชรบุรี พังงา ระยอง และบุรีรัมย์) จำนวน 1,075 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่	
	5. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ชุมพร ตราด สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี สตูล ฉะเชิงเทรา กระบี่ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ระยอง สงขลา พังงา สมุทรปราการ นครปฐม นครราชสีมา ปราจีนบุรี และร้อยเอ็ด) จำนวน 5,853 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	
ปาล์ม น้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ชลบุรี และสตูล) จำนวน 524 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่	- พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณ ใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี ที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน
	2. ด้วงแรด	พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรัง จันทบุรี และร้อยเอ็ด) จำนวน 1,183 ไร่ การระบาดคงที่	- ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไธเลียซึม เพื่อกำจัดในระยะดักด้ และระยะตัวหนอน
	3. ด้วงกุหลาบ	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ ชลบุรี สตูล ตราด สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และจันทบุรี) จำนวน 637 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่	- หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณ โคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน
	4. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 11,545 ไร่ การระบาดลดลง 31 ไร่	- ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด
	5. โรคทะลายเน่า	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตราด นราธิวาส ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง) จำนวน 101 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ข้อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบ เป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุดนำออกไปเผาทำลายนอกแปลง
	6. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ระยอง ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 95 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผา ทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. โรคใบจุดสาหร่าย 8. หนอนหัวดำ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 372 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 769 ไร่ การระบาดคงที่	
ยางพารา	1. โรคครากขาว 2. โรคใบร่วงยางพารา 3. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา 4. โรคหนำียงแห้ง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,528 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี พังงา ปัตตานี ตราด หนองคาย ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ สตูล และแพร่) จำนวน 3,020 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (ยะลา นราธิวาส สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง น่าน สุราษฎร์ธานี สุโขทัย สตูล อุดรธานี พังงา หนองคาย เชียงราย กระบี่ พะเยา บึงกาฬ ระนอง เลย ภูเก็ต และระยอง) จำนวน 696,011 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 218,574 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ร้อยเอ็ด สกลนคร ชลบุรี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,701 ไร่ การระบาด 8'muj	- คำนแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารารุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพาราอยู่ในช่วงผลัดใบ - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยางควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือ จนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ
กาแฟ	1. โรคราสนิม 2. หนอนกาแฟสีแดง 3. มอดเจาะเมล็ดกาแฟ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และกระบี่) จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (น่าน และชุมพร) จำนวน 16 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง - เมื่อสำรวจพบมอดเจาะผลกาแฟให้วางกับดักสารล่อ (เมทิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ อัตรา 1 : 1) อัตรา 5-10 กับดัก/ไร่ และเดิมสารล่อทุก ๆ 2 สัปดาห์ และใช้เชื้อราบีวเวเรีย DOA B18 (Beauveria bassiana DOA B18) อัตรา 1 - 2 ถุง/น้ำ 10 ลิตร ผสมสารจับใบฉีดพ่นอย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. โรคเน่ามันสำปะหลัง 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า 4. โรคพุ่มแจ้	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สระบุรี ชลบุรี จันทบุรี สกลนคร สระแก้ว และศรีสะเกษ) จำนวน 262 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี สุรินทร์ สกลนคร ระยอง และบุรีรัมย์) จำนวน 255 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 125 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชลบุรี ลำพูน นครราชสีมา และสกลนคร) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 303 ไร่ การระบาดคงที่	- ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบต่าง - ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน - ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและดักแด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหารสามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะหนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วอลโวเลียไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระทู้หอม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน - ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. โรคใบด่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 41 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) จำนวน 1,176,304.53 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 51,231 ไร่	ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี้ยง การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - ควรกรร่งแปลงปลูกเพื่อไม่ให้ น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิธิล-อะลูมิเนียม - โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค ปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียน อายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็น ทางเลือกสุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวก ทองแดง
	6. โรคใบไหม้	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ศรีสะเกษ) จำนวน 131 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่	
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี สระแก้ว ชลบุรี สตูล และมหาสารคาม) จำนวน 19 ไร่ การระบาดลดลง 14 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 326 ไร่ การระบาดลดลง 29 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและปักตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. โรคใบขาว	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครราชสีมา และขอนแก่น) จำนวน 159 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 44 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา และ มหาสารคาม) จำนวน 236 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปลอ้ยแต่นเบียนไซโตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง - ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เมื่อพบ การระบาดของโรครุนแรงควรไถทำลายต่ออ้อย
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยไก่แจ้ 3. เพลี้ยแป้ง 4. หนอนเจาะผล 5. ไรแดง 6. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 732 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ตราด นครศรีธรรมราช ยะลา จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา กระบี่ ระนอง ระยอง สตูล และพังงา) จำนวน 396 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร ตราด จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช และกระบี่) จำนวน 184 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นครศรีธรรมราช และชุมพร) จำนวน 20 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช จันทบุรี ระยอง ชุมพร และตราด) จำนวน 1,061 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี ตราด ยะลา สุราษฎร์ธานี ระยอง สงขลา ปัตตานี ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ระนอง และน่าน) จำนวน 4,627 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่	- เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโพรนิล หรือคาร์โบซัลเฟน เลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไทอะมีโทกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีโทกแซม อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน - เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการ ควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย - เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรง ให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ ไพโรพาร์ไคด์ อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซ์อัตรา 40 มล. - โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - เมื่อพบการระบาดของโรคใบติดหรือใบไหม้มากควรพ่นสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	7. โรคใบติดหรือใบไหม้	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (สงขลา ยะลา จันทบุรี ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และตรัง)	- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบหรือส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรครยังคงระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
	8. โรคใบจุดสาหร่าย	จำนวน 1,221 ไร่ การระบาดลดลง 183 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ยะลา นครศรีธรรมราช ตราด และสงขลา)	- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสมไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ
	9. เพลี้ยหอยเกล็ด	จำนวน 961 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด จันทบุรี ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ และยะลา)	- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซิลแลน อัตรา 50 มล. หรือไซเพอร์เมทริน/ไพฟาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น
	10. เพลี้ยจักจั่นฝอย	จำนวน 180 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (สุโขทัย จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ตราด ระยอง กระบี่ และนครศรีธรรมราช)	โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน
	11. โรคราดำ	จำนวน 769 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร)	- เมื่อพบคราบราสีดำ พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดำ และสารเหนียวที่แมลงปากดูดซับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง
	12. โรคราสีชมพู	จำนวน 64 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่)	- ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคราสีชมพูให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์
	13. หนอนเจาะเมล็ด	จำนวน 151 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สตูล)	ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณเมล็ดที่ตัด
		จำนวน 0.15 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (สตูล)	- ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขบกลางเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมป์ดา-ไซฮาโลทริน
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช)	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง
	2. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงราย จันทบุรี นราธิวาส และนครศรีธรรมราช)	- ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์
	3. หนอนคืบกินใบ	จำนวน 228 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสุราษฎร์ธานี)	- หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
	4. โรคราแป้ง	จำนวน 160 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และจันทบุรี)	- โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล
		จำนวน 22 ไร่ การระบาดคงที่	
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และนครศรีธรรมราช)	- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้งขณะที่มังคุดอยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง
	2. หนอนกินใบ	จำนวน 267 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 14 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช จันทบุรี ชุมพร ระยอง และระนอง)	- เมื่อพบใบอ่อนมังคุด ถูกทำลายเกิน 20% ให้พ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน
	3. หนอนซอนใบ	จำนวน 469 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)	- เมื่อพบหนอนกัดกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน
	4. โรคใบจุด	จำนวน 365 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร)	- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน
	5. โรคแอนแทรคโนส	จำนวน 184 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ชุมพร)	เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 30-80 กรัม
		จำนวน 40 ไร่ การระบาดคงที่	

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	6. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ตรัง และ นราธิวาส) จำนวน 499 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 13 ไร่	- พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรือไอโพรไดโนน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคราดำ 3. โรคพุ่มไม้กวาด 4. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และ สมุทรสาคร) จำนวน 79 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา และ จันทบุรี) จำนวน 222 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 107 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และน่าน) จำนวน 19 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u>	- หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วย สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทออน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน - พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบตาไซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม - หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาด ให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง - เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแด้ไปทำลาย หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปดาไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร

9. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 68)

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค 30 จุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา มีพื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 91 จุด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เลย กรุงเทพมหานคร กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พัทลุง มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ระยอง ศรีสะเกษ สงขลา สมุทรปราการ สระแก้ว สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุบลราชธานี และไม่พบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 22 ธันวาคม 2567 ทั้งหมด 18 จังหวัด 40 จุด คือ กรุงเทพมหานคร สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครนายก บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก อุตรดิตถ์ พัทลุง สงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้