



ข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โทร ๐-๕๖๘๐-๓๕๒๐

ข่าวเตือนภัยด้านการเกษตร

เรื่อง ไรขาวพริก ในพริก



ระวัง ไรขาวพริก ในพริก

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็น และมีความชื้นสูงในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน เตือนผู้ปลูกพริก ในระยะ ออกดอก ติดผล เจริญเติบโตทางลำต้น รับมือไรขาวพริก

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ยอด และดอก ทำให้ใบและยอดหงิกงอ ขอบใบม้วนงอลงด้านล่าง ทำให้ ใบมีลักษณะเรียวแหลม ก้านใบยาว เปราะหักง่าย อาการขึ้นรุนแรงส่วนยอดจะแตกเป็นฝอย ถ้าทำลายดอก กลีบดอกจะ บิดแกระแกร็น ชะงักการเกิดดอก หากระบาดรุนแรง ต้นพริกจะแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต มักพบระบาดในช่วงที่มี อากาศชื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๑. สุ่มสำรวจพริกทุกสัปดาห์ หากพบอาการใบหงิกม้วนงอลงที่เกิดจากการทำลายของไรขาวพริก ให้ทำการ ป้องกันกำจัด

๒. เมื่อพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง - ไร ที่มีประสิทธิภาพ เช่น อะมิทราซ ๒๐% EC อัตรา ๔๐ - ๖๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ฟิโพรนิล ๕% SC อัตรา ๑๐ - ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไพริดาเบน ๒๐% WP อัตรา ๑๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ สไปโรเมซีเฟน ๒๔% SC อัตรา ๘ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต ๑.๙๒% EC อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ กำมะถัน ๘๐% WP อัตรา ๖๐ - ๘๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นซ้ำตามการระบาด

ที่มา : ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร