



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 (เวลา 15.00 น.)

1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน เวลา 12.00 น.


ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้

ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดออกจากฝั่ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563

อนึ่ง พายุระดับ 5 (ไต้ฝุ่น ฮากูบิต) บริเวณทางเหนือของเกาะไต้หวัน คาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ในวันนี้ (4 ส.ค.63) โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ในระยะต่อไป

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 3 ส.ค. 63 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 4 ส.ค. 63



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	ทต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด	เชียงราย	66.0	ฝนตกหนัก
2	อบต.แม่แตง อ.แม่แตง	เชียงใหม่	59.5	ฝนตกหนัก
3	ทต.หนองจ้อม อ.สันทราย	เชียงใหม่	47.5	ฝนตกหนัก
4	อบต.แม่नाเติง อ.ปาย	แม่ฮ่องสอน	45.5	ฝนตกหนัก
5	อบต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์	จันทบุรี	42.0	ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

(ข้อมูลจากสำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา)

2. สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก วาดภัย และดินโคลนถล่ม

จากอิทธิพลของพายุซินลากู ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 1-4 ส.ค.63 รวม 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน พิชญ์โลก แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ อุดรดิตถ์ กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู สุรินทร์ อุดรธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ขอนแก่น เลย นครพนม มหาสารคาม ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ระนอง และสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อุดรธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม หนองบัวลำภู พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อุดรดิตถ์ พิชญ์โลก และจังหวัดเลย

ผลกระทบด้านการเกษตร

ด้านพืช 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ อุดรดิตถ์ น่าน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน เลย ชุมพร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 6,366 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 38,233.50 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 18,904.50 ไร่ พืชไร่ 9,986 ไร่ พืชสวน 9,343 ไร่

ด้านประมง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา เลย นครพนม และจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรกร 1,396 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ บ่อปลา 1,137.25 ไร่

ด้านปศุสัตว์ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย น่าน ลำปาง เกษตรกร 480 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 6,801 ตัว ได้แก่ โค-กระบือ 230 ตัว สุกร 76 ตัว สัตว์ปีก 6,495 ตัว

การให้ความช่วยเหลือ

กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 29 เครื่อง ได้แก่ เชียงใหม่ (2) ขอนแก่น (20) กาฬสินธุ์ (2) ร้อยเอ็ด (5)

กรมปศุสัตว์ เตรียมเสบียงสัตว์แห่งสำรอง 5,612.60 ตัน เวชภัณฑ์ ยานพาหนะ ทีมสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์ โดยได้แจกจ่ายเสบียงสัตว์แล้ว 2,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ อ.เมืองเลย จ.เลย

3. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 63)

3.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 32,092 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 8,418 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (35,833 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47) น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 3,741 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 334.71 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 61.53 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 43,976 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 แห่ง) ปริมาณน้ำในอ่างฯ 30,420 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,120 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 15) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (34,028 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 3,608 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 280.34 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 49.88 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 40,507 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก (ล้าน ม. ³)
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่างฯ	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	7,717	31	972	5	75	1,001	304	30	210	20	83	25,825	8,021	31	1,182	6	17,804
ตอน.	12	8,368	2,538	30	1,130	17	218	1,998	613	31	471	25	230	10,367	3,151	30	1,601	19	7,216
กลาง	3	1,419	176	12	116	9	22	369	111	30	86	25	25	1,788	287	16	202	12	1,501
ตะวันตก	2	26,605	15,451	58	2,174	16	7	140	37	26	28	21	9	26,745	15,488	58	2,202	16	11,258
ตะวันออก	6	1,515	381	25	281	20	51	964	325	34	273	30	57	2,479	706	28	554	24	1,773
ใต้	4	8,194	4,157	51	2,446	38	39	668	282	42	229	37	43	8,863	4,439	50	2,676	38	4,424
รวม	35	70,926	30,420	43	7,120	15	412	5,140	1,672	33	1,298	27	447	76,067	32,092	42	8,418	16	43,976

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,535 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 839 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 5) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 120.45 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 5.76 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,336 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	3,937	29	137	1	8.05	9.14	4.00	4.00	9,525
สิริกิตี	3,381	36	531	8	110.35	66.83	0.03	8.93	6,129
ภูมิพล+สิริกิตี	7,319	32	669	4	118.40	75.97	4.03	12.93	15,653
แควน้อยฯ	129	14	86	10	2.05	0.60	1.30	2.59	810
ป่าสักชลสิทธิ์	87	9	84	9	0.00	0.15	0.43	0.43	873
รวมทั้งหมด	7,535	30	839	5	120.45	76.72	5.76	15.95	17,336

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จำนวน 30 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯภูมิพล (1%) อ่างฯสิริกิตี (8%) อ่างฯแม่จัดสมบูรณ์ชล (24%) อ่างฯแม่กวอดมธรรา (29%) อ่างฯก๊วคหมา (27%) อ่างฯแควน้อยบำรุงแดน (10%) อ่างฯแม่เม็ก (8%) อ่างฯห้วยหลวง (16%) อ่างฯน้ำพุง (15%) อ่างฯจุฬาภรณ์ (14%) อ่างฯอุบลรัตน์ (-13%) อ่างฯลำปาว (25%) อ่างฯลำตะคอง (25%) อ่างฯลำพระเพลิง (26%) อ่างฯมูลบน (13%) อ่างฯลำแชะ (12%) อ่างฯลำน้ำรอง (14%) อ่างฯสิรินธร (24%) อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ (9%) อ่างฯทับเสลา (10%) อ่างฯกระเสียว (7%) อ่างฯศรีนครินทร์ (21%) อ่างฯวชิราลงกรณ์ (10%) อ่างฯขุนด่านปราการชล (23%) อ่างฯคลองสิียด (5%) อ่างฯบางพระ (6%) อ่างฯประแสร์ (14%) อ่างฯนฤปดินทรจินดา (24%) อ่างฯแก่งกระจาน (20%) และอ่างฯปราณบุรี (25%)

3.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำยม แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 109 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 110 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +16.64 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 9.56 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +13.33 ม.รทก. (เมื่อวาน +13.35 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.38 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.38 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก รวม 18 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 19 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 17 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 1 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 5 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 5 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 14 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 15 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 5 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 5 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก รวม 31 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 31 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุโมง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุโมง) ปิด แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 15 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 15 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่นๆ 1 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 60 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60 ลบ.ม./วินาที)

3.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		29 ก.ค.	30 ก.ค.	31 ก.ค.	1 ส.ค.	2 ส.ค.	3 ส.ค.	4 ส.ค.		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.28	0.30	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานการผลิตน้ำประปา	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนายนนทบุรี จ.นนทบุรี	0.27	0.27	0.27	0.28	0.30	0.30	0.35	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนากมชลประทานสามเสน กทม.	0.28	0.28	0.28	0.29	0.31	0.31	0.47	ปกติ	

(ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

3.4 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 3 ส.ค. 63	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.78	-10.02
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	7.10	-8.90
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	3.44	-8.76
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	3.80	-8.20
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	3.52	-8.98
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	4.32	-10.18

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.dwr.go.th

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการจำนวน 20 หน่วย ครอบคลุมทั้งประเทศ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก แพร่ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี ขอนแก่น อุดรธานี บุรีรัมย์ อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ระยอง จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 1-3 สิงหาคม 2563)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	แพร่(1)
กลาง	กาญจนบุรี(2) นครสวรรค์(5) อุทัยธานี(1) อ่างทอง(2) ลพบุรี(1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม(1) หนองบัวลำภู(1) นครราชสีมา(1) บุรีรัมย์(1) สุรินทร์(1)
ตะวันออก	ไม่มีการขอฝนหลวง
ใต้	ไม่มีการขอฝนหลวง
รวม	รวม 11 จังหวัด (17 อำเภอ)

สรุปผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ที่ 3 สิงหาคม 2563

หน่วยปฏิบัติการฯ	จำนวนเที่ยวบิน	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากท้องฟ้าปิดกับมีฝนตกตลอดวัน ประกอบกับติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่
2. ตาก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากท้องฟ้าปิดกับมีฝนตกตลอดวัน ประกอบกับติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่
3. พิษณุโลก	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้าและมีฝนละอองเป็นระยะ ประกอบกับลมมีกำลังแรงตลอดทั้งวัน
4. ลพบุรี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสภาพอากาศปิดท้องฟ้ามีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า ประกอบกับลมที่ระดับผิวพื้นถึงระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง
5. กาญจนบุรี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้า ประกอบกับลมที่ระดับผิวพื้น-15,000 ฟุตมีกำลังแรง
6. ขอนแก่น	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่
7. อุตรธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเครื่องบิน(ทอ.)ตรวจซ่อมพิเศษประจำสัปดาห์
8. นครราชสีมา	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากท้องฟ้าปิดมีฝนละอองเป็นระยะ ประกอบกับลมระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง
9. สุรินทร์	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากท้องฟ้าปิดมีฝนละอองเป็นระยะ ประกอบกับลมระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง
10. ระยอง	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากสภาพอากาศปิดท้องฟ้ามีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเต็มท้องฟ้าประกอบกับลมที่ระดับผิวพื้นถึงระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง
11. สุราษฎร์ธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเมฆชั้นกลางเมฆชั้นสูงปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับลมที่ระดับปฏิบัติการมีกำลังแรง(43.3 น็อต) ส่งผลทำให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวช้าและสลายตัวเร็ว
รวม	0	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 3 สิงหาคม 2563)

มีการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 169 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 98.82 ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 4,405 เที่ยวบิน (6,591:14 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้สารฝนหลวง 3,925.575 ตัน พลุสารดูดความชื้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 109 นัด พลุสารดูดความชื้นแคลเซียมคลอไรด์จำนวน 114 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์สำหรับการกิจปฏิบัติการณ์ฝนหลวง จำนวน 2,419 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 67 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก พะเยา แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ น่าน แม่ฮ่องสอน เลย เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร พิษณุโลก มุกดาหาร หนองบัวลำภู นครพนม กาฬสินธุ์ บึงกาฬ อุตรธานี หนองคาย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี ลพบุรี พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี อำนาจเจริญ อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรด ปราจีนบุรี สระแก้ว กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง ระนอง ชุมพร นราธิวาส และจังหวัดสตูล

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูฝน ปี 2562 จำนวน 2,138 เครื่อง สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง พืชไร่ อุปโภคบริโภค และสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 602 เครื่อง แบ่งเป็น

- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 84 เครื่อง ในพื้นที่ 15 จังหวัด
- ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 67 เครื่อง ในพื้นที่ 10 จังหวัด
- ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 422 เครื่อง ในพื้นที่ 34 จังหวัด
- ช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 29 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด

6. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 63)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. โรคไหม้ข้าว 2. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 3. หนอนห่อใบข้าว 4. เพลี้ยไฟ 5. หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (พะเยา ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บึงกาฬ จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 34,421 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 11,451 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (หนองบัวลำภู อุบลราชธานี จันทบุรี ราชบุรี และนครปฐม) จำนวน 405 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 41 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ศรีสะเกษ นราธิวาส และนครศรีธรรมราช) จำนวน 92 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (อุดรดิตถ์ หนองบัวลำภู มุกดาหาร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 1,491 ไร่ การระบาดคงที่ ไม่มีพื้นที่ระบาดในสัปดาห์นี้ การระบาดลดลง 2,983 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดของศัตรูข้าว - ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย รมรวงค้ำให้นำไปใช้ควบคุมศัตรูข้าวในทุกพื้นที่ และส่งเสริมให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ - ประกาศเตือนการระบาดและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสำรวจติดตามสถานการณ์การเกิดโรคไหม้คอรวง และคำแนะนำวิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่ที่พบการระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง - แนะนำให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ และเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุ 6-7 วัน ให้นำน้ำเข้าแปลงจนระดับน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน แต่หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารกำจัดแมลง เช่น มาลาไอออน เซฟวิน เป็นต้น - แนะนำให้เกษตรกรรดหว่านปุ๋ยในอัตราที่มากเกินไป และให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรคไหม้ข้าว
ปาล์มน้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. โรคลำต้นเน่า	พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ระยอง สตูล ชุมพร พังงา สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,215 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี สตูล ตรัง และกระบี่) จำนวน 231 ไร่ การระบาดคงที่	- รมรวงค้ำให้เกษตรกรดูแลสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาด กำจัดวัชพืชบริเวณสวนปาล์มน้ำมัน เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลาย และแนะนำให้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - ใช้ก้านฟิโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย มาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาโรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้และตัวหนอน - สำหรับต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรด ทำลายระยะรุนแรง ให้ใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี)
ยางพารา	1. โรคกลากขาว 2. โรคใบร่วง	พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ภูเก็ต กระบี่ นราธิวาส นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 522 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ยะลา ตรัง และนราธิวาส) จำนวน 24,891 ไร่ การระบาดลดลง 921 ไร่	- ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดของโรคกลากขาว โรคใบร่วง ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา - ให้เกษตรกรชุดคลุมบริเวณต้นที่เป็นโรคกว้าง 30 ซม ลึก 60 ซม. ไปทากาวและทาสีแฉกเดียวกันข้างละ 2 ด้าน และกิ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรคกลากขาว และโรคใบร่วง
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. แมลงดำหนาม	พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรวาด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต นราธิวาส และปัตตานี) จำนวน 8,347 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 41 ไร่ พื้นที่ระบาด 22 จังหวัด (มุกดาหาร นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรวาด	- ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อช่องทางต่างๆ และถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำเรื่องการป้องกัน กำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งการดูแลสวนมะพร้าวให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ ทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และเก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ - ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	3. ดั้วแรด	ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และภูเก็ต) จำนวน 24,659 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 322 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร อ่างทอง นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ปัตตานี พัทลุง และกระบี่) จำนวน 7,301 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่</u>	- ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hispinarum</i>) เพื่อควบคุมการระบาดของแมลงตำหนามในพื้นที่ - ใช้กาดักไฟโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงแรด
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู 3.แมลงนูนหลวง 4. ไรแดงมันสำปะหลัง 5. เพลี้ยหอย 6. โรคใบด่างมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ลำปาง หนองบัวลำภู นครราชสีมา มุกดาหาร มหาสารคาม บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) จำนวน 2,569 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 19 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ราชบุรี สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี และสระแก้ว) จำนวน 1,413 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ราชบุรี) จำนวน 26 ไร่ <u>การระบาดลดลง 7 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (ขอนแก่น เลย มุกดาหาร นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ลพบุรี ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี) จำนวน 3,794 ไร่ <u>การระบาดลดลง 6 ไร่</u> พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา มุกดาหาร และบุรีรัมย์) จำนวน 980 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (อุทัยธานี มุกดาหาร บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท ระยอง ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี และสระแก้ว) จำนวน 240,900 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 780 ไร่</u>	- รมณรงค์ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง - ผลิตขยายแตนเบียน <i>Anagrus lopezi</i> แมลงช้างปีกใส และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง - ให้เกษตรกรไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายตัวหนอน และดักด้แมลงนูนหลวง รวมทั้งใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม - สร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเกี่ยวกับที่มา ความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางเฝ้าระวัง และการป้องกันกำจัด
อ้อย	1. หนอนกออ้อย 2. ด้วงหนวดยาว 3. หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (มุกดาหาร นครราชสีมา นครสวรรค์ ชลบุรี และสระแก้ว) จำนวน 2,748 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา กาญจนบุรี และชลบุรี) จำนวน 90 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 10 ไร่</u> ไม่มีพื้นที่ระบาดในสัปดาห์นี้ <u>การระบาดลดลง 50 ไร่</u>	- รมณรงค์ควบคุมศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ - ให้เกษตรกรทำการไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และใช้เชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมควบคุม โดยใส่พร้อมท่อนพันธุ์ขณะปลูกหรือคลุกลงในพื้นดิน- ให้เกษตรกรปลูกอ้อยพันธุ์ต้านทานในฤดูปลูกต่อไป และให้เกษตรกรไถดินชุดต่อทิ้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวอ่อนหนอนกออ้อยต่อไป
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 36 จังหวัด (ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา เชียงราย สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก อุตรดิตถ์ ขอนแก่น หนองบัวลำภู มุกดาหาร นครราชสีมา ชัยภูมิ	- จัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาด - ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
		อุบลราชธานี บึงกาฬ นครปฐม ลพบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี กระบี่ ปัตตานี ตรัง ภูเก็ต และนราธิวาส) จำนวน 69,178 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 36,087 ไร่	- ประชาสัมพันธ์แจ้งจังหวัดผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และแจ้งเตือนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ fall armyworm
ทุเรียน	1. หนอนเจาะผล 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไฟ 4. โรครากเน่าโคนเน่า	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ และชุมพร) จำนวน 295 ไร่ การระบาดลดลง 64 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ตราด สงขลา กระบี่ ชุมพร และระนอง) จำนวน 211 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 758 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ระยอง ปราจีนบุรี ตราด จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ นครศรีธรรมราช และชุมพร) จำนวน 4,565 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่	- หนอนเจาะผล สํารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบรอยทำลายให้เขี่ยตัวหนอนออก ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงจากการเกิดโรคควรเก็บมาเผาไฟหรือฝัง ตัดแต่งผลทุเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าทำลาย หลบอาศัย และแนะนำให้ใช้แลมบ์ดา-ไฮยาโลทริน 2.5% อีซี - เพลี้ยแป้ง ตัดส่วนที่พบเพลี้ยแป้งไปทำลาย หากพบการระบาดบริเวณผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
มังคุด	1. เพลี้ยแป้ง 2. เพลี้ยไฟ 3. โรคใบจุด	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และชุมพร) จำนวน 233 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี สงขลา ระนอง นครศรีธรรมราช และชุมพร) จำนวน 3,365 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และยะลา) จำนวน 157 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่	- หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของศัตรูพืช และดูแลสวนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ - หากพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - หากพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ตัดแต่งกิ่งหรือใบที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกแปลง หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช

7. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

7.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 63)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กรกฎาคม 2563 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 35 จังหวัด 160 จุด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 13 จุด ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ สระแก้ว ชลบุรี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรคได้ รวมทั้งเร่งรัดควบคุมจำนวนประชากรสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญ (สุนัขและแมว) ทำให้มีจำนวนคงที่หรือลดลงเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค โดยการผ่าตัดทำหมัน

7.2 โรคปากและเท้าเปื่อย ประจำวันที่ 29 ก.ค. 63

วันนี้ ไม่มีรายงานพบสัตว์ป่วยด้วยอาการโรคปากและเท้าเปื่อย

ที่	วันที่เริ่มป่วย	ชนิดสัตว์ *กกร1	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ประวัติวัคซีน	ป่วย	ตาย	เสี่ยง	ผลตรวจ
ไม่มีรายงาน											

ตารางแสดงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสะสมปี 2563 การกระจายและการเปรียบเทียบ

จังหวัดที่สถานะโรคยังไม่สงบ (จำนวนสถานะควบคุมโรค/เฝ้าระวังโรค)	นครศรีธรรมราช(4/4) นครราชสีมา(3/3) สระบุรี(2/0) สงขลา(2/0) นครปฐม(2/0) สุโขทัย(1/0) สตูล(1/0) นครสวรรค์(1/0) ขอนแก่น(0/1) ประจวบคีรีขันธ์(0/1) กาฬสินธุ์(0/1)
---	--

ช่วงเวลา	พบโรค (ครั้ง)	สัตว์ป่วย (ตัว)	ตาย (ตัว)	จังหวัด (จังหวัด)	สูงสุด 10 จังหวัดแรก (จำนวนครั้ง รายงานการพบโรค/จำนวนสัตว์ป่วยสะสม)
30 วันย้อนหลัง	18	281	13	8	นครศรีธรรมราช(6/94) นครราชสีมา (4/15) นครปฐม(2/62) สงขลา(2/30) กาฬสินธุ์(1/33)) สุโขทัย (1/29) ประจวบคีรีขันธ์(1/17) ขอนแก่น(1/1)
ปี 2563	70	2,952	46	22	สงขลา(15/662) นครศรีธรรมราช(10/301) นครราชสีมา(10/83) พัทลุง(4/610) กระบี่(3/459) นครปฐม(3/108) มหาสารคาม(3/93) เชียงราย(3/89) สุโขทัย(3/35) ลำพูน(2/30)
ปี 2562	194	16,081	989	40	นครศรีธรรมราช(24/2563) สงขลา(24/1871) นครราชสีมา(13/97) ปัตตานี(12/270) พัทลุง(11/4568) ประจวบคีรีขันธ์(10/1116) ร้อยเอ็ด(8/70) ขอนแก่น(8/32) กระบี่(7/1574) สุราษฎร์ธานี(7/980)

รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ครั้ง) ชนิดสัตว์ที่พบรายงานโรคตาม *กกร 1	Type A(0) Type O(32) Type O และ A(0) ไม่เก็บตัวอย่างรอยโรค (0) ไม่ทราบ Type(12) และรอผล Lab(26) โคเนื้อ(42/2,405) โคนม(14/256) กระบือ(5/120) แพะนม(1/2) สุกร(0/0) ไม่ทราบ(8/169)
---	---

หมายเหตุ : *กกร1 คือ รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น

7.3 ไม่มีรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในสัปดาห์นี้

7.4 โรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ (ช่วงวันที่ 27 มิ.ย.-3 ก.ค. 63) พบการระบาด 23 ครั้ง ดังนี้

- โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 19 ครั้ง แบ่งเป็น
 - ในหมู่ปา 12 ครั้ง ที่ประเทศโปรแลนด์ ฮังการี และเกาหลีใต้
 - ในสุกร,หมู่ปา 5 ครั้ง ที่ประเทศโรมาเนีย
 - ในสุกร 2 ครั้ง ที่ประเทศเกาหลีเหนือ
- โรคปากและเท้าเปื่อยในโค 1 ครั้ง ที่ประเทศวันดา
- โรค Newcastle disease ในนก 1 ครั้ง ที่ประเทศรัสเซีย
- โรค Contagious equine metritis ในแกะ 1 ครั้ง ที่ประเทศอิสราเอล
- โรค Sheep pox and goat pox ในม้า 1 ครั้ง ที่ประเทศเดนมาร์ก