



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com

แจ้งเตือนพืชที่เกิดผลกระทบ ช่วงวันที่ ๒๐ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วง เวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
มีฝนตก และฝน ตกหนัก บางพื้นที่	อะโวคาโด	ทุกระยะ การ เจริญเติบโต	โรคจุดดำ หรือ โรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)	อาการที่ใบ พบจุดแผลสี น้ำตาลเข้มหากอาการ รุนแรงแผลจะขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว ใบจะ แห้ง และร่วงอาการที่ ก้านใบ กิ่ง และก้านขอ ดอกพบแผลจุดหรือขีดสี ม่วง ถ้าอาการรุนแรง แผลจะขยายลุกลาม ทำ ให้ก้านใบและกิ่งแห้ง หากเกิดที่ก้านขอดอกจะ ทำให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง หลุดร่วงก่อนติดผล อาการที่ผล ผลอ่อนพบ จุดแผลสีน้ำตาลถึงดำ หากอาการรุนแรงผลจะ หลุดร่วงก่อนกำหนด อาการบนผลแก่ มักพบ ในระยะใกล้เก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว พบ แผลจุดสีน้ำตาลถึงดำ รูปร่างกลม ต่อมาแผล ขยายลุกลามเป็นแผล ยุบตัวในเนื้อผล ทำให้ผล เน่า บางครั้งพบเมือกสี ส้มซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ ของเชื้อราสาเหตุโรคที่ บริเวณแผล	1. กำจัดวัชพืชรอบโคนต้น เพื่อลดความชื้นสะสม 2. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่าง สม่ำเสมอ เมื่อพบอาการ ของ โรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่ เป็นโรค นำไปทำลายนอก แปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อ สาเหตุโรค 3. หากพบเริ่มมีการระบาดของ ของโรค พ่นด้วยสาร ป้องกัน กำจัดโรคพืช เช่น อะซอกซีส โตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรคโล ราซ 45% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น ทุก 7-10 วัน 4. หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้ง และข้อผลที่ติดอยู่บนต้น นำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อ สาเหตุโรค

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วง เวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
	ทุเรียน	เตรียมต้น (ระยะการ เจริญทาง ใบ)	โรครากเน่า โคน เน่า (เชื้อรา Phytophthora palmivora)	<u>อาการที่ราก</u> เริ่มแรกจะเห็นใบที่ปลาย กิ่งมีสีซีด ไม่เป็นมันเงา เหี่ยวลู่ลง เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นใบจะเหลืองและหลุดร่วง หากขุดดูรากจะพบรากฝอย มีลักษณะเปลือกอ่อน และเปื่อยยุ่ย เป็นสีน้ำตาล เมื่อโรครุนแรงอาการเน่าจะลามไปยังรากแขนงและโคนต้น ทำให้ต้นทุเรียนโทรมและยืนต้นตาย <u>อาการที่กิ่งและที่ลำต้นหรือโคนต้น</u> ระยะแรกจะเห็นทุเรียนแสดงอาการ ใบเหลืองเป็นบางกิ่ง สังเกตเห็นคล้ายคราบน้ำบนผิวเปลือกของกิ่ง หรือต้น ในช่วงเช้าที่มีอากาศชื้นอาจเห็นเป็นหยด ของเหลวสีน้ำตาลแดงออกมาจากบริเวณแผล และจะค่อยๆ แห้งไป ในช่วงที่มีแดดจัด ทำให้เห็นเป็นคราบ เมื่อใช้มีดถากบริเวณคราบนั้น จะพบเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม้เป็นแผลสีน้ำตาลถ้าแผลขยายใหญ่ลุกลามจนรอบ โคนต้น จะทำให้ทุเรียนใบร่วงจนหมด ต้นและยืนต้นแห้งตาย <u>อาการที่ใบ</u>	1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำดี ไม่มีน้ำท่วมขัง และ เมื่อมีน้ำท่วมขังควรระบายออก 2. ปรับปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปรับสภาพ ดินให้มีความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 6.5 กรณีดินที่เป็นกรดจัด ให้ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ อัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ 3. หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้รากหรือลำต้นเกิด แผล ซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อราสาเหตุโรคเข้าทำลาย พืชได้ง่ายขึ้น 4. ต้นทุเรียนที่เป็นโรครุนแรงมาก หรือยืนต้นแห้งตาย ควรขุดออกนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วราดดินใน หลุมและบริเวณโดยรอบ ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ฟอสฟิไทล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทั้งไว้ระยะหนึ่ง จึงปลูกทดแทน 5. ตรวจสอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบส่วนของกิ่ง ใบ ดอก และผลที่เป็นโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค รวมทั้ง เก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก แล้ว พ่นด้วยสาร เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสฟิไทล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วง เวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
				ใบอ่อนแสดงอาการเหี่ยว เหลืองบริเวณแผลมี ลักษณะฉ่ำน้ำ สีน้ำตาล อ่อน และเปลี่ยนเป็นสี ดำ ตายนึ่งคล้ายน้ำร้อน ลวก เส้นใบมีสีน้ำตาล ดำ เกิดอาการไหม้แห้ง คาตัน อย่างรวดเร็วแล้ว ค่อย ๆ ร่วงไป พบ มาก ช่วงฝนตกหนักต่อเนื่อง หลายวัน	30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 1-2 ครั้ง ทุก 7-10 วัน และควรหยุดพ่น สารก่อนเก็บเกี่ยวผล อย่าง น้อย 15 วัน 6. ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้ กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับ ต้นปกติ และควรทำความ สะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ ใหม่ทุกครั้ง 7. เมื่อพบต้นที่ใบเริ่มมีสีซีด ไม่เป็นมันเงาหรือ ใบเหลือง หลุดร่วง ใช้สาร ฟอสโฟนิค แอซิด 40% SL ผสมน้ำสะอาด อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยาฉีด เข้าลำ ต้น อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อต้น และ/หรือราดดินด้วย สารฟอสฟอริล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30- 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 8. เมื่อพบอาการโรคบนกิ่งหรือ ที่โคนต้น ถากหรือขุดผิว เปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก แล้วทาแผลด้วยสาร ฟอส อีทิล -อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 70 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG อัตรา 90 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 40-60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟิ นาเลท 60% + 6% WG อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์ +

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วง เวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
					เมทาแลกซิล 10% + 15% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทุก 7 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง หรือ ใช้ฟอสโฟนิก แอซิด 40% SL ผสมน้ำสะอาด อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยา ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น ฉีดเข้าลำต้น หรือกิ่งในบริเวณตรงข้าม อาการโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณที่เป็นโรค 9. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งเป็นโรค กิ่ง แห้ง และตัดข้อผลที่ค้างอยู่ นำไปเผาทำลายนอกแปลง ปลุก เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
	พริก	ทุกระยะการเจริญเติบโต	โรครากเน่า และโคนเน่า (เชื้อรา Sclerotium rolfsii)	พริกแสดงอาการเหี่ยวอย่างรวดเร็ว บางครั้งพบใบที่อยู่ด้านล่างเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หากอาการรุนแรงพริก จะยืนต้นตายบริเวณโคนต้นพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรค มีลักษณะ หยาบสีขาว ต่อมาเส้นใยของเชื้อจะรวมตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาว แล้ว เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำคล้ายเมล็ดผักกาด จึงมักเรียกว่า ราเม็ดผักกาด โรคนี้พบได้ทุกระยะ การเจริญเติบโตของพริก	1. ควรไถพลิกดินตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในดินเนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคสามารถมีชีวิตรอดอยู่ในดินได้นาน 2. ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ก่อนปลูกเพื่อปรับสภาพดิน 3. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี 4. ควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม และทำค้างหรือชิงเชือกช่วยเมื่อต้นพริกล้มหรือเลื้อยปรกดิน เพื่อให้โคนต้นโปร่ง แสงแดดส่องถึง ไม่มีความชื้นสูง เป็นการลด การระบาดของโรค 5. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นเป็น โรคให้ถอนต้นและขุดดินบริเวณที่พบ นำไปทำลายนอก แปลงปลูก แล้วรดดินในหลุมและ

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วง เวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
					บริเวณใกล้เคียง ด้วย สาร ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คาร์ บอกซิน 75% WP อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โทล โคลฟอส-เมทิล 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีไตรไดอะโซล 24% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออีไตรไดอะโซล + ควินโตซีน 6% + 24% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยรดสารทุก 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อป้องกัน เชื้อสาเหตุโรคแพร่ไปยัง ต้น ข้างเคียง 6. หลังจากเก็บเกี่ยวพริกแต่ ละรุ่น ควรกำจัดเศษซาก พืช และวัชพืชในแปลงให้หมด เพื่อป้องกันการสะสม ของเชื้อ โรค 7. ควรทำความสะอาด เครื่องมือ และอุปกรณ์ ทางการ เกษตร เช่น จอบ เสียม ทุกครั้งหลังใช้กับต้นที่ เป็นโรค
	หอมแดง, หอม หัวใหญ่	เจริญเติบโต ทางลำต้น	โรคหัวและรากเน่า (เชื้อรา Sclerotium rolfsii)	ต้นหอมแสดงอาการ ใบเหลือง เหี่ยว ชะงัก การเจริญเติบโต ต่อมา ใบแห้ง จากปลายใบ แล้วลามแห้งหมดทั้ง ต้น กาบใบและรากเน่า เมื่อ ถอนต้น จะหลุดจากดิน ได้ง่าย บริเวณโคนต้น พบเส้นใยหยาบสีขาว ของเชื้อรา สาเหตุโรค และเมล็ดสีขาวหรือสี	- หลีกเลี่ยงการปลูกพืช ในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของ โรคนี้ - แปลงปลูกควรมีการระบาย น้ำที่ดี - ก่อนปลูกควรไถตากดิน 2- 3 แดด ใส่ปูนขาว และปุ๋ย คอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับ สภาพดิน - ใช้หัวหรือเมล็ดพันธุ์จาก แหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของ

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วง เวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
				น้ำตาลเข้มข้นจนเกือบดำ คล้ายเมล็ด ผักกาดปน อยู่กับเส้นใย จึงมัก เรียกว่า ราเม็ดผักกาด **** ในระหว่างรอการ ขนส่ง หรืออยู่ในโรงเก็บ ถ้าหัวหอมมีเชื้อราสาเหตุ โรค ติดมาจากแปลง ปลูกจะทำให้หัวเน่าและ ลูกกลามไปยังหัวที่อยู่ ใกล้เคียง	ของโรคนี้และไม่มีร่องรอยการ ติดเชื้อ 5.หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่าง สม่ำเสมอ หากพบต้นเป็น โรค ให้ถอนต้นและขุดดินบริเวณที่ พบ นำไปทำลายนอก แปลง ปลูก แล้วรดดินในหลุมและ บริเวณใกล้เคียง ด้วย สาร ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คาร์ บอกซิน 75% WP อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โทล โคลฟอส-เมทิล 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีไทร ไดอะโซล 24% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร หรืออีไทรไดอะโซล + ควินโตซีน 6% + 24% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน 50% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยรดสารทุก 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อป้องกัน เชื้อสาเหตุโรคแพร่ไปยัง ต้น ข้างเคียง 6. ควรทำความสะอาด เครื่องมือ และอุปกรณ์ ทางการ เกษตร เช่น จอบ เสียม ทุกครั้งหลังใช้กับต้นที่ เป็นโรค
	ถั่วเขียว	ระยะออก ดอก	1. หนอนกระทู้ผัก	หนอนที่ฟักออกมาจากไข่ ใหม่ๆ จะ อยู่รวมกันเป็น กลุ่ม แทะผิวใบ ด้านล่าง ทำให้เหลือแต่ผิวใบ ด้านบน มองเห็นใบ โปร่งใสคล้ายร่างแห เมื่อ หนอนโตขึ้นจะแยกกลุ่ม	พ่นเชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ ผัก อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อ น้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง เมื่อพบการระบาด หรือ พ่น สารฆ่าแมลง แลมป์ดา-ไซฮา โลทริน 2.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วง เวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
				ออกไปกัด กินใบทั่วทั้ง แปลง โดยหนอนจะกัด กินจากขอบใบเข้าไป	ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟลู อีซี 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อใบถูก ทำลาย 30 เปอร์เซ็นต์
			2. หนอนม้วนใบ	หนอนที่ฟักออกจากไข่ ใหม่ๆ จะอยู่ รวมกันเป็น กลุ่ม ชักใบบาง ๆ คลุม ตัวไว้ แล้วกัดกินผิวใบ เมื่อหนอนโต ขึ้นจึง กระจ่ายกันออกไปเพื่อหา ใบ หรือชักใยดึงเอาใบ หลาย ๆ ใบมาห่อ รวมกัน แล้วอาศัยกัดกินอยู่ในใบที่ ม้วนนั้นจนหมดแล้ว เคลื่อนย้ายไป ทำลายใบ ต่อไป	พ่นสารฆ่าแมลง อินดอกซา คาร์บ 15% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทอกซีฟิโนไซด์ 24% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ลูเฟนนู รอน 5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรหรือ แลมป์ดา-ไซฮา โลทริน 2.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือ ไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อใบถูกทำลาย 30 เปอร์เซ็นต์
			3. เพลี้ยไฟ	ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูด น้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน ตาดอก หรือฝักอ่อน ส่วน ต่าง ๆ ของถั่วเขียวที่ถูก ทำลายจะ เกิดรอยต่าง หึงงอ บิดเบี้ยวคล้าย ใบ หด เส้นกลางใบมีสีน้ำตาล เข้ม ใบ แห้งกรอบ และ หลุดร่วง ถ้าทำลาย ส่วน ของฝัก จะทำให้ฝักบิด เบี้ยว ไม่ ติดเมล็ด	พ่นสารฆ่าแมลง ไตรอะโซ ฟอส 40% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรไทโอฟอส 50% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทีโอคาร์บ 50% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
			4. เพลี้ยอ่อน	ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูด น้ำเลี้ยงจาก ยอด ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ของ ถั่วเขียว ทำให้ต้นแคระ แกร็น ยอดย่น หึงงอ	พ่นสารฆ่าแมลง ไตรอะโซ ฟอส 40% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมป์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วง เวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
				ดอกร่วง ฝักอ่อนบิด เบี้ยว และเมล็ดลีบ ผลผลิต เสียหาย และลดลง มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์	20 ลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยอ่อน ระบาด พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์