



ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร การระบาดของศัตรูพืชและสัตว์ในจังหวัดพัทลุง

โรคสแคปในมะม่วง (Mango scab)

โรคสแคปในมะม่วง Mango scab เป็นโรคที่มีความสำคัญอีกชนิดหนึ่งในมะม่วงระยะหลายปีมานี้ ลักษณะอาการ - แผลจะเริ่มจากเป็นจุดเล็กๆ นูนแข็ง มีสีเหลืองอ่อนหรือน้ำตาลอ่อน - ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ขึ้น ตกสะเก็ดคล้ายแผลหูด ขรุขระ มีสีน้ำตาลหรือดำ แผลอาจเกิดกระจัดกระจายหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

สาเหตุเกิดจากเชื้อรา *Elsinoë mangiferae* Bitanc. & Jenkins



เชื้อสาเหตุโรคสแคป

- สามารถเข้าทำลายผลมะม่วงตั้งแต่ระยะช่อดอกจนถึงระยะผลแก่
- หากมะม่วงเป็นโรคในระยะติดผลจะส่งผลกระทบต่อทำให้ผลผลิต เพราะเชื้อสาเหตุของโรคจะเจริญและแฝงตัวอยู่ในผล
- บางชนิดออกอาการให้เห็นช่วงติดผลไปจนกระทั่งผลสุกแก่ แต่บางชนิดจะออกอาการให้เห็นหลังการเก็บเกี่ยว
- เป็นโรคที่มีความสำคัญอีกชนิดหนึ่งในมะม่วงระยะหลายปีมานี้

ลักษณะอาการ

- แผลจะเริ่มจากเป็นจุดเล็กๆ นูนแข็ง มีสีเหลืองอ่อนหรือน้ำตาลอ่อน
- ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ขึ้น ตกสะเก็ดคล้ายแผลหูด ขรุขระ มีสีน้ำตาลหรือดำ แผลอาจเกิดกระจัดกระจายหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
- หากติดเชื้อโรคตั้งแต่ระยะช่อดอกจะทำให้ก้านผลเป็นแผลสะเก็ด ผลแคะแกร็นและบิดเบี้ยว

การป้องกันกำจัด

- ฉีดพ่นด้วย แบคซิน (azoxystrobin ๒๕% SC | สารกำจัดโรคพืช กลุ่ม ๑๑)
- พ่นป้องกัน อัตรา ๕ มล. ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ทุก ๗-๑๔ วัน
- หากพบการเข้าทำลายของโรค พ่นอัตรา ๑๐ มล.ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ๒ ครั้ง หากกัน ๗-๑๐ วัน

แหล่งข่าว : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์