



# ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ ๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ข่าวแจ้งเตือนภัยการเกษตร การระบาดของศัตรูพืชและสัตว์ในจังหวัดพัทลุง

## ด้วงกุหลาบกินใบปาล์ม (Rose beetle eats palm leaves)

### ชนิดของด้วงกุหลาบ

ด้วงกุหลาบมีทั้งหมด ๒ ชนิด คือ ชนิดสีน้ำตาล (Garden Beetle) และชนิดสีดำ (Blister Beetle) แต่ส่วนใหญ่จะพบเป็นชนิดสีน้ำตาล โดยทั่วไปมีขนาดลำตัวประมาณ ๐.๕-๑ เซนติเมตร ขยายพันธุ์โดยการวางไข่ตามสนามหญ้า ตัวอ่อนจะกินรากหญ้าเป็นอาหาร จนกระทั่งตัวโตเต็มวัย จึงจะออกมากัดกินใบกุหลาบ และพืชอื่นๆ อย่างใบปาล์มน้ำมันอ่อน เป็นอาหารในเวลากลางวัน โดยจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนที่ตาของแมลงชนิดนี้ว่า จะมีสีแดงเข้ม

### วิธีการกำจัดด้วงกุหลาบ

หากเป็นพื้นที่บุกเบิกและปลูกใหม่ โดยที่รากของต้นปาล์มน้ำมันยังไม่สามารถดูดซึมน้ำอาหารทางรากได้ เกษตรกรจะต้องใช้วิธีฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทุกๆ ๔-๗ วัน และต้องหมั่นเดินตรวจสอบทุกวัน แต่หากเป็นรากของต้นปาล์มน้ำมันที่สามารถดูดซึมน้ำอาหารทางรากได้แล้ว ให้ใช้ยาฆ่าแมลงชนิดฟูราดาน ๓% หรือ ๕% โรยรอบโคนประมาณต้นละ ๑ ซ้อนแกง ซึ่งรากปาล์มน้ำมันจะใช้เวลาในการดูดซึมอยู่ได้นานประมาณ ๓๐ วัน และการโรยด้วยยา ฆ่าแมลงชนิดฟูราดาน ถือเป็นวิธีการกำจัดด้วงกุหลาบที่ได้ผลดีที่สุด

ด้านเกษตรกรก็ต้องหมั่นตรวจสอบทุกวันเช่นกัน เพราะโดยนิสัยของด้วงกุหลาบหากลงกัดกินใบปาล์ม น้ำมันอ่อนในแปลงใดแล้ว มันจะชักชวนกันมาเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และหากไม่รีบดำเนินการกำจัด ต้นปาล์ม น้ำมันก็จะโทรมและตายหมดทั้งแปลง อย่างไรก็ตาม หากปาล์มน้ำมันอายุเกิน ๒ ปี ไปแล้วด้วงกุหลาบก็จะไม่บุกไปกัดกินต้นปาล์มน้ำมันดังกล่าวอีก เพราะมันจะไม่ชอบใบที่แก่แล้ว

