



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (เวลา 15.00 น.)


1. สภาพอากาศ

1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนมากบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 21 พ.ค. 66 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 22 พ.ค. 66



ที่	อำเภอ	จังหวัด	ปริมาณฝน (มม.)	ความรุนแรง
1	อ.เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	54.8	ฝนตกหนัก
2	อ.ตะกั่วป่า	พังงา	37.6	ฝนตกหนัก
3	อ.เมือง	พัทลุง	19.9	ฝนตกปานกลาง
4	อ.เมือง	ตรัง	19.0	ฝนตกปานกลาง
5	อ.ฉวาง	ภูเก็ต	16.8	ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)
ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 66)

2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 41,774 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 17,835 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34 ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (42,863 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 56) น้อยกว่าปี 2565 จำนวน 1,089 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 21.52 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 114.04 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 34,563 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 39,261 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 15,724 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2565 (39,514 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 56) มากกว่าปี 2565 จำนวน 253 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 16.72 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 103.95 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 31,665 ล้าน ลบ.ม.

ภาค	ขนาดใหญ่						ขนาดกลาง						รวม						รับได้อีก
	จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				จำนวน (แห่ง)	ความจุ ที่ รณก.	ปริมาณน้ำ				
			ในอ่าง	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่าง	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ			ในอ่าง	% รณก.	ใช้การ	% ใช้การ	
เหนือ	8	24,825	12,668	51	5,923	33	80	1,083	538	50	448	45	88	25,908	13,206	51	6,370	33	12,702
ตอน.	12	8,368	3,598	43	1,947	29	226	2,061	971	47	805	43	238	10,429	4,569	44	2,752	32	5,860
กลาง	3	1,419	398	28	338	25	27	419	147	35	122	31	30	1,838	545	30	461	26	1,292
ตะวันตก	2	26,605	17,396	65	4,119	31	8	164	89	54	78	51	10	26,769	17,485	65	4,196	31	9,284
ตะวันออก	6	1,515	559	37	464	33	52	1,006	413	41	356	38	58	2,520	972	39	821	35	1,549
ใต้	4	8,194	4,644	57	2,933	45	42	679	355	52	302	48	46	8,874	4,999	56	3,235	46	3,875
รวม	35	70,926	39,261	55	15,724	33	435	5,411	2,513	46	2,111	42	470	76,337	41,774	55	17,835	34	34,563

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 12,328 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 5,632 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 31) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 5.32 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 46.83 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 12,543 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำรับได้อีก
	ปริมาตรน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาตรน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	7,730	57	3,930	41	1.96	2.71	28.00	25.00	5,732
สิริกิตี	4,196	44	1,346	20	2.44	4.13	14.94	14.98	5,314
ภูมิพล+สิริกิตี	11,926	52	5,276	32	4.40	6.84	42.94	39.98	11,046
แควน้อยฯ	232	25	189	21	0.92	0.18	2.16	2.16	707
ป่าสักชลสิทธิ์	171	18	168	18	0.00	0.00	1.73	2.16	789
รวมทั้งหมด	12,328	50	5,632	31	5.32	7.02	46.83	44.30	12,543

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำใช้การอยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาตรน้ำใช้การ จำนวน 12 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ สิริกิตี (20%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (21%) อ่างฯ แม่มอก (21%) อ่างฯ จุฬารัตน์ (17%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (12%) อ่างฯ สิรินคร (22%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (18%) อ่างฯ วิชาลงกรณ์ (19%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (18%) อ่างฯ คลองสิียด (18%) อ่างฯ นฤปดินทรจินดา (20%) และ อ่างฯ ปรามบุรี (17%)

2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก
ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 298 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 340 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +17.54 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.16 ม.)

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 70 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 70 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +14.98 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.16 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +5.41 ม.รทก. (เมื่อวาน +5.41 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันออก รวม 135 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 140 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 110 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 20 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 5 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 10 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 10 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 56 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 63 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) 15 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 30 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 142 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 152 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 10 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว 3 ลบ.ม./วินาที) แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 55 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 60 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 14 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 104 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 101 ลบ.ม./วินาที)

2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)							เกณฑ์	หมายเหตุ
		16 พ.ค. 66	17 พ.ค. 66	18 พ.ค. 66	19 พ.ค. 66	20 พ.ค. 66	21 พ.ค. 66	22 พ.ค. 66		
เจ้าพระยา	ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี	0.16	0.16	0.16	0.19	0.17	0.17	0.17	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาเกณฑ์มาตรฐาน 0.50 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุนทุรี จ.นนทบุรี	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.21	0.22	ปกติ	- ค่าความเค็มของน้ำสำหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร
เจ้าพระยา	ทำนบกุนทุรีสามแสน กทม.	0.27	0.26	0.25	0.22	0.21	0.25	0.27	ปกติ	

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2.4 สถานการณ์น้ำโขง

สถานี	ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ 22 พ.ค. 66	+ สูงกว่าตลิ่ง - ต่ำกว่าตลิ่ง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	12.80	2.26	-10.54
อ.เชียงคาน จ.เลย	16.00	4.20	-11.80
อ.เมือง จ.หนองคาย	12.20	1.88	-10.32
อ.เมือง จ.นครพนม	12.00	1.61	-10.39
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	12.50	1.88	-10.62
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	14.50	2.20	-12.30

หมายเหตุ ข้อมูลจาก www.drw.go.th

3. การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66

ทั้งประเทศ จำนวน 16.30 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13.55 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 2.75 ล้านไร่

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 9.23 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.51 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.72 ล้านไร่

ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2565/66 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)

ทั้งประเทศ จำนวน 15.24 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 13.45 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 1.79 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.50 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 10.84 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 2.61 ล้านไร่)

ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 8.76 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 8.26 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.50 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.91 ของแผน (ข้าว เก็บเกี่ยวแล้ว 7.81 ล้านไร่ รอเก็บเกี่ยว 0.45 ล้านไร่)

ขอบเขตพื้นที่	พื้นที่แหล่งน้ำ	แผนการเพาะปลูก ปี 2565/66			สถานการณ์การเพาะปลูก ปี 2565/66						ข้าวรอบที่ 2	
		ข้าวรอบที่ 2	พืชไร่ พืชผัก	รวม	รวมข้าว	%รวมข้าว	พืชไร่ พืชผัก	%พืชไร่ พืชผัก	รวมทั้งหมด	%รวมทั้งหมด	พื้นที่เก็บเกี่ยว	พื้นที่รอ
ทั้งประเทศ (77 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	10.42	0.64	11.06	10.45	100.29	0.67	104.69	11.12	100.54	8.31	2.14
	นอกเขตชลประทาน	3.13	2.11	5.24	3.00	95.85	1.12	53.08	4.12	78.63	2.53	0.47
	รวม	13.55	2.75	16.30	13.45	99.26	1.79	65.09	15.24	93.50	10.84	2.61
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (22 จังหวัด)	ในเขตชลประทาน	6.64	0.10	6.74	6.41	96.54	0.15	150.00	6.56	97.33	6.03	0.38
	นอกเขตชลประทาน	1.87	0.62	2.49	1.85	98.93	0.35	56.45	2.20	88.35	1.78	0.07
	รวม	8.51	0.72	9.23	8.26	97.06	0.50	69.44	8.76	94.91	7.81	0.45

พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เกินกว่าแผน รวม 45 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน รวม 1.14 ล้านไร่ ได้แก่

- ในเขตชลประทาน 36 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.89 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิษณุโลกแพร่ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ชัยนาท อ่างทอง จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี เพชรบุรี ตรัง และจังหวัดกระบี่

- นอกเขตชลประทาน 26 จังหวัด พื้นที่ปลูกข้าวเกินกว่าแผน 0.25 ล้านไร่ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน พะเยา พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม สุรินทร์ สกลนคร อำนาจเจริญ ชัยนาท ระยอง สระแก้ว สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร นครนายก ลพบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. การปฏิบัติการฝนหลวง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปัจจุบันจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ จำนวน 12 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี จันทบุรี อำเภอดงขี้เหล็ก ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ รวมทั้งบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

พื้นที่ขอรับบริการฝนหลวง (วันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2566)

ภาค	จังหวัดที่ขอรับบริการ
เหนือ	กำแพงเพชร(5) ตาก(4) น่าน(4) พะเยา(5) พิจิตร(5) พิษณุโลก(3) ลำปาง(1) สุโขทัย(5) อุตรดิตถ์(4) เชียงใหม่(3) เพชรบูรณ์(11) แพร่(5)
กลาง	กาญจนบุรี(10) ชัยนาท(3) นครสวรรค์(12) ลพบุรี(9) สระบุรี(2) สิงห์บุรี(2) สุพรรณบุรี(4) อุทัยธานี(8) อ่างทอง(1)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์(4) ขอนแก่น(13) ชัยภูมิ(11) นครพนม(3) นครราชสีมา(17) บึงกาฬ(1) บุรีรัมย์(10) มหาสารคาม(5) มุกดาหาร(7) ยโสธร(5) ร้อยเอ็ด(4) ศรีสะเกษ(6) สกลนคร(3) สุรินทร์(8) หนองคาย(1) หนองบัวลำภู(4) อำนาจเจริญ(4) อุตรดิตถ์(6) อุบลราชธานี(7) เลย(5)
ตะวันออก	จันทบุรี(8) ฉะเชิงเทรา(4) ชลบุรี(4) ตราด(1) นครนายก(4) ปราจีนบุรี(6) ระยอง(4) สระแก้ว(9)
ใต้	ชุมพร(5) ประจวบคีรีขันธ์(7) ราชบุรี(6) สุราษฎร์ธานี(1) เพชรบุรี(4)
รวม	54 จังหวัด (293 อำเภอ)

สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2566

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
1. เชียงใหม่	4	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.ลำปาง(งาว) จ.เชียงใหม่(ฮอด แม่แจ่ม) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง
2. ตาก	4	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.ตาก(วังเจ้า) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก
3. พิษณุโลก	6	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.แพร่(เมืองแพร่ เด่นชัย) จ.เพชรบูรณ์(หล่มสัก หล่มเก่า เขาค้อ) จ.อุตรดิตถ์(ท่าปลา) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อ จ.เพชรบูรณ์
4. ลพบุรี	6	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณ จ.นครสวรรค์(แม่เปิน แม่วังก หนองบัว ท่าตะโก โพธิ์) จ.อุทัยธานี(บ้านไร่ ลานสัก) จ.สระบุรี(มวกเหล็ก) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา จ.อุทัยธานี อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ อ่างเก็บน้ำ มวกเหล็ก จ.สระบุรี
5. กาญจนบุรี	3	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.กาญจนบุรี(สังขละบุรี ทองผาภูมิ บ่อพลอย ศรีสวัสดิ์) จ.สุพรรณบุรี(ด่านช้าง) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี อ่างเก็บน้ำ กระเสี้ยว จ.สุพรรณบุรี
6. ขอนแก่น	4	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง ไม่มีฝนตกเนื่องจากการติดตามด้วยเรดาร์ตรวจอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม พบว่ากลุ่มเมฆในพื้นที่เป้าหมายสลายตัวค่อนข้างเร็ว
7. นครราชสีมา	4	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.นครราชสีมา(ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน พระทองคำ ด่านขุนทด เลิงสาง หนองบุญมาก ขามทะเลสอ โนนไทย) จ.ชัยภูมิ(เมืองชัยภูมิ เนินสง่า จัตุรัส หนองบัวแดง) จ.บุรีรัมย์(เมืองบุรีรัมย์ ชำนิ กระสัง ปะคำ หนองกี่ โนนสุวรรณ) จ.สุรินทร์(เมืองสุรินทร์ ศีขรภูมิ)
8. อุบลราชธานี	0	ไม่ปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจากเครื่องบิน(ทอ.) ตรวจพบเศษประจักษ์ปด้า
9. จันทบุรี	3	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.จันทบุรี(สอยดาว) จ.สระแก้ว (เขาฉกรรจ์ คลองหาด วัฒนานคร) จ.ฉะเชิงเทรา(ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด อ่างเก็บน้ำคลองระบม จ.ฉะเชิงเทรา
10. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	6	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายากแล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.ราชบุรี(สวนผึ้ง บ้านคา ปากท่อ) จ.เพชรบุรี(แก่งกระจาน หนองหญ้าปล้อง ท่ายาง) จ.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน ปราณบุรี) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยปฏิบัติการ	จำนวนเที่ยวบิน (เที่ยว)	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก
11. สุราษฎร์ธานี	1	1. การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้ง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ จ.ระนอง(ละอุ่น เมืองระนอง) จ.ชุมพร(ละแม หลังสวน พะโต๊ะ ท่าตะโก สวี) จ.สุราษฎร์ธานี(ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน บ้านตาขุน วิภาวดี) 2. การกักเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนเก็บกัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
12. สงขลา	1	การกักป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้ง มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.พัทลุง(ป่าพะยอม) จ.ตรัง(ห้วยยอด รัชฎา) จ.นครศรีธรรมราช(ชะอวด)
รวม	42	

สรุปผลรวมปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง (15 กุมภาพันธ์ – 21 พฤษภาคม 2566)

ตั้งแต่เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 – 21 พฤษภาคม 2566 การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 74 วัน ขึ้นปฏิบัติงาน จำนวน 1,696 เที่ยวบิน (2,688:36 ชั่วโมงบิน) ปริมาณการใช้น้ำฝนหลวง 1,377.6 ตัน พลุสารพัดความขึ้นโซเดียมคลอไรด์ จำนวน 226 นัด พลุสารพัดความขึ้นแคลเซียมคลอไรด์จำนวน 222 นัด พลุซิลเวอร์ไอโอไดต์ สำหรับภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1,505 นัด จังหวัดที่มีรายงานฝนตก รวม 63 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย สกลนคร นครพนม หนองคาย บัรรัมย์ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ บึงกาฬ มุกดาหาร หนองบัวลำภู นครราชสีมา อุตรดิตถ์ มหาสารคาม กาญจนบุรี ร้อยเอ็ด อุทัยธานี นครสวรรค์ สุรินทร์ จันทบุรี ตรวดี ยโสธร อุบลราชธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก ลพบุรี ระยอง ระนอง สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี ปราชินบุรี กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง พัทลุง สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

- **เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่** เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาปี นาปรัง อุบโกล-บริโกล พืชไร่ และอุทกภัย ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 จำนวน 2,289 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จำนวน 136 เครื่อง โดยแบ่งแยกดังนี้

1. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปีและพืชไร่ จำนวน 87 เครื่อง ในพื้นที่ 12 จังหวัด
2. ช่วยเหลือพื้นที่ข้าวนาปรัง จำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด
3. ช่วยเหลือเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 34 เครื่อง ในพื้นที่ 9 จังหวัด

- **เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ** รวมทั้งหมด 503 คัน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 93 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 คัน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 147 คัน ภาคใต้ 30 คัน และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและส่วนกลาง (นนทบุรี) 156 คัน

6. ผลกระทบด้านการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 66)

6.1 วิกฤตภัย ช่วงภัย 4 ก.พ. 66 - ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เลย แพร่ เพชรบูรณ์ จันทบุรี หนองคาย อุทัยธานี ตรวดี พิจิตร ชุมพร กระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,630 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 17,051 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,338 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 6,611 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,102 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 815 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,241 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่และพืชผัก 631 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 610 ไร่ คิดเป็นเงิน 3.72 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 224 ราย (คิดเป็นร้อยละ 27.48 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 526 ไร่ วงเงิน 1.16 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.22 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

6.2 อุทกภัย (ภาคใต้) ช่วงภัย 1 ธ.ค. 65 – 29 ม.ค. 66

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 10,364 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 82,071 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 26,099 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 8,162 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 47,809 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,577 ราย พื้นที่ 6,805 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 4,569 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,742 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 494 ไร่ คิดเป็นเงิน 11.57 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ตรัง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี สตูล กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร 7,949 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 19,978 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 13,786 ไร่ บ่อกุ้ง 6,192 ไร่ กระชัง 23,228 ตร.ม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 7,949 ราย พื้นที่ 19,978 ไร่ กระชัง 23,228 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 147.38 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 7,527 ราย (คิดเป็นร้อยละ 94.69 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 19,481 ไร่ กระชัง 16,046 ตร.ม. วงเงิน 139.73 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 94.81 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ปัตตานี พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 65,308 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 5,948,600 ตัว แบ่งเป็น โค 146,148 ตัว กระบือ 3,119 ตัว สุกร 103,573 ตัว แพะ/แกะ 40,742 ตัว สัตว์ปีก 5,655,018 ตัว แปลงหญ้า 2,999 ไร่ **สำรวจพบความเสียหาย** เกษตรกร 1,307 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 52,419 ตัว แปลงหญ้า 175 ไร่ คิดเป็นเงิน 21.00 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 14 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.07 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) สัตว์ตาย/สูญหาย 69 ตัว แปลงหญ้า 62 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.43 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของวงเงินช่วยเหลือ)

6.3 อุทกภัย ช่วงภัย ส.ค. - 23 พ.ย. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 65 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ตรด ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครนายก นครปฐม กาญจนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เกษตรกร 463,244 ราย พื้นที่ 4,147,759 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 2,770,252 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,343,928 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 33,579 ไร่ คิดเป็นเงิน 6,509.06 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 441,839 ราย (คิดเป็นร้อยละ 95.38 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 3,941,101 ไร่ วงเงิน 6,191.02 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 95.11 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 52 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พะเยา ลำปาง ลำพูน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุรธานี หนองคาย มหาสารคาม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ตรด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก นครปฐม ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ราชบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตรัง สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 26,121 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย 44,523 ไร่ กระชัง 36,864 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 301.52 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 23,499 ราย (คิดเป็นร้อยละ 89.96 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 40,536 ไร่ กระชัง 35,009 ตร.ม. วงเงิน 281.23 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 93.27 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านปศุสัตว์ พบความเสียหาย 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกร 3,920 ราย สัตว์ตาย/สูญหาย 412,408 ตัว แบ่งเป็น โค 46 ตัว กระบือ 13 ตัว สุกร 44 ตัว แพะ/แกะ 241 ตัว สัตว์ปีก 411,225 ตัว แปลงหญ้า 1,900 ไร่ คิดเป็นเงิน 21.85 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 3,925 ราย (คิดเป็นร้อยละ 100.13 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) สัตว์ตาย/สูญหาย 402,314 ตัว แปลงหญ้า 1,892 ไร่ คิดเป็นเงิน 21.74 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.49 ของวงเงินช่วยเหลือ)

6.4 อุทกภัย ช่วงภัย พ.ค. - 31 ก.ค. 65

ด้านพืช พบความเสียหาย 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กรุงเทพฯ สระบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 21,164 ราย พื้นที่ 271,038 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 229,422 ไร่ พืชไร่ และพืชผัก 41,299 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ 317 ไร่ คิดเป็นเงิน 390.48 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 13,627 ราย (คิดเป็นร้อยละ 64.38 ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ) พื้นที่ 121,302 ไร่ วงเงิน 177.17 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 45.37 ของวงเงินช่วยเหลือ)

ด้านประมง พบความเสียหาย 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล เกษตรกร 1,489 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,509 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,500 ไร่ บ่อกุ้ง 10 ไร่ กระชัง 563 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 7.340 ล้านบาท **ช่วยเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว**

ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ

7. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 66)

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ข้าว	1. แมลงสิง 2. หนอนกระทู้ข้าว 3. เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล 4. เพลี้ยไฟ	พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (นราธิวาส และสงขลา) จำนวน 16 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชลบุรี ราชบุรี และ สุพรรณบุรี) จำนวน 151 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 147 ไร่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และสระแก้ว) จำนวน 205 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เพชรบุรี) จำนวน 5 ไร่ การระบาดลดลง 62 ไร่	- แมลงสิง ให้กำจัดวัชพืชในนาข้าว คั่นนาและรอบๆ แปลง จับตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมาทำลาย ตัวเต็มวัยชอบกินเนื้อเน่า นำเนื้อเน่าแขวนไว้ตามนาข้าวและจับมาทำลาย หลีกเลี่ยงการปลูก ข้าวต่อเนื่องเพื่อลดการแพร่ขยายพันธุ์ - หนอนกระทู้ข้าว ให้หมั่นสำรวจ ไถพลิกดินในแปลง เพื่อทำลาย ดักแด้ที่อยู่ในดิน กำจัดวัชพืชตามคันนาเพื่อทำลายแหล่งอาศัย ใช้สารฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร เพนิโทรไทออน 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร โดยเลือกใช้สาร ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบมีการระบาดรุนแรง - เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แนะนำวิธีวิธีการผลิตขยายเชื้อรา บิวเวอร์เรีย ให้ปลูกข้าวพันธุ์ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 60 ปทุมธานี 1 เป็นต้น และคุมน้ำในแปลงนา ให้พอдинเปียก ปล่อยให้แห้งเองสลับกันไป - เพลี้ยไฟ ให้หมั่นสำรวจ ดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ ให้น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อพบ เพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้น ในข้าวอายุ 6-7 วัน หลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว ใช้สารฆ่าแมลง มาลาไธออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 85% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบในข้าวมัน
มะพร้าว	1. หนอนหัวดำ 2. หนอนกินใบมะพร้าว 3. แมลงดำหนาม 4. ดั้วงวง 5. ดั้วแรด 6. โรสี้ขามะพร้าว	พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 6,205 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 540 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (ชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 12,612 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จันทบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,101 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่ พื้นที่ระบาด 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ปัตตานี ภูเก็ต สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 5,357 ไร่ การระบาดลดลง 12 ไร่ พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (ชัยภูมิ จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ตราด นครปฐม สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ชุมพร สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 496 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่	- รมรงศ์ให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำ และหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย ไปเผาทิ้งนอกแปลง และ เก็บเศษซากพืชไปเผาทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ - ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าวในพื้นที่ - ใช้กำดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงและด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อรา เมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะ ตัวหนอน - โรสี้ขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในช่วงผลมะพร้าวทำให้การพ่น สารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัด ให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะ ผลขนาดเล็กลงมาประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะ ที่โรสี้ขามะพร้าวเข้าทำลายใช้สารเคมีตามคำแนะนำ ของกรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
ปาล์ม น้ำมัน	1. ดั้วแรด 2. ดั้วกุหลาบ 3. หนอนปลอกเล็ก 4. โรคลำต้นเน่า 5. โรคทะลายเน่า 6. โรคใบจุด 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,069 ไร่ การระบาดลดลง 57 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร สตูล และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 272 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ระยอง กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,532 ไร่ การระบาดลดลง 16 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (ระยอง กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง สงขลา สตูล และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1,929 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 28 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (นครสวรรค์ ตราด กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 77 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ยะลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 69 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ตรัง และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 160 ไร่ การระบาดคงที่	- ใช้กำดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะ ตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อมราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอน - พ่นด้วงกุหลาบด้วยสารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7-10 วัน ในตอนเย็น - หนอนปลอกเล็ก พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที โดยใช้เครื่องพ่น ที่ปรับความดันได้ไม่น้อยกว่า 30 บาร์ และพ่นติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน - ให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาทาบริเวณที่เกิด โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมการระบาด - รมรงค์ให้เกษตรกรตัดทะลายที่เป็นโรคทะลายเน่า ของปาล์มน้ำมันออกไปเผาทำลายนอกแปลง - แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบ ที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุด ให้ลดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที - สำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของ โรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน โดยสำรวจสัปดาห์ละครั้ง ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง
ยางพารา	1. โรคกลากขาว 2. โรคราแป้ง 3. โรคใบร่วงยางพารา 4. โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ปัตตานี นครศรีธรรมราช สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 566 ไร่ การระบาดลดลง 33 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ลำปาง นครศรีธรรมราช และสตูล) จำนวน 134 การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กระบี่ ชุมพร ปัตตานี พังงา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 4,090 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง และภูเก็ต) จำนวน 64,885 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคกลากขาว โดยการขุดคู ล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคนานาคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลาง ระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้าง - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นบริเวณ ที่เกิดโรค - หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา - รมรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ และทำร่องบริเวณโคนต้นยางพาราให้ ร่องขวางกับลำต้น เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามลงสู่ราก
กาแฟ	1. หนอนเจาะกิ่ง/ลำต้น กาแฟ 2. โรคราสนิม 3. โรคใบจุดตากบ	พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 38 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่) จำนวน 73 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และระยอง) จำนวน 25 ไร่ การระบาดคงที่	- แนะนำเกษตรกรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เก็บเศษซากพืชออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง - หนอนเจาะกิ่ง/ลำต้นกาแฟ ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเฟนิโตรไธออน (fenitrothion) (ซูมิไธออน (sumithion) 50% EC) ในอัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ในระยะเวลาของช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
มันสำปะหลัง	1. เพลี้ยแป้ง มันสำปะหลัง 2. เพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู 3. เพลี้ยหอย 4. ไรแดงมันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ขอนแก่น สกลนคร ชลบุรี มุกดาหาร จันทบุรี กาญจนบุรี และระยอง) จำนวน 651 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา และชลบุรี) จำนวน 607 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร ชลบุรี และกาญจนบุรี) จำนวน 21 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 11,206 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4,239 ไร่	- เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ไถและพรวนดิน ใช้ท่อนพันธุ์ ที่สะอาด เมื่อพบการระบาด ถอนต้นมันสำปะหลังและเก็บทำลาย - การควบคุมโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนเพลี้ยแป้งมัน สำปะหลังสีชมพู ปล่อยให้กระจายตัวแปลง ให้เจริญเติบโต และขยายพันธุ์ได้น้อย 10 เท่า ในทุกชั่วอายุ - เพลี้ยหอย ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยหอย ให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง ได้แก่ มาลาไทออน (malathion) 83% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร ไทอะมีโทกแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรา 4 กรัม โดยเลือกใช้สาร และแช่ท่อนพันธุ์นาน 10 นาที ฟึ่งให้แห้งก่อนปลูก

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
	5. โรคพุ่มแจ้ 6. โรคใบต่าง มันสำปะหลัง	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (กำแพงเพชร สกลนคร อุบลราชธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี) จำนวน 342 ไร่ การระบาดลดลง 52 ไร่ พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยนาท ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และกาญจนบุรี) จำนวน 41,284 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2,110 ไร่	- ไรแดง ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน หากเริ่มพบการเข้าทำลายของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทำลาย - โรคพุ่มแจ้ ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคยมีการระบาด และกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ - โรคใบต่างมันสำปะหลัง ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบต่างด้วย 3 วิธี ดังนี้ วิธีฝังกลบ วิธีใส่ถุง/กระสอบ วิธีบดสับ
อ้อย	1. หนอนกออ้อย	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (อุดรธานี ขอนแก่น และ นครราชสีมา) จำนวน 135 ไร่ การระบาดคงที่	- หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชัดเจน ปลอ่ยแต่นเย็นใช้ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัวต่อไร่ ต่อครั้ง ปลอ่ยติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของ หนอนกออ้อย ปลอ่ยแมลงหางหนี้อัตรา 500 ตัวต่อไร่ เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน ควรพ่นสารฆ่าแมลงเดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง ห่าง 14 วัน เมื่อพบการระบาดของหนอนกออ้อย ควรพ่น สารฆ่าแมลง ได้แก่ อินโดกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร หรือคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์	1. หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุด (fall armyworm)	พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (กาญจนบุรี สงขลา และ สตูล) จำนวน 57 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่	- ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง - แนะนำเกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทาน และคลุมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก
สับปะรด	1. โรคเหี่ยว	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ตรัง ระยอง และภูเก็ต) จำนวน 72 ไร่ การระบาดลดลง 11 ไร่	- ทำความสะอาดแปลง เตรียมดินให้ตัดต้นและปักตอเก่า สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากเหง้าต้นสับปะรด และซากวัชพืช หรือเมื่อพบต้นเป็นโรคให้ถอนต้นสับปะรด ที่แสดงอาการใส่ถุงพลาสติกไปทำลายนอกแปลง
ทุเรียน	1. เพลี้ยไฟ 2. เพลี้ยแป้ง 3. เพลี้ยไก่แจ้ 4. ไรแดงแอฟริกา 5. โรครากเน่าโคนเน่า 6. โรคใบติดหรือใบไหม้ 7. โรคใบจุดสาหร่าย	พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง กระบี่ ยะลา ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 768 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (พิษณุโลก จันทบุรี ตรัง ระยอง กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 217 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 55 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา และสงขลา) จำนวน 615 ไร่ การระบาดลดลง 1 ไร่ พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง ระยอง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และยะลา) จำนวน 772 ไร่ การระบาดลดลง 127 ไร่ พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด (เพชรบูรณ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตรัง ระยอง กระบี่ ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,541 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 81 ไร่ พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 544 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง กระบี่ ชุมพร ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 514 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 35 ไร่	- เพลี้ยไฟ หากพบเพลี้ยไฟจำนวนมากหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก หรือ 1 ตัวต่อยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง - เพลี้ยแป้ง หากพบระบาดเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง หากพบการระบาดบริเวณ ผลทุเรียนให้ใช้น้ำพ่นบริเวณที่ถูกทำลาย - เพลี้ยไก่แจ้ ทำลายเฉพาะใบอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่สำหรับต้น ที่แตกใบอ่อนไม่พร้อมต้นอื่นควรพ่นสารฆ่าแมลง - ไรแดงแอฟริกา กำจัดวัชพืชในสวน การใช้สารฆ่าไรไม่ควร ผิดพ่นสารชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานาน เมื่อพบไรแดง แอฟริการะบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์ไทด์ (propargite) 30 % WP อัตรา 30 กรัม อะมิทราซ (amitraz) 20 % EC อัตรา 30 มิลลิลิตร เฮกซีโทอะซอกซ์ (hexythiazox) 2% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร พ่นทุก 7-10 วัน - โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน แจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นสำรวจ สวนทุเรียน แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา - โรคใบติดหรือใบไหม้ หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรคและเก็บเศษพืช ที่เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่น นำไปทำลายนอกแปลง ตัดแต่ง ทรงพุ่มให้โปร่ง และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก ลดการใส่ปุ๋ย ไนโตรเจนสูง ในพื้นที่ปลูกที่มีความชื้นสูง - โรคใบจุดสาหร่าย หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มมีอาการของโรคให้ตัดใบ หรือส่วนที่เป็นโรคนำไป ทำลาย หรือฝังดิน ดูแลการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม เพื่อให้ ทุเรียนรับแสงแดด และอากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อลดความชื้น

ชนิดพืช	ศัตรูพืช	สถานการณ์	การดำเนินงาน
เงาะ	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคนิวโมสากา 3. หนอนคืบกินใบ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี) จำนวน 19 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 33 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 16 ไร่ การระบาดคงที่	- ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่าย เก็บรวบรวมไปเผาทำลาย ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เมื่อพบใบแก่ถูกทำลายมากกว่าร้อยละ 30 ตัดต้น แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนคืบกินใบ ให้สังเกตดูใบเพสลาด ใบอ่อน และใบแก่
มังคุด	1. เพลี้ยไฟ 2. หนอนกินใบ 3. หนอนขอนใบ	พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตรัง ระยอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 329 ไร่ การระบาดลดลง 27 ไร่ พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 419 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 2 ไร่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี ระยอง และชุมพร) จำนวน 83 ไร่ การระบาดคงที่	- หากพบการระบาดของเพลี้ยไฟให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง และไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารฆ่าแมลงได้ - หมั่นสำรวจใบอ่อนมังคุดอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากหนอนจะกัดกินทำลายใบอ่อนในเวลากลางคืน - หมั่นสำรวจและสังเกตการเข้าทำลายของหนอนขอนใบอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สังเกตดูที่ใต้ใบมังคุดจะพบรอยทางยาวเป็นเส้นสีขาว
ลำไย	1. เพลี้ยแป้ง 2. โรคพุ่มไม้กวาด 3. โรคราดำ	พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี ระยอง และสมุทรสาคร) จำนวน 14 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี) จำนวน 255 ไร่ การระบาดคงที่ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา และจันทบุรี) จำนวน 680 ไร่ การระบาดลดลง 7 ไร่	- เพลี้ยแป้ง ให้หมั่นสำรวจแปลงลำไยทุกสัปดาห์หากพบการระบาดแนะนำให้ตัดส่วนของกิ่งก้านที่มีเพลี้ยแป้งอาศัยอยู่ไปทำลาย หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด มาลาไธออน (Malathion) 83% W/V EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และไพรีทรอยด์ (Pyrethroids) (อัตราส่วนตามฉลาก) พ่นให้ทั่ว - โรคพุ่มไม้กวาด เนื่องจากยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา การป้องกันกำจัดทำได้โดยกำจัดแมลงพาหะ - โรคราดำ ให้ป้องกันและกำจัดแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อน เป็นต้น โดยพ่นสารเคมีเช่น คาร์บาริล (Carbaryl) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ และเบตาไซฟลูทรีน

8. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

8.1 โรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 66)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 10 พฤษภาคม 2566 มีรายงานพบโรคทั้งหมด 33 จังหวัด ปัจจุบันยังคงประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 21 จุด ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ และสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้

8.2 โรคลัมปีสกิน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 66)

พบการระบาดของสสมตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 – 8 พฤษภาคม 2566 รวม 70 จังหวัด 899 อำเภอ สัตว์ป่วยสะสม 632,468 ตัว ปัจจุบันยังคงมีสัตว์ป่วย 19,456 ตัว สัตว์ตายสะสม 67,315 ตัว

มาตรการควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคเก็บตัวอย่างเพื่อยืนยันโรค ตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว รวมถึงขอความร่วมมือเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ แหล่งรวมสัตว์ และตลาดนัดค้าสัตว์ รวมทั้งช่องทางการนำเข้าสัตว์ตามแนวชายแดน โดยให้เข้มงวดการตรวจโรคในโค กระบือ ที่เคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจทุกตัว และงดการซื้อขายโค กระบือที่มาจากแหล่งที่เกิดโรค หรือจากพื้นที่ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ 1) รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย 207,473 ราย 2) หยอดหรือราดยาป้องกันแมลง 38,467 ราย 3) พ่นยากำจัดแมลง 228,002 ราย 4) พ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรค 175,180 ราย 5) แจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร 138,631 ราย 6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร 444,383 ราย