



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819959 E-mail : droughtcenter@gmail.com



รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 (เวลา 15.00 น.)

## 1. สภาพอากาศ

### 1.1 พยากรณ์อากาศประจำวัน 12.00 น.




แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 07:00

ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงจากเมื่อวาน เว้นแต่ภาคใต้มีเพิ่มขึ้น ประเทศไทยตอนบนมียังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ประเทศไทย และทะเลอันดามัน ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

อนึ่ง พายุดีเปรสชัน บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 19 – 20 ต.ค. หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 21 – 23 ต.ค. 2568 จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้พายุลดกำลังลงอย่างรวดเร็ว โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

### 1.2 ปริมาณน้ำฝน เวลา 07.00 น. วันที่ 15 ต.ค. 68 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 16 ต.ค. 68



| ที่ | อำเภอ        | จังหวัด      | ปริมาณฝน (มม.) | ความรุนแรง  |
|-----|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 1   | อ.จะนะ       | สงขลา        | 54.4           | ฝนตกหนัก    |
| 2   | อ.เมือง      | ปัตตานี      | 22.6           | ฝนตกปานกลาง |
| 3   | อ.ดอนสัก     | สุราษฎร์ธานี | 21.5           | ฝนตกปานกลาง |
| 4   | อ.พุนพิน     | สุราษฎร์ธานี | 20.6           | ฝนตกปานกลาง |
| 5   | อ.สนามชัยเขต | ฉะเชิงเทรา   | 18.0           | ฝนตกปานกลาง |

ฝนตกหนักมาก (>90 มม.) ฝนตกหนัก (35.1-90 มม.) ฝนตกปานกลาง (10.1-35.0 มม.) ฝนตกเล็กน้อย (0.1-10.0 มม.) ไม่มีฝน (0 มม.)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

## 2. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 68)

### 2.1 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 66,995 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 88 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 43,046 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (61,707 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81) มากกว่าปี 2567 จำนวน 5,288 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 403.38 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 231.13 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 9,537 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำในอ่างฯ 62,389 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 88 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 38,850 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82) ปริมาณน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2567 (57,618 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81) มากกว่าปี 2567 จำนวน 4,771 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 300.68 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 138.97 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 8,563 ล้าน ลบ.ม.

| ภาค      | ขนาดใหญ่        |                       |           |           |        |             | ขนาดกลาง        |                       |           |           |        |             | รวม             |                       |           |           |        |             | รับได้อีก |
|----------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|
|          | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             | จำนวน<br>(แห่ง) | ความจุ<br>ที่<br>รณก. | ปริมาณน้ำ |           |        |             |           |
|          |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |                 |                       | ในอ่างฯ   | %<br>รณก. | ใช้การ | %<br>ใช้การ |           |
| เหนือ    | 8               | 24,825                | 23,548    | 95        | 16,803 | 93          | 87              | 1,145                 | 1,042     | 91        | 949    | 90          | 95              | 25,970                | 24,590    | 95        | 17,752 | 93          | 1,402     |
| ตอน.     | 12              | 8,368                 | 7,535     | 90        | 5,883  | 88          | 230             | 2,122                 | 1,921     | 91        | 1,751  | 90          | 242             | 10,490                | 9,456     | 90        | 7,634  | 88          | 1,035     |
| กลาง     | 3               | 1,419                 | 1,088     | 77        | 1,028  | 76          | 27              | 419                   | 346       | 83        | 320    | 82          | 30              | 1,838                 | 1,435     | 78        | 1,349  | 77          | 403       |
| ตะวันตก  | 2               | 26,605                | 23,232    | 87        | 9,955  | 75          | 8               | 164                   | 93        | 57        | 82     | 54          | 10              | 26,769                | 23,324    | 87        | 10,036 | 74          | 3,444     |
| ตะวันออก | 6               | 1,515                 | 1,224     | 81        | 1,130  | 80          | 52              | 1,009                 | 889       | 88        | 833    | 87          | 58              | 2,524                 | 2,113     | 84        | 1,962  | 83          | 416       |
| ใต้      | 4               | 8,194                 | 5,762     | 70        | 4,052  | 62          | 44              | 721                   | 315       | 44        | 260    | 39          | 48              | 8,916                 | 6,078     | 68        | 4,312  | 60          | 2,838     |
| รวม      | 35              | 70,926                | 62,389    | 88        | 38,850 | 82          | 448             | 5,579                 | 4,606     | 83        | 4,195  | 81          | 483             | 76,506                | 66,995    | 88        | 43,046 | 82          | 9,537     |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 23,547 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 95 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 16,851 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 93) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 137.50 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 65.34 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 1,332 ล้าน ลบ.ม.

| อ่างเก็บน้ำ     | ปริมาณน้ำในอ่างฯ |               | ปริมาณน้ำใช้การได้ |             | ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ |          | ปริมาณน้ำระบาย |          | ปริมาณน้ำรับ<br>ได้อีก |
|-----------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|------------------------|
|                 | ปริมาณน้ำ        | % ความจุอ่างฯ | ปริมาณน้ำ          | % น้ำใช้การ | วันนี้              | เมื่อวาน | วันนี้         | เมื่อวาน |                        |
| ภูมิพล          | 12,509           | 93            | 8,709              | 90          | 56.13               | 41.04    | 9.98           | 9.94     | 953                    |
| สิริกิตี        | 9,223            | 97            | 6,373              | 96          | 36.10               | 36.13    | 25.07          | 25.10    | 287                    |
| ภูมิพล+สิริกิตี | 21,731           | 95            | 15,081             | 92          | 92.23               | 77.17    | 35.05          | 35.04    | 1,241                  |
| แควน้อยฯ        | 947              | 101           | 904                | 101         | 13.47               | 14.49    | 12.96          | 12.96    | -                      |
| ป่าสักชลสิทธิ์  | 869              | 91            | 866                | 90          | 31.80               | 32.22    | 17.33          | 17.29    | 91                     |
| รวมทั้งหมด      | 23,547           | 95            | 16,851             | 93          | 137.50              | 123.88   | 65.34          | 65.29    | 1,332                  |

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จำนวน 21 อ่างฯ ได้แก่ อ่างฯ ภูมิพล (93%) อ่างฯ สิริกิตี (97%) อ่างฯ แม่งัดสมบูรณ์ชล (104%) อ่างฯ แม่กวดุมธรา (88%) อ่างฯ กิ่วคอหมา (97%) อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน (101%) อ่างฯ แม่มอก (103%) อ่างฯ ห้วยหลวง (95%) อ่างฯ น้ำฮวน (98%) อ่างฯ จุฬาภรณ์ (97%) อ่างฯ อุบลรัตน์ (98%) อ่างฯ ลำปาว (95%) อ่างฯ สิรินคร (93%) อ่างฯ ป่าสักชลสิทธิ์ (91%) อ่างฯ ศรีนครินทร์ (85%) อ่างฯ วชิราลงกรณ์ (91%) อ่างฯ ขุนด่านปราการชล (96%) อ่างฯ บางพระ (101%) อ่างฯ หนองปลาไหล (95%) อ่างฯ ประแสร์ (100%) และอ่างฯ นฤปดินทรจินดา (101%)

## 2.2 สภาพน้ำท่า

แม่น้ำท่าตะเภา ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย

แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำน่าน แม่น้ำพระสทิง แม่น้ำตาปี แม่น้ำโก-ลก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แม่น้ำบางปะกง ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก

แม่น้ำยม แม่น้ำมูล ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ท่วม

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,776 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,742 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +24.46 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.24 ม.

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,400 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,300 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +16.81 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.53 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +15.70 ม.รทก. (เมื่อวาน +15.47 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝิ่งตะวันออก รวม 229 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 229 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองชัยนาทป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 180 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 49 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 201 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 194 ลบ.ม./วินาที) รับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 148 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 144 ลบ.ม./วินาที) ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลป์) 26 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 63 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งผิงตะวันตก รวม 326 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 315 ลบ.ม./วินาที) โดยผ่านคลองมะขามเฒ่าอุโมง (ปตร.มะขามเฒ่า-อุโมง) 35 ลบ.ม./วินาที คลองมะขามเฒ่ากระเสียว (ปตร.มะขามเฒ่า-กระเสียว) 11 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 130 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 100 ลบ.ม./วินาที และคลองเล็กอื่น ๆ 50 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำเจ้าพระยา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สถานี C.29B ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,192 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,099 ลบ.ม./วินาที)

## 2.3 คุณภาพน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

| แม่น้ำ    | จุดเฝ้าระวัง                | ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร) |            |            |            |            |            |            | เกณฑ์ | หมายเหตุ                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                             | 11 ต.ค. 68              | 12 ต.ค. 68 | 13 ต.ค. 68 | 14 ต.ค. 68 | 15 ต.ค. 68 | 16 ต.ค. 68 | 17 ต.ค. 68 |       |                                                                                                                                   |
| เจ้าพระยา | ปากคลองสำแล จ.ปทุมธานี      | 0.09                    | 0.09       | 0.09       | 0.09       | 0.09       | 0.09       | 0.09       | ปกติ  | - เกณฑ์เฝ้าระวัง 0.25 กรัม/ลิตร<br>- เกณฑ์มาตรฐานในการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัม/ลิตร<br>- เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตร 2.00 กรัม/ลิตร |
| เจ้าพระยา | ทำนบกุ่มบุรี จ.นนทบุรี      | 0.10                    | 0.10       | 0.10       | 0.10       | 0.11       | 0.11       | 0.11       | ปกติ  |                                                                                                                                   |
| เจ้าพระยา | ทำนบกุ่มชลประทานสามเสน กทม. | 0.10                    | 0.11       | 0.11       | 0.11       | 0.11       | 0.11       | 0.11       | ปกติ  |                                                                                                                                   |

ที่มา: ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

## 2.4 สถานการณ์น้ำโขง

| สถานี                    | ระดับตลิ่ง | ระดับน้ำ<br>17 ต.ค. 68 | + สูงกว่าตลิ่ง<br>- ต่ำกว่าตลิ่ง |
|--------------------------|------------|------------------------|----------------------------------|
| อ.เชียงแสน จ.เชียงราย    | 12.80      | 5.00                   | -7.80                            |
| อ.เชียงคาน จ.เลย         | 16.00      | 9.57                   | -6.43                            |
| อ.เมือง จ.หนองคาย        | 12.20      | 7.43                   | -4.77                            |
| อ.เมือง จ.นครพนม         | 12.00      | 7.19                   | -4.81                            |
| อ.เมือง จ.มุกดาหาร       | 12.50      | 7.12                   | -5.38                            |
| อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 14.50      | 9.49                   | -5.01                            |

หมายเหตุ ข้อมูลจาก [www.drw.go.th](http://www.drw.go.th)

## 3. การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

3.1 กรมชลประทาน ให้ความช่วยเหลือเครื่องจักร - เครื่องมือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 68 – 12 ต.ค. 68 รวม 1,616 หน่วย แบ่งเป็น เครื่องสูบน้ำ 1,127 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 351 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 25 คัน และเครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ 113 หน่วย

3.2 กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหารและเมล็ดพันธุ์พืชผักแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต้นพันธุ์พืชผักพืชอาหาร (พริก/มะเขือเปราะ) จำนวน 17,000 ต้น เมล็ดพันธุ์พืชผัก (คะน้า/กวางตุ้ง) จำนวน 9,500 ซอง และเตรียมหัวเชื้อ ราไตรโคเดอร์มา 10,240 ขวด และเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 17,830 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลด

3.3 กรมปศุสัตว์ อพยพสัตว์ จำนวน 329,064 ตัว ให้อาหารสัตว์พระราชทาน 427,980 กิโลกรัม ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ/ยาปฏิชีวนะ วิตามิน) 43,537 ซอง รักษาสัตว์ 47 ตัว ฝังยาสัตว์ 659 ถุง พร้อมทั้งจัดตั้งสถานที่พักพิงสัตว์ชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยมีสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลสุขภาพสัตว์ไปด้วย

3.4 กรมประมง โดยกองตรวจการประมง ได้จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ 4 ชุด รถยนต์ 4 คัน เรือตรวจการประมง 4 ลำ ช่วยนำส่งเสบียงอาหาร และน้ำดื่ม พร้อมทั้งอพยพประชาชน ผู้ป่วย เด็กและคนชรา ในพื้นที่ประสบภัยสู่พื้นที่ปลอดภัย

## 4. ผลกระทบด้านการเกษตร

### 4.1 อุทกภัย ช่วงภัย 23 ส.ค. 68 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 48 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

เกษตรกร 164,543 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 1,208,942 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,037,944 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 162,996 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 8,002 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 42,455 ราย พื้นที่ 350,922 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 327,151 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 22,392 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 1,379 ไร่ คิดเป็นเงิน 488.30 ล้านบาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 533 ราย พื้นที่ 1,207 ไร่ วงเงิน 2.09 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 68)

**ด้านประมง** ได้รับผลกระทบ 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกร 5,849 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 8,744 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 8,149 ไร่ บ่อกุ้ง 595 ไร่ กระชัง 2,858 ตรม. **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 974 ราย พื้นที่ 1,223 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 1,123 ไร่ บ่อกุ้ง 100 ไร่ กระชัง 182 ตรม. วงเงิน 6,501,685 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 152 ราย พื้นที่ 123 ไร่ กระชัง 80 ตรม. วงเงิน 606,941 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 68)

**ด้านปศุสัตว์** ได้รับผลกระทบ 31 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยนาท ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ระยอง และจังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร 29,554 ราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 8,165,338 ตัว แบ่งเป็น โค 81,754 ตัว กระบือ 25,029 ตัว สุกร 93,918 ตัว แพะ/แกะ 11,697 ตัว และสัตว์ปีก 7,952,940 ตัว แปลงหญ้า 7,924 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** 389,573 ตัว แบ่งเป็น โค 64 ตัว กระบือ 24 ตัว สุกร 219 ตัว แพะ 33 ตัว และสัตว์ปีก 389,573 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 68)

#### 4.2 วาตภัย ช่วงภัย 16 ก.พ. 68 - ปัจจุบัน

**ด้านพืช** ได้รับผลกระทบ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก แพร่ นครสวรรค์ พะเยา เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ปทุมธานี สระบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกร 6,801 ราย พื้นที่ได้รับผลกระทบ 11,006 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 826 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 4,144 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 6,036 ไร่ **สำรวจพบความเสียหายแล้ว** เกษตรกร 1,070 ราย พื้นที่ 1,858 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 113 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 794 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 951 ไร่ คิดเป็นเงิน 5,509,282 บาท **ช่วยเหลือแล้ว** เกษตรกร 1,014 ราย พื้นที่ 1,827 ไร่ วงเงิน 5,380,849 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 68)

**ด้านประมง** ได้รับความเสียหาย 1 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เกษตรกร 1 ราย กระชัง 50 ตรม. คิดเป็นเงิน 18,400 บาท **ช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว**

**ด้านปศุสัตว์** ไม่ได้รับผลกระทบ

#### 5. สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 68)

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                | สถานการณ์                                                                                                                               | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้าว    | 1. หนอนห่อใบข้าว        | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (อุทัยธานี ลำพูน จันทบุรี นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ ตราด หนองคาย และยะลา)<br>จำนวน 62 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 38 ไร่ | - หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ กำจัดพืชอาศัย และเมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัว/ตร.ม. และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม                   |
|         | 2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว  | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช จันทบุรี ตาก และนครราชสีมา)<br>จำนวน 1,805 ไร่ การระบาดคงที่           | - เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ไข่น้ำออกจากแปลงนา<br>- เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวตูดไข่ ระหว่าง 6 : 1- 8 : 1 หรือ/อ่อนวัยที่ 1-2     |
|         | 3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ลำพูน ขอนแก่น ชลบุรี มหาสารคาม ตากสุรินทร์ จันทบุรี นครพนม และอุบลราชธานี)<br>จำนวน 947 ไร่ การระบาดลดลง 37 ไร่ | เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว/ต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง<br>- ไข่น้ำท่วมยอดข้าวทั้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าว ใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                                                                             | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 4. เพลี้ยไฟ<br>5. โรคไหม้ข้าว<br>6. หนอนกอข้าว<br>7. โรคขอบใบแห้ง<br>8. โรคใบสีส้ม<br>9. โรคใบขีดสีน้ำตาล<br>10. เพลี้ยจักจั่นสีเขียว<br>11. แมลงบัว | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (สุรินทร์ ปราจีนบุรี อุทัยธานี และนครราชสีมา)<br>จำนวน 240 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ลำพูน กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยภูมิ นครราชสีมา นครสวรรค์ อุตรธานี ขอนแก่น เพชรบูรณ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี จันทบุรี สกลนคร และหนองบัวลำภู)<br>จำนวน 6,856 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 215 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (มหาสารคาม พิษณุโลก สุรินทร์ จันทบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา สกลนคร และยะลา)<br>จำนวน 171 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น</u> 17 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (บุรีรัมย์ มหาสารคาม จันทบุรี อุตรธานี และศรีสะเกษ)<br>จำนวน 149 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 890 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ปราจีนบุรี และกาฬสินธุ์)<br>จำนวน 22 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 201 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (นครราชสีมา อุบลราชธานี และบุรีรัมย์)<br>จำนวน 56 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 110 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และอุตรธานี)<br>จำนวน 374 ไร่ <u>พื้นที่ระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (นครพนม ตาก อุตรธานี และนครราชสีมา)<br>จำนวน 86 ไร่ <u>พื้นที่ระบาดลดลง</u> 15 ไร่ | หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต<br>- ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ พ่นเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก<br>พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 200 ลิตร<br>- เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง<br>- ใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) หากพบอาการของโรครุนแรงให้พ่นทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบอาการของโรคบนใบข้าว แนะนำให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้ ไอโซโพรโทเลน คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ สเตรโตไมซินซัลเฟต+ออกซีเตตราไซคลิน<br>- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงในระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเร็น บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก<br>- ใช้ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัม/ไร่ สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ หากพบโรคระบาดของโรครุนแรงในระยะแตกกอ ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คาร์เบนดาซิม เนื่องจากเชื้อสาเหตุทำให้เกิดโรคเมล็ดด่าง<br>- สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ใช้แสงไฟส่องแมลงและทำลายเมื่อมีการระบาดรุนแรง ปลุกข้าวพร้อม ๆ กัน และปล่อยพื้นที่ว่างไว้ระยะหนึ่ง เพื่อตัดวงจรชีวิตของแมลง<br>- ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ ใช้สารฆ่าแมลงในระยะที่แมลงเป็นตัวอ่อน เช่น ไดโนทีฟูเร็น บูโพรเฟซิน อีโทเฟนพรอกซ์ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นตามอัตราที่ระบุในฉลาก |
| มะพร้าว | 1. ตัวแรด<br>2. หนอนหัวดำ                                                                                                                            | พื้นที่ระบาด 26 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สมุทรสาคร ชุมพร เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรวาท กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สตูล กระบี่ ระยอง สงขลา จันทบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น พังงา เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ตรัง นครปฐม ภูเก็ต หนองบัวลำภู และร้อยเอ็ด)<br>จำนวน 6,293 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 235 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 40 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา ราชนบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ สมุทรสงคราม ตรวาท ปัตตานี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กรุงเทพมหานคร กระบี่ สุรินทร์ นครราชสีมา นครพนม อุตรธานี จันทบุรี อุบลราชธานี พังงา สระแก้ว ภูเก็ต สตูล หนองคาย สมุทรปราการ ระยอง พัทลุง อำนาจเจริญ กาญจนบุรี หนองบัวลำภู สระบุรี ร้อยเอ็ด สุโขทัย และสกลนคร)<br>จำนวน 42,549 ไร่ <u>การระบาดลดลง</u> 1,635 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ตัดทำลายและขุดตอมะพร้าวที่ไร่สีขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทั้งนอกแปลง กำจัดให้เหี้ยนพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไร่สีขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน<br>- ปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ หรือปล่อยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ ใช้สารเคมีอิมามิกติน-เบนโซเอท โดยมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น และมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวเกะทิ และมะพร้าวที่ทำน้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ<br>- ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงค้ำหนามกัดกินไปเผาทำลาย ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเตส ควบคุมหนอนแมลงค้ำหนามมะพร้าว หรือแตนเบียนเตตระสติคัส ควบคุมดักแด้แมลงค้ำหนามมะพร้าว และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ<br>- ใช้ตาข่ายดักจับด้วงงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดด้วงงวงในระยะหนอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ชนิดพืช         | ศัตรูพืช           | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 3. แมลงดำหนาม      | พื้นที่ระบาด 24 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชุมพร ชลบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรด สงขลา กระบี่ พังงา สตูล ตรัง สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์ จันทบุรี ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ นครพนม กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี พัทลุง และนครราชสีมา) จำนวน 6,751 ไร่ การระบาดลดลง 231 ไร่ | และดักแด้ ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชั้นผสมกับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงงวงมะพร้าว                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | 4. โรสสีขามะพร้าว  | พื้นที่ระบาด 15 จังหวัด (สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา จันทบุรี กาฬสินธุ์ นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว ชุมพร ตรด และชัยนาท) จำนวน 664 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่                                                                                     | - ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้ตาข่ายหรือแหจับปลามาซึ่งวางทิศทางลมดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม อัตรา 800 กรัม/กองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะหนอนและดักแด้ หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ ไดอะซินอน 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอกมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก |
|                 | 5. ด้วงงวง         | พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด (ตราด ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี จันทบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช เพชรบุรี พังงา ราชบุรี สงขลา กาฬสินธุ์ และขอนแก่น) จำนวน 705 ไร่ การระบาดลดลง 190 ไร่                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ปาล์ม<br>น้ำมัน | 1. หนอนปลอกเล็ก    | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชลบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 834 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่                                                                                                                                                                        | - พ่นเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อบีที และพ่นติดต่อกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | 2. หนอนหัวดำ       | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชลบุรี สกลนคร และจันทบุรี) จำนวน 810 ไร่ การระบาดลดลง 53 ไร่                                                                                                                                                                                                      | - ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | 3. ด้วงแรด         | พื้นที่ระบาด 14 จังหวัด (ร้อยเอ็ด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี กระบี่ สตูล ตรัง สงขลา ฉะเชิงเทรา สระบุรี จันทบุรี ระยอง และสระแก้ว) จำนวน 1,160 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่                                                                                                    | - ใช้กับดักฟีโรโมน และใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย และทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม เพื่อกำจัดในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอนและดักแด้                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | 4. ด้วงกุหลาบ      | พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล สระบุรี ตรัง กระบี่ ตรด สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส และจันทบุรี) จำนวน 468 ไร่ การระบาดลดลง 121 ไร่                                                                                                                                     | - หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอกปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบอย่างสม่ำเสมอ ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เซฟวิน อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ                                                                                                                                                                                                |
|                 | 5. โรคลำต้นเน่า    | พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา สตูล พังงา จันทบุรี และชลบุรี) จำนวน 11,685 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่                                                                                                                 | - กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาราดหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | 6. โรคทะลายเน่า    | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ตรด สระแก้ว ชุมพร สงขลา และนครศรีธรรมราช) จำนวน 972 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่                                                                                                                                                                      | - ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ข้อดอกที่ฝ่อ และทะลายที่พบเป็นโรค แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลงตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุดนำไปเผาทำลายนอกแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 7. โรคใบจุด        | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช และนราธิวาส) จำนวน 87 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                               | - ตัดทางใบที่ถูกทำลายแล้วนำไปเผาในที่ที่เก็บเศษซากพืช นำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปลอ่ยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | 8. โรคใบจุดสาหร่าย | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตรัง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช) จำนวน 4,718 ไร่ การระบาดลดลง 63 ไร่                                                                                                                                                                        | - ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายนอกแปลง และหากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์ไฮดรอกไซด์ อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ยางพารา         | 1. โรคครากขาว      | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตราด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) จำนวน 2,210 ไร่ การระบาดลดลง 50 ไร่                                                                                                                                                                         | - คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคครากขาว โดยการขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรคขนาดคูกว้าง 30 ซม. ลึก 60 ซม. ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ชนิดพืช                | ศัตรูพืช                                        | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 2. โรคใบร่วงชนิดใหม่<br>ของยางพารา              | พื้นที่ระบาด 23 จังหวัด (นราธิวาส นครศรีธรรมราช ยะลา ตรัง สงขลา ปัตตานี พังงา พัทลุง น่าน สุโขทัย อุตรธานี สุราษฎร์ธานี หนองคาย บึงกาฬ ระนอง ระยอง เลย กระบี่ ลำปาง ตราด ภูเก็ต นครพนม และ กาญจนบุรี)<br>จำนวน 388,326 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4,947.28 ไร่                                                                                                                                                                           | - ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- หากพบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา รุนแรง ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา<br>- รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดกรีดยางในขณะที่ยางพารา อยู่ในช่วงผลัดใบ                                                                                        |
|                        | 3. โรคใบร่วงยางพารา                             | พื้นที่ระบาด 11 จังหวัด (ตรัง ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สุโขทัย ตราด หนองคาย ชุมพร ระนอง นครพนม กระบี่ และพังงา)<br>จำนวน 2,847 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                             | - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่ง น้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบ                                                                                                                                            |
|                        | 4. โรคเส้นดำ                                    | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (จันทบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ นราธิวาส ตราด และสกลนคร)<br>จำนวน 154 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - เมื่อพบอาการโรคเป็นรอยปุ่มเพียงเล็กน้อย ใช้สารเคมี ป้องกันกำจัดเชื้อราทาบริเวณที่ถูกทำลาย เพื่อรักษาโรค                                                                                                                                                                                |
|                        | 5. อาการเปลือกแห้ง                              | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตรัง สกลนคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตราด และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 6,674 ไร่ การระบาดลดลง 10 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางไหลนานผิดปกติและน้ำยางจางลง หรือน้ำยาง หยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีด ควรหยุดกรีด 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง                                                                                    |
| กาแฟ                   | 1. หนอนกาแฟสีแดง                                | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (เชียงใหม่)<br>จำนวน 8 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟ- สีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลายนอกแปลง                                                                                                                                                                                            |
| มันสำปะหลัง            | 1. โรคใบด่าง<br>มันสำปะหลัง                     | พื้นที่ระบาด 38 จังหวัด (นครราชสีมา กำแพงเพชร กาญจนบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี ชลบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ สระแก้ว อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ระยอง นครสวรรค์ มหาสารคาม ยโสธร สระบุรี สุรินทร์ ชัยนาท อุตรธานี ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ เพชรบุรี สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก จันทบุรี สกลนคร หนองบัวลำภู นครพนม และตาก)<br>จำนวน 1,224,275 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 9,026 ไร่ | - ให้ไถและพรวนดิน และใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบด่าง<br>- ให้หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้ง หรือ ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน<br>- ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค ทำลาย ต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการ                               |
|                        | 2. เพลี้ยแป้ง<br>มันสำปะหลัง                    | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (ชลบุรี ชัยนาท สกลนคร สระแก้ว บุรีรัมย์ นครราชสีมา จันทบุรี และ อุบลราชธานี)<br>จำนวน 1,289 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 31 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ขุดหรือถอนต้นที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลง หลีกเลี่ยง การขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคไปสู่แหล่งที่ยังไม่เคย มีการระบาดและกำจัดวัชพืชที่แหล่งพักเชื้อ                                                                                                                                    |
|                        | 3. โรคโคนเน่าหัวเน่า                            | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (มหาสารคาม สระแก้ว เพชรบูรณ์ ชลบุรี บุรีรัมย์ และสกลนคร)<br>จำนวน 627 ไร่ การระบาดลดลง 627 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ควบคุมการแปลงปลูกเพื่อไม่ให้ให้น้ำท่วมขัง ก่อนปลูกควรแช่ ท่อนพันธุ์ด้วยเมทาแลกซิล หรือฟอสฟิอิล-อะลูมิเนียม                                                                                                                                                                             |
|                        | 4. โรคพุ่มแจ้                                   | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรี)<br>จำนวน 978 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 63 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - โรคใบไหม้ แนะนำใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค ปานกลาง ในพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียน                                                                                                                                                                       |
|                        | 5. โรคเน่ามันสำปะหลัง                           | พื้นที่ระบาด 9 จังหวัด (ชลบุรี บุรีรัมย์ ระยอง กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร สุรินทร์ มหาสารคาม และขอนแก่น)<br>จำนวน 4,060 ไร่ การระบาดลดลง 2,158 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - อายุสั้น เพื่อลดประชากรเชื้อโรคในดิน การใช้สารเคมีเป็นทางเลือก สุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง- ใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถตากดิน ช่วยกำจัดตัวหนอนและ ดักแด้ในดิน การเก็บเศษซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหาร                                                              |
|                        | 6. โรคใบไหม้                                    | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (ชัยนาท ยโสธร อุบลราชธานี และสกลนคร)<br>จำนวน 301 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - สามารถช่วยลดประชากรและการขยายพันธุ์ได้ ถ้าในระยะ หนอนขนาดเล็กและพบการระบาดน้อย พ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 80 กรัม หรือ มล./น้ำ 20 ลิตร เชื้อไวรัส วคทีโอโพลีอีโคโนไวรัส หรือ เอ็นพีวี หนอนกระท่อม อัตรา 20-30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7 วัน |
| ข้าวโพด<br>เลี้ยงสัตว์ | 1. หนอนกระท่อมข้าวโพด<br>ลายจุด (fall armyworm) | พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (อุทัยธานี นครราชสีมา ตาก เชียงใหม่ ยะลา จันทบุรี กาฬสินธุ์ สระแก้ว พัทลุง ขอนแก่น สตูล และสงขลา)<br>จำนวน 3,379 ไร่ การระบาดลดลง 419 ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ควบคุมการระบาดของหนอนกระท่อมข้าวโพดลายจุด (FAW) แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เก็บกลุ่มไข่ หรือตัวหนอนทำลายทิ้งนอกแปลง                                                                                                                                                       |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                                                                                                 | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 2. โรคใบไหม้แผลใหญ่                                                                                                                                                      | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (ตาก)<br>จำนวน 500 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สับปะรด | 1. โรคเหี่ยว                                                                                                                                                             | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (ตราด และประจวบคีรีขันธ์)<br>จำนวน 305 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ทำความสะอาดแปลง การเตรียมดิน ควรตัดต้นและป่นต่อเก่า<br>สับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน พร้อมทั้งเก็บซากต้นสับปะรดทำลาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| อ้อย    | 1. หนอนกออ้อย<br>2. โรคใบขาว<br>3. โรคเส้ดำ<br>4. ด่างหนวดยาว                                                                                                            | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์<br>นครราชสีมา และชลบุรี)<br>จำนวน 1,401 ไร่ การระบาดลดลง 5 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี<br>มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ มุกดาหาร และ<br>หนองบัวลำภู)<br>จำนวน 21,809 ไร่ การระบาดลดลง 819 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (อุทัยธานี และบุรีรัมย์)<br>จำนวน 264 ไร่ การระบาดคงที่<br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (บุรีรัมย์ และขอนแก่น)<br>จำนวน 264 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - หนอนกออ้อย ควรให้น้ำเพื่อให้อ้อยแตกหน่อชดเชย<br>ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา 30,000 ตัว/ไร่/ครั้ง<br>- ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ต้นจากการเพาะเลี้ยง<br>เนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการเกิดโรคใบขาว<br>หมั่นตรวจกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก<br>- โรคเส้ดำ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ<br>20 ลิตร ผสมสารจับใบและฉีดพ่นในเวลาเย็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ทุเรียน | 1. เพลี้ยแป้ง<br>2. เพลี้ยไฟ<br>3. เพลี้ยไก่แจ้<br>4. เพลี้ยหอยเกล็ด<br>5. หนอนเจาะผล<br>6. ไรแดง<br>7. โรครากเน่าโคนเน่า<br>8. โรคใบติดหรือใบไหม้<br>9. โรคใบจุดสาหร่าย | พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ยะลา ชุมพร จันทบุรี ตราด<br>สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่)<br>จำนวน 409 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชุมพร<br>นครศรีธรรมราช ยะลา และกระบี่)<br>จำนวน 917 ไร่ การระบาดลดลง 76 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 12 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช<br>ยะลา สุราษฎร์ธานี ตราด ชุมพร สงขลา ตรัง กระบี่<br>นราธิวาส สตูล และพังงา)<br>จำนวน 1,029 ไร่ การระบาดลดลง 22 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 10 จังหวัด (จันทบุรี ตราด ยะลา<br>ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี กระบี่<br>ระยอง และนราธิวาส)<br>จำนวน 337 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 6 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร นครศรีธรรมราช และ<br>จันทบุรี)<br>จำนวน 75 ไร่ การระบาดลดลง 8 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (กระบี่ สุราษฎร์ธานี จันทบุรี<br>นครศรีธรรมราช ชุมพร ตราด และนราธิวาส)<br>จำนวน 801 ไร่ การระบาดลดลง 37 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี<br>ตราด ยะลา ระยอง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี<br>พังงา นราธิวาส ตรัง กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง<br>ตาก ภูเก็ต และสตูล)<br>จำนวน 4,618 ไร่ การระบาดลดลง 41 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 7 จังหวัด (ยะลา จันทบุรี ชุมพร ตราด<br>นราธิวาส สงขลา และนครศรีธรรมราช)<br>จำนวน 622 ไร่ การระบาดลดลง 9 ไร่<br>พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ยะลา กระบี่<br>สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และตราด)<br>จำนวน 1,186 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 61 ไร่ | - เมื่อพบระบาดเพลี้ยแป้งเพียงเล็กน้อยให้ตัดหรือเด็ด<br>ส่วนที่ถูกทำลายไปทิ้งนอกแปลง สารฆ่าแมลงที่ได้ผลในการ<br>ควบคุมเพลี้ยแป้ง คือ คาร์บาริล อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร<br>โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งทำลาย<br>- เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่<br>อิมิดาโคลพริด ฟิโปรนิล หรือคาร์โบซัลแฟน เลือกใช้สาร<br>ผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- เมื่อพบเพลี้ยไก่แจ้ระบาดรุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่<br>ไทอะมีโทกแซม/แลมบูดา-ไซฮาโลทริน ไทอะมีโทกแซม<br>อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน โดยเลือกใช้สารผสมน้ำ<br>20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงระยะแตกใบอ่อน<br>- เมื่อพบไรแดงทุเรียนหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรง<br>ให้ใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ โพรพาร์โกด์ อัตรา 30 กรัม<br>อะมิพรอส อัตรา 30 มล. หรือเฮกซีไทอะซอกซัลอัตรา 40 มล.<br>- โรครากเน่าโคนเน่า แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา<br>- เมื่อพบการระบาดของโรคใบติดหรือใบไหม้มากควรพ่นสาร<br>ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เฮกซะโคนาโซล อัตรา 20 กรัม<br>คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ อัตรา 30-50 กรัม เป็นต้น<br>เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นทุก 7-10 วัน โดยพ่นที่ใบ<br>- เมื่อเริ่มพบอาการของโรคใบจุดสาหร่ายให้ตัดใบ หรือ<br>ส่วนที่เป็นโรคนำไปทำลาย หากโรคร้ายคงระบาดพ่นด้วยสาร<br>ป้องกันกำจัดโรคพืช<br>- หากพบเพลี้ยหอยเกล็ดในปริมาณน้อยบนใบใช้น้ำผสม<br>ไวต์ออยล์ อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อระบาด<br>รุนแรงให้ใช้สารกำจัดแมลงพ่นเฉพาะต้นที่พบ<br>- เมื่อพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝอยระบาดรุนแรง<br>ให้ใช้สารกำจัดแมลง เช่น คาร์โบซัลแฟน อัตรา 50 มล. หรือ<br>ไซเพอร์เมทรินฟิซาโลน อัตรา 40 มล. เป็นต้น โดยเลือกใช้<br>สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน<br>- เมื่อพบคราบราสีดํา พ่นด้วยน้ำเปล่าล้างคราบราสีดํา และ<br>สารเหนียวที่แมลงปากดูดซับถ่ายไว้ เพื่อลดปริมาณเชื้อ<br>สาเหตุโรค และกำจัดวัชพืชในแปลง |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                | สถานการณ์                                                                                                                                 | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 10. เพลี้ยจักจั่นฝอย    | พื้นที่ระบาด 13 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรวต ระยอง นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี สงขลา กระบี่ ยะลา นครราชสีมา พัทลุง และนราธิวาส) | - ในฤดูฝนหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของโรคที่กิ่งให้ตัดและนำไปทำลายนอกแปลง และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ผสมน้ำขึ้นๆ ทาบริเวณแผลที่ตัด                                                            |
|         | 11. โรคราดำ             | จำนวน 1,018 ไร่ การระบาดลดลง 4 ไร่                                                                                                        | - ห่อผลเพื่อป้องกันหนอนเจาะด้วยถุงถุงพลาสติกสีขาวขุ่น                                                                                                                                                                                |
|         | 12. โรคราสีชมพู         | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ชุมพร และพังงา)                                                                                     | - เจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก และกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซยาโลทริน                                                                                                                        |
|         | 13. มอดเจาะลำต้นทุเรียน | จำนวน 128 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่                                                                                                          | - มอดเจาะลำต้น ควรตัดและเผาทิ้ง สำหรับส่วนของต้นทุเรียนที่ไม่สามารถตัดทิ้งได้                                                                                                                                                        |
|         | 14. หนอนกินใบ           | พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรวต สุราษฎร์ธานี สงขลา ภูเก็ต และกระบี่)                                            | - หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน                                                                                                                                                                                     |
|         | 15. โรคกิ่งแห้ง         | จำนวน 180 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                               | - ให้เขย่ากิ่ง ตัวหนอนคืบจะทิ้งตัวลงที่พื้นดิน สามารถจับทำลายได้ หรือใช้กับดักแสง ไฟล่อตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืน                                                                                                                       |
|         | 16. โรคแอนแทรคโนส       | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (ชุมพร จันทบุรี ยะลา ตรวต และสงขลา)                                                                                | - หมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ไม่ให้รกทึบ และกำจัดวัชพืชในสวนเพื่อลดความชื้น หากพบการระบาดเพียงเล็กน้อย ควรตัดส่วนที่เป็นโรคนำออกไปทำลายนอกสวน                             |
|         | 17. หนอนเจาะเมล็ด       | จำนวน 139 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                               | - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรืออโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร                                                                                        |
|         | 18. โรคผลเน่าทุเรียน    | พื้นที่ระบาด 5 จังหวัด (จันทบุรี ตรวต ชุมพร ระยอง และสุรินทร์)                                                                            | - หมั่นตรวจตราผลทุเรียนในแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงผลใกล้แก่ หากพบอาการผลเป็นจุดเน่า ควรทำการฉีดพ่นสารเคมี เช่น เมตาแลกซิล 25% WP หรือ เมตาแลกซิลผสมแมนโคแซป หรือ ฟอสเอทธิล อะลูมิเนียม 80% WP ให้ทั่วทั้งต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง |
|         |                         | จำนวน 439 ไร่ การระบาดลดลง 14 ไร่                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี ยะลา ปราจีนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรวต และปราจีนบุรี)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | จำนวน 457 ไร่ การระบาดลดลง 48 ไร่                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (ชุมพร ยะลา และจันทบุรี)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | จำนวน 432 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (พัทลุง ยะลา นราธิวาส และนครศรีธรรมราช)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | จำนวน 538 ไร่ การระบาดลดลง 2 ไร่                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และยะลา)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | จำนวน 19 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| เงาะ    | 1. เพลี้ยแป้ง           | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช)                                                                                        | - ตัดแต่งกิ่งเงาะ จากนั้นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบโคนต้น เพื่อป้องกันมดและเพลี้ยแป้ง                                                                                                                                       |
|         | 2. โรคใบจุดสาหร่าย      | จำนวน 55 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                                | - ตัดส่วนที่พบโรคใบจุดสาหร่ายเก็บไปเผาทำลาย และตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง แนะนำให้ใช้สารเคมีคอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์                                                                                                                       |
|         | 3. หนอนคืบกินใบ         | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนราธิวาส)                                                                                             | - หมั่นสำรวจและสังเกตถ้าพบหนอนคืบกินใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง คาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร                                                                                                                               |
|         | 4. โรคราแป้ง            | จำนวน 295 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 3 ไร่                                                                                                     | - โรคราแป้ง ให้เก็บผลที่เป็นโรค ใบแห้ง กิ่งแห้งที่ร่วงหล่นนำไปเผาทำลายนอกแปลง ในแตกช่วงใบอ่อนและเริ่มติดผล                                                                                                                           |
|         |                         | พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | จำนวน 188 ไร่ การระบาดคงที่                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และนครศรีธรรมราช)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | จำนวน 143 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| มังคุด  | 1. เพลี้ยไฟ             | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (ตรวต จันทบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร)                                                          | - การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุดในช่วงฤดูแล้ง โดยการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชควรพ่น 3 ครั้ง                                                                                                                                    |
|         | 2. หนอนกินใบ            | จำนวน 159 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่                                                                                                     | - เมื่อพบหนอนกินใบอ่อนเข้าทำลายของยอด ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 60 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดในระยะแตกใบอ่อน ให้พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน                                                                           |
|         | 3. หนอนขอนใบ            | พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระยอง พังงา และยะลา)                                                                 | - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคใบจุด ในช่วงที่มังคุดแตกใบอ่อน เช่น คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์ 30-80 กรัม                                                                                                                                     |
|         | 4. โรคใบจุด             | จำนวน 479 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 29 ไร่                                                                                                    | - พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส เช่น คาร์เบนดาซิม อัตรา 10-20 กรัม หรืออโพรไดโอน 20-30 กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร                                                                                        |
|         | 5. โรคใบจุดสาหร่าย      | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร ระยอง และพังงา)                                                                                    | - เมื่อพบการระบาดโรคใบจุดสาหร่ายพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คอปเปอร์ออกไซด์คลอไรด์                                                                                                                                             |
|         |                         | จำนวน 353 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 4 ไร่                                                                                                     | - เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามอัตราที่ฉลากระบุ                                                                                                                               |
|         |                         | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (จันทบุรี นครศรีธรรมราช และชุมพร)                                                                                  | - เมื่อพบไรแดงหรือไรแดงแอฟริกันระบาดรุนแรงให้ใช้                                                                                                                                                                                     |
|         |                         | จำนวน 277 ไร่ การระบาดลดลง 3 ไร่                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (จันทบุรี ชุมพร นราธิวาส และตรัง)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                         | จำนวน 584 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 8 ไร่                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |

| ชนิดพืช | ศัตรูพืช                                                                                                                | สถานการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สารกำจัดแมลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ลำไย    | 1. เพลี้ยแป้ง<br>2. โรคราดำ<br>3. โรคพุ่มไม้กวาด<br>4. หนอนคืบกินใบ<br>5. โรคโรก้ามะหยี่<br>6. หนอนม้วนใบ<br>7. มวนลำไย | พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด (เชียงใหม่ จันทบุรี และสระแก้ว)<br>จำนวน 79 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด (เชียงใหม่ พะเยา จันทบุรี และสระแก้ว)<br>จำนวน 274 ไร่ <u>การระบาดเพิ่มขึ้น 5 ไร่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และสระแก้ว)<br>จำนวน 194 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 1 จังหวัด (จันทบุรี)<br>จำนวน 25 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่)<br>จำนวน 39 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (จันทบุรี และเชียงใหม่)<br>จำนวน 41 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u><br>พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี)<br>จำนวน 15 ไร่ <u>การระบาดคงที่</u> | - หากพบว่า เพลี้ยแป้งเริ่มระบาดในสวนลำไย ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไทยอน อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร หรือไพรีทรอยด์ พ่นให้ทั่ว 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน<br>- พ่นสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร อาจพ่นควบคู่กับสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ อัตรา 40-50 กรัม หรือเบนตาโซฟลูทรีน อัตรา 40-50 กรัม<br>- หมั่นสำรวจแปลงปลูกพืช หากพบกิ่งที่เป็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายนอกแปลง<br>- เขย่ากิ่งให้หนอนร่วงหล่นแล้วเก็บรวบรวมไปทำลายหรือนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และเก็บรวบรวมดักแด้ไปทำลาย<br>หากระบาดมาก ควรพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด เช่น คาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมปดาไซฮาโลทริน อัตรา 12 มล. เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร<br>- หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบมีการระบาดให้ตัดแต่งกิ่ง และยอดที่ถูกไรทำลายนำไปเผาทิ้งนอกแปลงปลูก<br>- หมั่นตรวจ ถ้าพบให้เก็บทำลาย หากระบาดรุนแรงมากควรฉีดพ่นด้วยยาโมโนโครโตฟอส ในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยไพรีทรอยด์อัตรา 10 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร<br>- ตัดส่วนที่ถูกทำลายที่มีตัวหนอนแล้วเผาไฟเสียและจับตัวแก่ที่มาเล่นไผ่กลางคืนไปทำลาย<br>- จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ไปทำลาย หากพบระบาดมากใช้ยาฆ่าแมลงพวก โมโนโครโตฟอส ฉีดพ่นในอัตรา 20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หรือยาฆ่าแมลงคาร์บาริล อัตรา 45 กรัม/น้ำ 20 ลิตร<br>- การป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในช่วงฤดูแล้งขณะที่อยู่ในดอกติดผลอ่อน การพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3 ครั้ง |

## 6. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์

โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2568

ปัจจุบันมีพื้นที่ควบคุมที่พบการเกิดโรค ทั้งหมด 14 จังหวัด 26 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ มุกดาหาร อุตรธานี และจังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัด ควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรคโดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ ทั้งนี้ พบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 1 จุด ในพื้นที่จังหวัดระยอง

พื้นที่เฝ้าระวังการเกิดโรค 103 จุด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด หนองคาย อุตรธานี น่าน กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา