



เทคนิคการปลูก และดูแลรักษาลองกอง

1. การเตรียมการก่อนปลูก

1.1 การเตรียมดิน

ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วน ระบายน้ำดีและถ่ายเทอากาศได้ดี ควรเป็นพื้นราบ น้ำไม่ท่วมขัง

1.2 การเตรียมพันธุ์

ต้นกล้าที่ปลูกควรมีอายุ 1 - 1.5 ปี และควรมีใบแก่ทั้งต้น เพราะจะทำให้ลองกองสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ต้นพันธุ์ลองกองได้จากการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ มี 2 วิธี คือ การทาบกิ่งและการเสียบกิ่ง พันธุ์ลองกอง ได้แก่ ลองกองแห้ง, ลองกองน้ำ, ลองกองปาลาแม

2. การปลูก

2.1 วิธีปลูก

2.1.1 ระยะปลูก 4 X 6 เมตรหรือ 6 X 6 เมตร หรือ 6 X 8 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ควรปลูกอยู่ในทิศเหนือหรือทิศใต้

2.1.2 จำนวนต้นต่อไร่ ประมาณ 60 ต้นต่อไร่

2.1.3 วัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีสูตร 0-3-0 ผสมกับดินเดิมก่อนปลูก

2.1.4 ขั้นตอนการปลูก

- ขุดหลุมขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร

- ใช้ปุ๋ยคอกเก่า 5 กิโลกรัม หรือประมาณ 1 ปีก และปุ๋ยหินฟอสเฟต 500 กรัม หรือประมาณ

1.5 กระป๋องนมข้น คลุกเคล้ากับดินที่ขุดขึ้นมาแล้วกลบกลับคืนไปในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม

- นำถุงต้นกล้ามากรีดกันถุงออก ถ้าพบว่ามีรากของงอกอยู่กันถุงให้ตัดออกแล้ววางตรงกลางหลุม จัดให้ตรงแนวกับด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับระดับสูงต่ำของต้นลองกอง ให้รอยต่อระหว่างรากและลำต้น หรือระดับดินปากถุงเดิมสูงกว่าระดับดินของปากหลุมเล็กน้อย ใช้มีดกรีดด้านข้างของถุง

จากกันถุงขึ้นมาจนถึงปากถุง ค่อยๆ ดึงถุงพลาสติกออกอย่างระมัดระวัง อย่าให้ดินในถุงแตก

- กลบดินที่เหลืออยู่ให้เต็มปากหลุม กดให้แน่นพอสมควร และให้พูนดินบริเวณโคนต้นให้สูงขึ้นมาเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำขัง

- หาวสตุคคุมโคน รดน้ำให้ชุ่ม ปักไม้หลักป้องกันลมพัดโยก และจัดทำร่มเงาโดยใช้ตาข่ายพลาสติกพรางแสง ทางมะพร้าว หรือทางปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

3 การดูแลรักษา

3.1 การใส่ปุ๋ย

3.1.1 ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก) ใส่ปีละ 2 ครั้ง อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี

3.1.2 ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 16-16-16 โดยใส่ปีละ 3 - 4 ครั้ง (ปริมาณที่ใช้ต่อต้นต่อปีเท่ากับอายุของพืชหารด้วย 2) แบ่งใส่ตามอายุของต้น

3.1.3 ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับใส่ปุ๋ย คือต้นและปลายฤดูฝน

3.2 การให้น้ำ

การให้น้ำปีแรกที่ปลูกควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เมื่ออายุ 2 - 3 ปี ควรให้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

3.3 การตัดแต่งทรงพุ่ม ช่อดอก และผล

การตัดแต่งทรงพุ่ม

- ลองกองหลังจากปลูก ตัดยอดเมื่อต้นสูงประมาณ 1 - 1.5 เมตร
- ตัดกิ่งที่ไม่ต้องการ รวมทั้งส่วนยอดที่สูงกว่า 1.5 เมตร ออก
- เลือกกิ่งแขนงที่แข็งแรง 4 - 6 กิ่ง กิ่งที่อยู่ต่ำสุดควรสูงจากพื้นที่ดิน 80 เซนติเมตร
- เลือกกิ่งที่ทำมุมกว้าง ตัดแต่งให้ทรงพุ่มโปร่ง และตัดกิ่งที่ทำมุมแคบกับลำต้นออก
- ตัดกิ่งยอดและกิ่งกระโดงที่แตกขึ้นมาใหม่
- กำหนดแนวทรงพุ่มให้อยู่ในกรอบของ 4 เมตร หรือแนวทรงพุ่มที่ต้องการ

การตัดแต่งช่อดอก

- ตัดแต่งช่อดอกครั้งแรกเมื่อช่อดอกยาว 3 - 5 เซนติเมตร เหลือ 1- 2 ช่อดอกต่อกลุ่มตาดอก

- ตัดแต่งระยะห่างช่อดอก 20 - 30 เซนติเมตร

อัตราช่อดอกต่อกิ่ง

- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ไว้ดอก 3 - 5 ช่อ
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ไว้ดอก 10 - 15 ช่อ
- หลังตัดแต่งช่อดอกควรให้น้ำสม่ำเสมอ



การตัดแต่งข้อผล

- ครั้งที่ 1 เมื่อผลมีอายุ 2 - 3 สัปดาห์หลังดอกบาน เลือกตัดข้อที่มีผลหลุดร่วง ผลเล็ก อยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสม
- ครั้งที่ 2 เมื่อผลมีอายุ 7 - 8 สัปดาห์
- เก็บผลที่แตกออก ผลที่โคนข้อเปื่อยเน่าเน้น กับกิ่งและผลที่ปลายข้อ 1 - 2 ผล ในระยะ 2 - 3 เดือนก่อนผลสุก



4. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

4.1 แมลงศัตรู

หนอนชอนใต้เปลือกผิว

การทำลาย อาศัยกัดกินทำลายอยู่ใต้ผิวเปลือก ต้นลองกอง

แมลงวันทอง

การทำลาย โดยตัวเมียจะใช้อวัยวะแหลม ๆ ที่แทงเข้าไปในเปลือกผลลองกองทั้งระยะ ผลอ่อนและผลแก่ หรือใต้ผิวเปลือกผลลองกองที่แตก แมลงวันทองจะวางไข่ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอน แล้วหนอนจะชอนไชกัดกินอยู่ภายในผลลองกอง ไม่ค่อยเห็นร่องรอยการทำลายจากภายนอก ถ้าเป็น กับผลอ่อนจะทำให้ผลร่วง ส่วนผลแก่จะมีหนอนอยู่ข้างใน ไม่สามารถนำมารับประทานได้

ผีเสื้อมวนหวาน

การทำลาย ตัวเต็มวัยจะใช้วงปากแทง เจาะดูดกินผลลองกองสุก มีรอยเป็นวงสีน้ำตาล มีน้ำเฝิ้มออกมา ทำให้ผลเน่าและร่วงหล่นจากต้น

เพลี้ยแป้ง

การทำลาย ดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วถ่ายมูลไว้เป็นอาหารของราดำ รวมทั้งน้ำหวานที่ผลลองกอง ปล่อยออกมาจากต่อมน้ำหวานที่ผิวเปลือกก็เป็นอาหารของราดำเช่นกัน

4.2 โรคลองกอง

โรคราสีชมพู

อาการ ยอดและกิ่งแสดงอาการเหี่ยว ใบลู่ลง ใบแห้ง ยอดแห้งตายเป็นยอด ๆ เมื่อตรวจดู ระยะใกล้พบว่ามีเชื้อราสีขาวยาวแกมชมพูเจริญรอบกิ่งที่แห้งตาย เนื้อเยื่อที่แห้งมีสีน้ำตาลและมีลักษณะ ฟาม ลอกเปลือกออกจากกิ่งได้ง่าย

โรคราดำ

อาการ ระยะแทงช่อดอกและติดผลมักมีแมลงจำพวกเพลี้ยหอยระบาด และขับถ่าย น้ำหวานลงบนข้อผลลองกองในระยะพัฒนาขนาดของผล กลุ่มเชื้อราสีดำเจริญที่บริเวณผิวผล ขั้วผลและไหลผลหรือลูกกลมทั่วทั้งผลทำให้ข้อผลไม่สวยงาม

โรคผลเน่า

อาการ ผลลองกองที่เก็บไว้นานในสภาพที่มีอากาศร้อนและชื้น แสดงการเน่าเสียบริเวณหัวผล ทำให้ผลหลุดร่วงออกจากช่อ เนื้อเยื่อเน่าที่หัวผลที่มีสีดำเมื่อทิ้งไว้นานจะแสดงอาการเน่าลุกลาม ผลฟ่อแฟบ มีเส้นใยสีเทาแกมดำของเชื้อราเจริญคลุมผล

โรคแอนแทรคโนส

อาการ ใบแก่มีจุดแห้งตายสีน้ำตาล รอบจุดมักมีสีเหลืองล้อมรอบ จุดอาจเชื่อมกันทำให้มีเนื้อเยื่อแห้งตายเป็นวงกว้าง ตรวจพบตุ่มดำ ๆ ของอะเซอวูลัสกระจายบนเนื้อเยื่อที่แห้ง

โรคตะไคร่น้ำ

อาการ ใบลองกองทั้งใบอ่อนและใบแก่ ถูกครอบคลุมโดยคราบสีเขียวของสาหร่าย บางครั้งแสดงอาการเป็นจุดมีสีต่าง ๆ กัน จุดและคราบสาหร่ายเหล่านี้จะบดบังการสังเคราะห์แสง มักพบกับใบบริเวณใบล่าง ๆ ใกล้ผิวดินที่มีความชื้นสูง

5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

5.1 เตรียมการเก็บเกี่ยว ก่อนเก็บเกี่ยวควรชิมผลที่ปลายช่อ ถ้าหากมีรสชาติหวานสามารถเก็บได้ หรือบีบปลายผลจะรู้สึกนิ่มมือ หรือนับอายุได้ 13 - 15 สัปดาห์ หลังจากดอกบาน

5.2 ตรวจสอบความอ่อนแก่

ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการเก็บ ผลลองกองแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวคือ หลังจากดอกบาน 12 - 13 สัปดาห์ (180 - 200 วัน) ระยะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม โดยหลักสำคัญ คือ ต้องเก็บเกี่ยวในวัยที่ถูกต้อง เพราะลองกองเป็นไม้ผลที่ไม่สามารถนำไปรมให้สุกได้เหมือนกับมะม่วง กัลยหรือทุเรียน การเก็บเกี่ยวที่เร็วเกินไปลองกองจะยังมีรสเปรี้ยว การเก็บเกี่ยวที่ช้าเกินไปผลจะหลุดร่วง ซึ่งลองกองในต้นเดียวกันจะสุกไม่พร้อมกัน ดังนั้นจึงควรเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะช่อที่สุกพอเหมาะเท่านั้น โดยพิจารณาดังนี้

5.2.1 สีผิวของเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีอมเหลือง และมีสีเหลืองมากขึ้นจนเหลืองนวลหมดทั้งช่อ ระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวคือหลังจากผลเริ่มเปลี่ยนสีประมาณ 15 - 25 วัน

5.2.2 กลีบเลี้ยงและก้านช่อผลเปลี่ยนจากสีเขียวสด เป็นสีน้ำตาล

5.2.3 การชิม โดยให้ชิมผลที่อยู่ปลายช่อซึ่งจะสุกกว่าตอนบนของช่อ ผลสุกจะมีรสชาติหวานหอมและเนื้อเปลี่ยนสีจากสีขาวขุ่น เป็นขาวใส

5.2.4 สังเกตการอ่อนตัวของผล โดยบีบเบา ๆ จะพบว่าผลนิ่มลง

5.3 วิธีการเก็บเกี่ยว

5.3.1 สอดกรรไกรไปในช่องระหว่างโคนช่อกับกิ่ง แล้วตัดช่อผลที่ละช่อ ถ้าผลลองกองอัดแน่นกับกิ่งควรปลิดผลบริเวณโคนช่อออกเพื่อให้เกิดช่องว่างสำหรับสอดกรรไกร

5.3.2 นำข้อผลที่เก็บเกี่ยวแล้ววางในที่ร่ม ทำการตัดแต่งข้อผลโดยปลิดเอาผลเน่า ผลที่สัตว์หรือแมลงทำลายออกจากข้อผล โดยระมัดระวังอย่างให้ข้อผลหรือผลได้รับการกระทบกระเทือน เพราะจะทำให้ผลร่วง ผลช้ำ และเน่าเสียง่าย

5.3.3 คัดแยกข้อผลที่มีขนาดและคุณภาพต่างกัน บรรจุในตะกร้าพลาสติก ผลลองกองมีอายุเก็บรักษาสั้นมาก เพราะผลจะหลุดร่วงออกจากข้อ และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลภายในเวลา 6 - 8 วัน แต่ถ้าเก็บรักษาโดยใช้แผ่นฟิล์มยืด และเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นานถึง 20 - 30 วัน

5.4 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

5.4.1 ตัดแต่งกิ่งได้แก่ กิ่งแก่ กิ่งแห้ง กิ่งที่เป็นโรค กิ่งกระโดง และข้อผล

5.4.2 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราปุ๋ยละ 2 กิโลกรัมต่อต้น ปุ๋ยคอก อัตราปุ๋ยละ 20 - 25 กิโลกรัมต่อต้น

5.4.3 ป้องกันกำจัดโรคและแมลงที่พบ เช่น ไรแดง เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนกินได้เปลือกโรคราขาว และโรคราสีชมพู

5.4.4 การให้น้ำต้องให้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง


5.4.5 การคัดคุณภาพ คัดแยกผลหรือข้อผลที่เสียหายจากการเก็บเกี่ยว หรือมีตำหนิจากโรคและแมลงแยกไว้ และนำไปใช้ประโยชน์ตามคำแนะนำ หรือแผนที่กำหนดไว้

5.4.6 การบรรจุหีบห่อ กล่องที่ใช้ควรเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ฝาสวมทับ ขนาด 24 x 42 x 30 นิ้ว สามารถบรรจุได้ 10 กิโลกรัม การบรรจุไม่ควรใส่ให้แน่นเกินไป มีกระดาษฟอยอัดระหว่างข้อผลกันการกระแทก ไม่ควรใส่ใบลองกองลงไปในกลุ่ม

5.4.7 การเก็บรักษาและการขนส่ง การเก็บรักษาให้ผลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทำได้โดยการเก็บที่อุณหภูมิ 15 และ 18 - 20 องศาเซลเซียส และขนย้ายผลิตผลลองกองจากบริเวณที่เก็บเกี่ยวไปยังโรงเรือนภายในสวนด้วยความระมัดระวังทันทีที่เก็บเกี่ยวเสร็จ

6. ข้อมูลอื่นๆ

- การเคลือบผิวจะช่วยลดการคายน้ำ ทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
- การยืดอายุการเก็บรักษาลองกองโดยการรมด้วยสาร 1-MCP ที่ระดับความเข้มข้น 500 ppb และหุ้มด้วยตาข่ายโฟมร่วมกับสารดูดซับเอทิลีน (ต่างทับทิม) แล้วเก็บรักษาในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาลองกองได้นานถึง 14 วัน กรณีจะนำไปปฏิบัติ อาจจะมีการปรับใช้สารดูดซับเอทิลีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือเพิ่มปริมาณสารดูดซับมากขึ้น ซึ่งน่าจะลดเปอร์เซ็นต์การหลุดร่วงและการสูญเสียน้ำหนักสดได้อีก เทคโนโลยีที่ชาวสวนให้การยอมรับและนำไปปฏิบัติ คือ การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การใช้ไส้เดือนฝอย การตัดแต่งข้อดอกต่อข้อผลต่อปลิดผล การใช้ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินต่อสารแคลเซียม - โบรอน และการคัดเกรดผลผลิต



ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของลองกอง

สภาพแวดล้อม	ความเหมาะสม	ข้อจำกัด
1.สภาพภูมิอากาศ		
1.1 อุณหภูมิ	ร้อนชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 20 - 35 องศาเซลเซียส	อุณหภูมิที่สูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส จะทำให้ใบแห้งหรือใบไหม้ เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องอาศัยร่วมเงาในการเจริญเติบโต
1.2 ความชื้นสัมพัทธ์	มีความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูงประมาณ 70 - 80 %	ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำจะทำให้ใบแห้ง ใบร่วงและมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งการติดดอกออกผล
1.3 ความเข้มของแสง	- ควรปลูกแซมกับพืชอื่นๆ เพื่ออาศัยร่วมเงา เช่น มะพร้าว หมาก ปาล์มน้ำมัน สะตอ ยางพารา ฯลฯ - ต้นกล้าลองกองต้องการร่วมเงาประมาณ 80 - 90 % และเมื่ออายุ 6 เดือนต้องการร่วมเงา 50 - 60 % และความต้องการร่วมเงาจะลดลงเรื่อยๆ ตามอายุของต้น	- หากปลูกลองกองในสภาพที่มีแสงแดดจัด ความเข้มของแสงจะทำให้ต้นกล้าลองกองใบไหม้ ทรงพุ่มทึบ ข้อและปล้องสั้น ใบมีขนาดเล็ก ต้นเจริญเติบโตช้า มีการแตกยอดมาก และเป็นกระจุก - ไม่ควรปลูกลองกองร่วมกับทุเรียนเนื่องจากความต้องการปริมาณน้ำแตกต่างกัน
1.4 ฝน	- ปริมาณน้ำฝนประมาณ 2,000 - 3,000 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันที่ฝนตกประมาณ 150 - 200 วันต่อปี - ควรมีฝนตกกระจายอย่างสม่ำเสมอยกเว้นช่วงก่อนออกดอก 1 - 2 เดือน - มีน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง	- ลองกองทนสภาพน้ำท่วมขังได้ไม่เกิน 5 - 7 วัน - ลองกองทนสภาพความแห้งแล้งได้เกิน 2 สัปดาห์ - ช่วงที่ต้องการปริมาณน้ำอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ - ช่วงการพัฒนาของตาดอกและผล หากขาดน้ำในช่วงยี่ดาดอกจะทำให้ข้อดอกสั้นกว่าปกติ และผลอ่อนหลุดร่วง - ช่วงการพัฒนาของผลในระยะแรกช่วงที่ผลมีอายุ 7 - 10 สัปดาห์จะทำให้ข้อผล และผลชะงักการเจริญเติบโต - ช่วงวิกฤติมากคือ ช่วงผิวผลกำลังเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นเหลือง หากมีฝนตกหรือได้รับน้ำอย่างกะทันหัน จะทำให้เปลือกผลแตกทั้งต้น หรือทั้งสวน

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของลองกอง (ต่อ)

สภาพแวดล้อม	ความเหมาะสม	ข้อจำกัด
1.5 ลม	ควรปลูกแซมกับพืชอื่น เพื่อช่วยให้ลองกองได้รับร่มเงาและช่วยบังลมให้กับต้นลองกอง	ไม่ควรปลูกลองกองในพื้นที่ที่มีลมพัดผ่านอย่างรุนแรง เพราะลมจะพัดพาความชื้นจากสวนไปยังที่อื่น
2. สภาพพื้นที่		
2.1 ความสูงจากระดับน้ำทะเล	น้อยกว่า 650 เมตร	ไม่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเนื่องจากเป็นพืชระบบรากตื้น
2.2 ความลาดชันของพื้นที่	พื้นที่ราบหรือพื้นที่ที่มีความลาดเอียงประมาณ 1 - 15 %	พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมากไม่เหมาะที่จะทำสวนลองกอง นอกจากปัญหาการชะล้างและพังทลายของดินแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติดูแลรักษา
3. สภาพดิน		
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน	เป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูง มีการระบายน้ำดี	ดินควรมีการระบายน้ำดี หากมีน้ำท่วมขังมากจะทำให้รากขาดอากาศสำหรับใช้ในการหายใจ
3.2 ความเป็นกรด-ด่างของดิน	อยู่ระหว่าง 5.5 – 6.5	ถ้า pH สูงหรือต่ำเกินไป จะทำให้ธาตุอาหารพืชในดินอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

1. การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างทรงพุ่มให้โค้งมนกว้าง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการผลผลิต

- ใช้วิธีตัดกิ่งให้มนกว้าง โดยการดึงเชือกขณะต้นลงกองยังเล็กอยู่
- ตัดแต่งกิ่งกระโดงออกให้หมด เน้นการไว้กิ่งด้านข้าง
- ควรตัดยอดเพื่อควบคุมทรงพุ่มไม่ให้สูง

2. การปักต้นและเตรียมความพร้อมเพื่อการออกดอก

- หลังเก็บเกี่ยวผลแล้ว ต้องตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยสูตร 16-16-16 เพื่อแตกใบอ่อนก่อนช่วงฤดูฝนให้ใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอก
- หยุดการให้น้ำจนใบสลด
- แล้วจึงให้น้ำเต็มที่เพื่อให้ออกดอกชุดใหม่

3. การตัดแต่งช่อดอก

- ลองกองจะออกดอกเป็นกระจุก และออกมากในแต่ละกิ่งให้ตัดแต่งช่อ เหลือเป็นกลุ่มกลุ่มละ 1 - 2 ช่อ แต่ละกลุ่มห่างกัน 25 - 30 เซนติเมตร กิ่งเล็กควรไว้ ให้เหมาะสมกับขนาดกิ่ง

4. การห่อผล จะทำให้ลองกองเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและส่งออก

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการเกษตร.2547.คู่มือพืชเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.2555. 52 สัปดาห์รู้แล้วรวย. กรุงเทพฯ

เคหการเกษตร. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลองกอง. <http://www.kehakaset.com/index.php/79-information/238-2011-04-25-03-18-12>. ค้นหาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556