



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com

แจ้งเตือนพืชที่เกิดผลกระทบ ช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
มีฝนตกอากาศ เริ่มเย็นลง	เบญจมาศ	ทุกระยะการ เจริญเติบโต	โรคใบจุด (เชื้อรา Septoria chrysanthemella Septoria obesa)	อาการเริ่มแรกพบจุด สีน้ำตาลขนาดเล็ก บนใบต่อมาแผลขยาย ใหญ่ขึ้นรูปร่างค่อนข้าง กลมมีสีน้ำตาลเข้ม บางครั้งขอบแผลมี สีเหลืองบริเวณแผลพบ ส่วนของเชื้อราเป็นจุด สีดำเล็กๆ เกิดกระจาย ทั่วแผลหากอาการ รุนแรงแผลจะลาม ขยายติดกันทำให้ ใบไหม้และร่วงหล่น อาการของโรคจะเกิด กับใบล่างๆก่อน ถ้าโรค ระบาดรุนแรงจะลุกลาม ถึงใบยอดทำให้ใบไหม้ ทั้งต้น	๑. ใช้กิ่งพันธุ์ที่ปลอดโรค ๒. ใช้ระยะปลูกที่ เหมาะสมไม่ควรปลูกต้น เบญจมาศชิดกันเกินไป เพื่อลดการระบาดของ โรค ๓. กำจัดวัชพืชในแปลง ปลูก ๔. ตัดแต่งใบแก่ออก เพื่อให้ต้นโปร่งอากาศ ถ่ายเทสะดวก ๕. ตรวจแปลงปลูก สม่ำเสมอเมื่อพบเบญจมาศ เริ่มแสดงอาการของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรค และ เก็บใบเป็นโรคที่ร่วงหล่น ไปทำลายนอกแปลงปลูก หากโรคยังคงระบาดพ่น ด้วยสารไดฟิโนโคนาโซล ๒๕% อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ โพรพิโคนาโซล ๒๕% อีซีอัตรา ๑๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ คลอโรทาโลนิล ๕๐% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร โดยพ่น ทุก ๗ วัน

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					๖. แปลงที่เกิดโรคระบาด ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำ แบบพ่นฝอย ๗. หลังจากหมดฤดูปลูก ควรทำความสะอาดแปลง ปลูกโดยเก็บเศษซากพืช ไปทำลาย ๘. พื้นที่ที่เกิดโรคระบาด ควรปลูกพืชชนิดอื่น หมุนเวียน
	ฝรั่ง	ติดผลและ พัฒนาผล	แมลงวันผลไม้	ตัวเต็มวัยเพศเมีย วางไข่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒-๓ ฟองในผลฝรั่งเล็ก จากผิวประมาณ ๒-๕ มิลลิเมตร หลังจากฝรั่ง ติดผลแล้ว ๙ สัปดาห์ ระยะหนอนทำลายพืช โดยการขบไชกินเนื้อ อยู่ภายในผล ทำให้ ผล เน่าและร่วง	๑. ต้องรักษาความสะอาด ในแปลงปลูก โดยเก็บผล ที่ถูกแมลงวันผลไม้เข้า ทำลายหรือผลที่เน่าออก จากแปลงปลูก นำไปฝังกลบให้มีระดับ หน้าดินหนา ๑๕ เซนติเมตร เพื่อลดการสะสมและ ขยายพันธุ์ของแมลงวัน ผลไม้ในแปลงปลูก ๒. ควรทำการตัดแต่งกิ่ง ให้โปร่ง เพื่อลดการเกิด ร่มเงาในทรงพุ่มทำให้ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ต่อการแพร่ระบาดของ แมลงวันผลไม้และให้ศัตรู ธรรมชาติมีบทบาทใน การทำลายแมลงวันผลไม้ ได้มากขึ้น
	พริก	เก็บเกี่ยว	แมลงวันผลไม้	ตัวเต็มวัยวางไข่ใน ระยะพริกใกล้เปลี่ยนสี ไปจนกระทั่งผลสุก หนอนกัดกินขบไชอยู่ ภายในผลทำให้ผลพริก เน่าร่วงหล่นเมื่อหนอน	๑. ทำความสะอาดแปลง ปลูกโดยการเก็บพริกที่ ร่วงหล่นเผาทำลายเพื่อ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ของ แมลงวันผลไม้ ๒. ใช้น้ำมันปิโตรเลียม

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
				โตเต็มที่จะเจาะออกมา เข้าดักแด้นดิน	สเปรย์ออยล์ ๘๓.๙%อีซี อัตรา ๖๐มิลลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตรเน้นพ่นที่ผล พริกทุก ๕-๗ วัน ในกรณี พื้นที่ที่พบการระบาดของ เป็นประจำพ่นครั้งแรก เมื่อพริกเริ่มติดผล หยุด พ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ๕-๗ วัน
ฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักบาง พื้นที่	ปาล์ม น้ำมัน	ทุกระยะการ เจริญเติบโต	หนอนหน้าแมว	ตัวหนอนหน้าแมวจะ กัดเข้าทำลายใบปาล์ม น้ำมันตัวหนอนวัยเล็ก จะกัดกินผิวใบ เมื่อตัว หนอนโตขึ้นจะกัดกิน จนใบขาด ถ้าระบาด รุนแรงใบจะถูกกัดจน เหลือแต่ก้านใบทำให้ ผลผลิตลดลงต้นชะงัก การเจริญเติบโต และ ใช้เวลานานกว่าที่ต้น จะฟื้นตัว ถ้าเกิดการ ระบาดในแต่ละครั้งจะ ใช้เวลาในการกำจัดนาน เนื่องจากหนอนหน้า แมวมีหลายระยะใน เวลาเดียวกันเช่นระยะ หนอนและระยะดักแด้ ทำให้ไม่สามารถกำจัด ให้หมดในเวลาเดียวกัน ได้	๑. การใช้วิธีกล ๑.๑ ตัดใบย่อยที่มี หนอนหน้าแมวหรือจับ ผีเสื้อ ซึ่งเกาะนิ่งในเวลา กลางวันตามใต้ทางใบ ปาล์มน้ำมัน หรือเก็บ ดักแด้ตามใบและซอก โคนทางใบรอบต้นมา ทำลาย ๑.๒ ใช้กับดักแสงไฟ โดยใช้แสงไฟ black light หรือหลอดนีออน ธรรมดาวางบนกะละมัง พลาสติกซึ่งบรรจุน้ำผสม ผงซักฟอกให้หลอดไฟอยู่ เหนือน้ำประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร วางล่อผีเสื้อ ช่วงเวลา๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ซึ่งสามารถช่วยกำจัดกา ขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไปได้ ๒. การใช้ชีววิธีพ่น แบคทีเรียบาซิลลัส ทูริง เอนซิสเช่น แบคโทสปิน ดับบลิวพี อัตรา ๓๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ซึ่งเชื้อ แบคทีเรียนี้สามารถทำลาย

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					กลุ่มหนอนผีเสื้อทำลาย ปาล์มน้ำมัน และไม่เป็น อันตรายต่อแมลงที่มี ประโยชน์ ๓. การใช้สารเคมีเริ่มพ่น สารฆ่าแมลงเมื่อพบ หนอนเข้าทำลายบริเวณ ผิวใบเฉลี่ย ๒๐ ตัวต่อ ทางใบสารฆ่าแมลงที่ใช้ คือคาร์บาริล ๘๕% ดับเบิ้ลยูพีอัตรา ๑๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ๒.๕% อีซีอัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ๔. การใช้วิธีผสมผสาน ๔.๑ การใช้กับดักแสง ไฟล่อผีเสื้อในช่วงที่ ดักด้กำลังออกเป็น ผีเสื้อ สลับกับการใช้สาร ฆ่าแมลงหรือเชื้อแบคทีเรีย ในช่วงเป็นหนอนวัยเล็ก ๔.๒ การใช้เชื้อ แบคทีเรียสลับกับการใช้ สารฆ่าแมลง

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์