



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com

แจ้งเตือนพืชที่เกิดผลกระทบ ช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกต ลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
ฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนัก บางพื้นที่	สตอร์วเบอร์รี่	ทุกระยะการ เจริญเติบโต	โรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)	<u>อาการบนก้าน ใบและลำต้น</u> พบแผลสีม่วง แดงขนาดเล็ก ขยายลุกลามไป ตามความยาว ของก้านใบและ ลำต้น ต่อมา เปลี่ยนเป็นแผล สีน้ำตาลเนื้อเยื่อ บริเวณแผลแห้ง ทำให้เกิดรอย คอดหากอาการ รุนแรงต้นจะ เหี่ยว และตาย ในที่สุด <u>อาการบนไหล</u> พบแผลสีม่วง แดงขนาดเล็ก ขยายลุกลามไป ตามความยาว ของสายไหลและ เปลี่ยนเป็นแผล สีน้ำตาลในเวลา ต่อมาทำให้เกิด รอยคอดของ ไหลบริเวณที่ เป็นแผล	๑. ตรวจสอบแปลงปลูก สม่ำเสมอเมื่อพบโรคตัด ส่วนที่เป็นโรคนำไป ทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกัน กำจัดโรคพืช ฟลูโอ ไพแรม + ไตรฟลอกซีส โตรบิน ๒๕% + ๒๕% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ฟลูโอไพแรม+ทีบูโคนา โซล ๒๐% + ๒๐% เอสซีอัตรา ๑๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๕ วัน ๒. แปลงที่พบการ ระบาดของโรค หลังจาก เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้ เก็บซากพืชไปทำลาย นอกแปลงปลูก ๓. ใช้ส่วนขยายพันธุ์จาก แหล่งปลูกที่ไม่มีการ ระบาดของโรค และส่วน ขยายพันธุ์ไม่มีการ ของโรค

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกต ลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
				<u>อาการบนผล</u> ผลมีลักษณะ ฉ่ำน้ำเป็นสี น้ำตาลเข้ม เนื้อเยื่อรอบ ขอบผลเปลี่ยน เป็นสีซีดผลยุบ ตัวลงเมื่ออาการ รุนแรงมากขึ้น จะขยายใหญ่ และทำให้ผล เน่าในสภาพที่มี อากาศชื้นอาจ พบกลุ่มสปอร์ สีส้มของเชื้อรา สาเหตุโรคที่ บริเวณผล	
	กาแฟอาราบิก้า	ติดผล – เก็บเกี่ยว	โรคแอนแทรคโนส หรือโรคใบไหม้ สีน้ำตาลหรือ โรคกิ่งแห้งหรือโรค ผลแห้ง (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum coffeanum)	<u>อาการที่ใบ:</u> พบได้ทั้งใบอ่อน และใบแก่ ลักษณะเป็นจุด สีน้ำตาลเมื่อ อาการรุนแรง ผลจะขยาย ขนาดเป็นแผล ใหญ่ ทำให้ใบ แห้งไหม้ทั้งใบ <u>อาการที่กิ่ง:</u> เกิดอาการไหม้ บนกิ่งเขียว ทำให้ใบเหลือง และร่วงกิ่งเหี่ยว และแห้งทั้งกิ่ง <u>อาการที่ผล:</u> พบได้ทั้งผลอ่อน	๑. ควรรักษาระดับร่มเงา ให้เหมาะสมเพื่อรักษา ระดับความชื้น เป็นการ ป้องกันการเกิดโรค ๒. หมั่นตรวจแปลงปลูก อย่างสม่ำเสมอเก็บผลตัด แต่งกิ่ง ใบ และดอกที่ เป็นโรคนำไปทำลาย นอกแปลงปลูก ๓. เมื่อพบโรคเริ่มระบาด ที่ใบ กิ่ง ดอก และผล อ่อนพ่นด้วยสารป้องกัน กำจัดโรคพืช เบโนมิล ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือแมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ควร

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกต ลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
				และ ผล แก่ เริ่มแรกผลเป็น จุดสีน้ำตาลเข้ม เมื่อ อ า ก า ร รุนแรงขึ้นจุดจะ ขยายรวมกัน เป็นแผลรูปร่าง ไม่แน่นอน และ เนื้อเยื่อของแผล ยุบตัวผลที่เป็น โรคจะหยุดการ เจริญ เ ป ลี ย น เป็นสีดำแต่ผล ยังคงติดอยู่บน กิ่งกาแฟ	หยุดพ่นสารเมื่อผลเริ่ม แก่จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ๔. ในระยะติดผลควร หมั่นสำรวจและป้องกัน กำจัดมอดเจาะผลกาแฟ อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก มอดเจาะผลจะทำให้ผล เกิดบาดแผลเป็นช่องทาง ให้เชื้อราเข้าทำลายผลได้ มากขึ้น ๕. หลังเก็บเกี่ยวผล กาแฟควรตัดแต่งกิ่งและ ให้ปุ๋ยบำรุงต้น เพื่อให้ต้น กาแฟมีความแข็งแรง
	ลำไย	การเจริญ เติบโต ทางใบ- พัฒนาผล	โรคใบจุดดำ (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)	อาการเริ่มแรก บนใบ แก่ พ บ แผลจุดกลม สีน้ำตาลอ่อนมี ขอบสีเหลือง ล้อมรอบ ต่อมา แผลเปลี่ยนเป็น สีน้ำตาลเข้มถึง ดำ หากอาการ รุนแรงแผลจะ ขยายติดกันเป็น แผลขนาดใหญ่ ทำให้บิดเบี้ยว ผิดรูป แผลอาจ ขาดเป็นรูหาก สภาพแวดล้อม เหมาะสมมี ความชื้นสูงโรค จะระบาดลุกลาม ไปที่ใบเพสลาด	๑. หมั่นตรวจแปลงปลูก อย่างสม่ำเสมอเมื่อพบ อาการของโรคที่ใบแก่ ตัดแต่งและเก็บส่วนที่ เป็นโรคนำไปทำลาย นอกแปลงปลูก เพื่อลด ปริมาณเชื้อสาเหตุโรค ๒. หากพบเริ่มมีอาการ ของโรคที่ใบเพสลาดและ ใบอ่อน ให้ตัดแต่งส่วนที่ เป็นโรคนำไปทำลาย นอกแปลงปลูก แล้วพ่น ด้วยสารป้องกันกำจัด โรคพืชเช่น อะซอกซิส โตรบิน ๒๕% เอสซี อัตรา ๕-๑๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศ ที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืช ที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืช ในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกต ลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/ แก้ไข
				และใบอ่อนใบ จะหลุดร่วงใน ที่สุด	โพรคลอราซ ๔๕% อีซี อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อ น้ำ ๒๐ ลิตรพ่นทุก ๗-๑๐ วัน ๓. กำจัดวัชพืชรอบโคน ต้นเพื่อลดความชื้นสะสม ๔. ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่า ไนโตรเจนมากเกินไป เพราะจะทำให้พืชอ่อนแอ ต่อการเกิดโรค ๕. หลังการเก็บเกี่ยว ผลผลิต ควรตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่มีใบเป็น โรคและเก็บส่วนที่เป็น โรคนำไปทำลายนอก แปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็น แหล่งสะสมของโรคใน ฤดูกาลผลิตต่อไป

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์