

เดือนกิจกรรมเกษตร  
ช่วงวันที่ 20 สิงหาคม – 2 กันยายน 2568

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ พืชในช่วงนี้	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
อากาศร้อน มีฝนตก และ ฝนตกหนักบางทีน้ำ	1. พืชตระกูลเดง (เข่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ชูภานี ฟิกหอง ฟิกเชีย ฟิกแมว มะระจีน และนาน)	ทุกระยะ การเจริญเติบโต	1. เพลี้ยไฟฝ้าย	ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยใช้ปากที่เป็นแห้ง (stylet) เขี่ยเนื้อเยื่อพืชให้เข้า แล้วดูดน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืช ทำให้บริเวณใบที่ถูกทำลายมีรอยแผลสีน้ำตาล ในแห้ง การทำลายของเพลี้ยไฟต่อส่วนเจริญของพืช ทำให้ยอด ดอก ตາอ่อน ไม่เจริญเติบโต หากเป็นระยะพืชขาดน้ำแล้วไม่ทำการแก้ไข ป้องกันกำจัด จะทำให้พืชตายได้	พ่นสารเคมีลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด เช่น สไปโรไน 12% SC อัตรา 15 - 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 30 - 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโนรินิล 5% SC อัตรา 40 - 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีนาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรเมซิเทน 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อมิตาโคลพริด 70% WG อัตรา 10 - 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟีนาเทอร์ 10% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 30 ลิตร  **** พ่นสารเมือพับเพลี้ยไฟหากกว่า 5 ตัวต่ออต พ่นซ้ำตามความจำเป็น ควรพ่นสารแบบสลับ ก่อนสารตามกลไกการออกฤทธิ์ ทุกรอบ 14 วัน โดยพ่นสารแต่ละกลุ่มไม่เกิน 3 ครั้งต่อรอบ

ส่วนงานส้อม/สภาก อาชญากรรมที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพิษที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พิษในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
			2. ด้วงเต่าแตงแดง	จะทำลายยอดโดยแทรกกินใบ หากการ ระบายน้ำแรง อาจทำให้ต้นพิษตระกรุแตก จะจักการหอดยอดได้ มักพบรอบในแปลง ที่มีรัชพืชหนาแน่น ทั้งนี้เพราตัวอ่อนอาศัย กัดกินรากพิษ จึงมักเป็นปัญหาในแหล่งปลูก พิษตระกรุแตกใหม่บริเวณรอบ ๆ ที่ไม่มีการ ไถพรวนและปราบวัชพืชเพียงพอ พบระบายน แทบทุกฤดู โดยเฉพาะในช่วงที่พิษเริ่มแตกใบจริง	1. วิธีกล การจับทำลายด้วยมือจะช่วยลดการ ระบาดได้ โดยหมั่นดูแลในเวลาเข้า (แคดยังไม่จัด) และภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ควรถอนทำลายต้นทิ้ง เพื่อมิให้เป็นแหล่งสะสม ของด้วงเต่าแตงแดงต่อไป 2. ใช้สารเฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น การบาริล 85% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โลเลฟานไพรอล 16% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ใจแอนหารานิลิโพรล 10% OD อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทิฟูแรน 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อ น้ำ 20 ลิตรหรือ แคมป์ดา-ไฮยาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อินคอกราชาร์คาร์บ 15% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ พิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
2. มะเขือเปรاء	ทุกระยะ การเจริญเติบโต	1. แมลงหัวเขายาสูบ	ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเสียงบริเวณใบ และเป็นพาหนะนำเชื้อไวรัสสาเหตุ โรคใบเหลือง มะเขือ ทำให้ผลผลิตลดลง		1. ก่อนการย้ายปลูก  roggin หลุมปลูกด้วย สารฆ่าแมลง ไดโนทิฟูแรน 1% G อัตรา 2 กรัมต่อลุ่ม สามารถควบคุมการเข้าทำลาย ของแมลงหัวเขายาได้ประมาณ 45 วัน (เมื่อใส่

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตหลักๆขณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					<p>สารลงในหลุ่มแล้วให้รอยดินกลับสารบาง ๆ ก่อนทำการย้ายกล้างหลุ่ม เพื่อป้องกันรากรพิช สัมผัสสารโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเป็นพิษ ต่อพืชได้)</p> <p>2. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น บูโพรเพชิน 40% SC อัตรา 25 มิลลิลิตร/ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ พลองนิกามิค 50% WG อัตรา 20 กรัม/ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรเตรียม 15% OD อัตรา 20 มิลลิลิตร/ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไอกอนทรานิลิโพรส 10% OD อัตรา 30 มิลลิลิตร/ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไบเพนทริน 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 15 กรัม/ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ น้ำมันปีโตรเลียม เช่น ไวต์อยล์ 67% EC อัตรา 100 มิลลิลิตร/ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นสารทุก 5 วัน 2 - 3 ครั้ง ติดต่อกัน เมื่อพบรากโรค</p>
		2. โรคใบหนักเหลือง มะเขือ (เชื้อไวรัส Tomato)	ใบยอดและใบอ่อนทวยย่นหักมีสีเหลือง ขอบใบมีน้ำเงางาม ในมีอาการดำงึมสีเขียวเข้มสลับ เขียวอ่อนหรือเหลือง ใบที่แตกใหม่มีขนาดเล็ก		<p>1. ใช้พันธุ์ต้านทานโรค</p> <p>2. คัดเลือกกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและไม่เป็นโรค มาปลูก</p>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
			<i>yellow leaf curl virus (TYLCV)</i>	ต้นแครรอตกรีน ทำให้มะเขือไม่ติดผลหรือติดผลน้อยมาก ผลจะบิดเบี้ยว และมีขนาดเล็กผิดปกติ	<p>3. หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกเพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะ เช่น สาบแร้งสาบกาก กะเบ็ง หญ้ายาง กระแทรก คำโพง โหนงเหง แลซึ้กากขาว</p> <p>4. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นที่แสดงอาการของโรคให้ถอนและนำไปทำการเผาไหม้ หรือฝังต้นนอกแปลงทันที</p> <p>5. เชือไวรัสสาเหตุโรคพืช ยังไม่มีสารป้องกันกำจัดโดยตรง แต่ป้องกันการระบาดของโรคได้โดยพ่นสารฆ่าแมลงหัวขวยยาสูบซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่น บูโรเฟชิน 40% SC อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟลอกนิคามิค 50% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สเปโรเตรียม 15% OD อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไชแอนทรานิสโซพรอล 10% OD อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไบเพนทริน 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทิฟูแรน 10% WP อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ น้ำมันปีโตรเลียม เช่น ไวต์օอยล์ 67% EC อัตรา 100</p>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
	บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม (ฯลฯ)			<p>เจริญเติบโต</p> <p><u>อาการระยะต้นโรค</u> มักพบบ่นใบและก้านใบ เกิดเป็นแพลงคุดเล็ก ๆ สีเหลือง ต่อมาก็จะ ขยายใหญ่เมื่อสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ลักษณะเป็นวง ค่อนข้างกลม เรียงช้อนกันเป็นชั้น ๆ ในกะหลាปลี ถ้าเกิดโรคหลังจากห่อหัวแล้ว และสภาพอากาศมีความชื้นสูง จะเกิดอาการ เน่าอย่างรุนแรงทั้งหัว ในกะหลาดออก และ บรอกโคลี ถ้าเกิดอาการที่ตอๆ กัน จะทำให้เกิด แพลงคุดน้ำตาล โดยเริ่มจากช่องตอๆ ที่อยู่ด้านนอก ตามเข้ามาด้านใน หากเป็นโรครุนแรงจะถูก ทำลายทั้งตอๆ</p> <p>**** เชือสาเหตุโรคสามารถติดเมล็ด ทำให้ เมล็ดสูญเสียความชื้น หรืออาจแห้งตัวใน เมล็ดพันธุ์ทำให้เกิดการระบาดของโรค เมื่อ นำไปปลูกในฤดูตัดไป</p>	<p>แสงแดดส่องผ่านได้และมีการระบายน้ำอากาศที่ดี</p> <p>4. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรค ในระยะกล้า ควรถอนต้นกล้าที่เป็นโรค นำไป ทำลายนอกแปลงปลูก หากพบโรคในระยะ ต้นๆ ควรตัดใบที่เป็นโรคออก นำไปทำลาย นอกแปลงปลูก และพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ไอโพร์ไดโอน 50% WP อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซอกซิสโตรบิน 25% SC อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์โรไฮโลนิล 50% SC อัตรา 20 - 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5 - 7 วัน</p> <p>5. ถ้าพบโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชอื่นที่ ไม่ใช่พืชผักตระกูลกะหลាและผักกาด สลับ หมุนเวียนอย่างน้อย 3 ปี</p>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					<p>มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร</p> <p>6. ไม่ปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคได้แก่ พืชตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูลมะเขือพิริย ขี้นช่าย ยาสูบ ฯ กำเพราชา ตำลึง หงอนไก่ บานไม้รุ้วเรีย และทานตะวัน เป็นต้น ใกล้แหล่งปลูกมะเขือ</p> <p>7. แปลงที่พับการระบาดของโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืชไปทำลายนอกแปลงปลูก และไม่ปลูกมะเขือข้า ควรปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค</p>
3. กระเจี๊ยบเชียวยาสูบ	ทุกระยะ การเจริญเติบโต	แมลงหวัดข่าวายาสูบ	ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบและเป็นพาหนะนำโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส	ใช้สารเคมีแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด เม่น บูโรเทชิน 25% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพрид 10% SL อัตรา 20 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพับการระบาด	
4. พืชตระกูลกะหลា แซง กากกาก (เช่น กะน้ำ กระหลាปปี กระหลาดอก)	ทุกระยะ การเจริญเติบโต	1. โรคใบจุด (เชื้อร่า <i>Altemaria brassicicola</i> และ <i>A. brassicae</i> )	โรคเกิดได้ทุกส่วนและทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช อาการระยะต้นกล้า เกิดแพลสีก ฯ สีน้ำตาลเข้มที่ลำต้น จากนั้นแผลจะขยายใหญ่ อาการคล้ายโรคเน่าอดิน ทำให้ต้นกล้าหงิกงักการ	<p>1. ใช้เม็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค ไม่นำเม็ดพันธุ์จากแปลงที่มีการระบาดของโรคงามปลูก</p> <p>2. แห้งเม็ดในน้ำอุ่นประมาณ 50 องศาเซลเซียสนาน 20 - 25 นาที ก่อนปลูก</p> <p>3. ไม่ปลูกพืชระยะชิดกันจนเกินไป ควรให้มี</p>	

สภาวะแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
			2. โรคเน่า烂 (เชื้อแบคทีเรีย <i>Pectobacterium</i> <i>carotovorum</i> subsp. <i>carotovorum</i> )	<p>อาการเริ่มแรก แหล่งเล็กน้อยเป็นจุดฉี่น้ำเล็ก ๆ บนใบหรือบริเวณลำต้น ต่อมาแผลจะขยายลุกตามมีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม เนื้อเยื่อพืชบริเวณแผลจะยุบตัวลง มีเมือกเย็นออกมานะ และมีกลิ่นเหม็นเฉพาะของโรคนี้ หลังจากนั้นพืชจะเน่า爛ตามไปทั้งต้น</p> <p>**** โรคนี้พบรูบากมากในฤดูฝน เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคสามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของพืช ทั้งที่อยู่ในแปลงปลูกและในโรงเก็บ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควรเลือกพืชที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และมีการระบายน้ำที่ดี</li> <li>2. ก่อนปลูกพืชควรไถพรวนดินให้ลึกมากกว่า 20 เซนติเมตรจากผิวดิน และหากดินไว้งานกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินลงได้มาก</li> <li>3. ไม่ควรปลูกพืชใหม่เกินไป เพื่อไม่ให้มีความชื้นสูง เป็นการลดการระบาดของโรค</li> <li>4. ระดับชื้นในดินให้ส่วนต่าง ๆ ของพืชเกิดแผลเป็นช่องทางให้เชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายพืช</li> <li>5. ควรดูแลไม่ให้พืชขาดธาตุแร่เช่น และIRON เพราะจะทำให้พืชเกิดแผลจากการปลายใบไหม้และสักครวง ทำให้เชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายได้ง่าย</li> <li>6. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก</li> <li>7. ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรหลังใช้กับต้นที่เป็นโรค</li> <li>8. หลังการเก็บเกี่ยว ควรถอกอบแห้งพืชผัก</li> </ol>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตอักษะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					ทันที และหากดินไดร์รี่จะหนึ่งแล้วไอกลับอีกรึ เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 9. แปลงที่มีการระบาดของโรค ควรปลูกพืช ชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพด เป็นต้น
5. พริก	ทุกระยะ การเจริญเติบโต	1. โรคใบจุดตามบ (เพี้ี้ยรา <i>Cercospora capsici</i> )	อาการของโรคมักพบบนใบที่อยู่บริเวณ ด้านล่างของต้นก่อน แล้วขยายลุกลามไปยัง ใบที่อยู่ด้านบน อาการเริ่มแรกพบจุดเล็ก ๆ สี น้ำตาลค่อนข้างกลม ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น กลางแผลมีสีขาวหรือสีขาวอมเทา ขอบแผลสี น้ำตาลเข้ม บางครั้งพบแผลมีสีเหลืองล้อมรอบ ถ้าโรคระบาดรุนแรง จะเกิดแผลจำนวนมาก และขยายหรือลามติดกันเป็นแผลใหญ่ ใบเหลือง หลุดร่วงก่อนกำหนด ต้นจะหงอม ชักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง นอกจากนี้อาจพบอาการของโรคได้บนกิ่ง และก้านผล	อาการของโรคมักพบบนใบที่อยู่บริเวณ ด้านล่างของต้นก่อน แล้วขยายลุกลามไปยัง ใบที่อยู่ด้านบน อาการเริ่มแรกพบจุดเล็ก ๆ สี น้ำตาลค่อนข้างกลม ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น กลางแผลมีสีขาวหรือสีขาวอมเทา ขอบแผลสี น้ำตาลเข้ม บางครั้งพบแผลมีสีเหลืองล้อมรอบ ถ้าโรคระบาดรุนแรง จะเกิดแผลจำนวนมาก และขยายหรือลามติดกันเป็นแผลใหญ่ ใบเหลือง หลุดร่วงก่อนกำหนด ต้นจะหงอม ชักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง นอกจากนี้อาจพบอาการของโรคได้บนกิ่ง และก้านผล	1. จัดระยะปลูกพريحให้เหมาะสม ไม่ควรปลูก ชิดกันเกินไป เพื่อลดความชื้นในทรายพุ่ม 2. กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อให้อากาศ ถ่ายเทสะดวก เป็นการลดความชื้น ทำให้ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค 3. หลีกเลี่ยงการให้น้ำช่วงเวลาเย็น 4. หมั่นตรวจสอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบ อาการของโรค ตัดส่วนที่เป็นโรค และเก็บใบ ที่ร่วงหล่นไปทราย หรือฝังดินนอกแปลงปลูก ไม่ทิ้งไว้ในบริเวณหรือข้างแปลง เพื่อลดปริมาณ เชื้อสาเหตุโรค และพ่นด้วยสารป้องกันกำจัด โรคพืช แม่นโคเซบ 80% WP อัตรา 40 – 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เบโนมิล 50% WP อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5 - 7 วัน

อาการแผลส้อน/อาการ อาการที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
			2. โรคเหี่ยวเชียวน้ำ (เชื้อแบคทีเรีย <i>Ralstonia solanacearum</i> )	พบต้นพริกแสดงอาการของโรคเป็นหย่อน ๆ กระจายทั่วไปในแปลงปลูก ลักษณะอาการเริ่มแรกต้นพริกแสดงอาการเหี่ยวในเวลากลางวันที่อากาศร้อนจัด และพื้นกลับบ้านปกติในเวลากลางคืนซึ่งมีอากาศเย็น โดยแสดงอาการในลักษณะนี้สลับกัน 2 - 3 วัน จนก้นต้นพริกจะเหี่ยวหักต้นอย่างถาวรและตายในที่สุด โดยที่ต้นพริกยังคงเหี่ยวอยู่ ให้สังเกตบริเวณโคนต้นจะมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อถอนต้นขึ้นมาจะพบอาการรากเน่า ถ้าตัดลำต้นตามยาวจะพบส่วนของหัวรากเสียงน้ำและอาหารมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อนำไปแข็งน้ำสะอาดประมาณ 5 - 10 นาที จะเห็นของเหลวสีขาวข้นคล้ายน้ำนม [bacterial exudate (ooze)] ในตลอดมา	<ol style="list-style-type: none"> <li>ควรเลือกพืชที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคมาก่อน และมีการระบายน้ำที่ดี</li> <li>ไประวนดินให้ลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร จากผิวดินและตากดินไวนานกว่า 2 สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินลงได้มาก</li> <li>พืชที่ที่เคยมีการระบาดของโรค สามารถนำเข้าโรคในดิน โดยใช้ยาระบูดปูนขาว อัตรา 80 : 800 กิโลกรัมต่อไร่ หัว่านลงในแปลงหลังไประวนดินครั้งแรก จากนั้นไก่กลบและรดน้ำให้ดินมีความชื้น ทึ้งไว้ 3 - 4 สัปดาห์ จึงเริ่มปลูกพืช</li> <li>หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที และร้อยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพื่อป้องกันการระบาดของโรค</li> <li>ควรทำความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จบ เสียง ทุกครั้งหลังใช้กับต้นที่เป็นโรค</li> <li>ในแปลงที่มีการระบาดของโรค หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว นำส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เป็นโรค</li> </ol>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					ไปทำลายนกเปล่งปลูกลูก 7. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูก พืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค เช่น พืชตระกูลชิง พืชตระกูลมะเขือ มันฝรั่ง พริก และถั่วลิสง ให้สับปะรดพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัย เช่น ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง เพื่อตัดวงจร ของโรค
6. แก้วมังกร	ทุกระยะ การเจริญเติบโต	โรคสำคัญจุดสำคัญ น้ำตาล และผลเน่า (เชื้อราก <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> )	อาการเริ่มแรกที่ก่อ หรือผลเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ สีน้ำตาล คล้ายสีสนิมเหล็ก ต่อมานม.ylabel{background-color: #f2f2f2;} ใหญ่ พับ ๆ เส้นเล็ก ๆ สีดำซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราก สาเหตุโรคที่บริเวณผล บริเวณรอบผลมีสีเหลือง เมื่ออาการรุนแรงผลจะเน่า โดยถ้าเป็นที่ก่อ จะทำให้เนื้อเยื่อตรงผลหลุดเห็นเป็นรู หรือ เว้าแห้ง สำหรับที่ผลถ้าอาการรุนแรงจะ ทำให้ผลเน่า	อาการเริ่มแรกที่ก่อ หรือผลเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ สีน้ำตาล คล้ายสีสนิมเหล็ก ต่อมานม.ylabel{background-color: #f2f2f2;} ใหญ่ พับ ๆ เส้นเล็ก ๆ สีดำซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราก สาเหตุโรคที่บริเวณผล บริเวณรอบผลมีสีเหลือง เมื่ออาการรุนแรงผลจะเน่า โดยถ้าเป็นที่ก่อ จะทำให้เนื้อเยื่อตรงผลหลุดเห็นเป็นรู หรือ เว้าแห้ง สำหรับที่ผลถ้าอาการรุนแรงจะ ทำให้ผลเน่า	1. เลือกใช้ต้นพันธุ์ที่ปลอดโรค 2. ลดการให้ปุ๋ยในโครงเขต เนื่องจากเป็นพืช อ่อนน้ำ อาจทำให้พืชอ่อนแอเกิดโรคง่ายขึ้น 3. หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลด ความชื้น 4. งดให้น้ำช่วงปลายหรือเย็น ให้เฉพาะช่วงเช้า เพื่อลดความชื้นสะสมในทรงพุ่ม 5. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคอย่างร่มมัตรไว้ให้มีผล น้อยที่สุด การตัดแต่งก็ควรตัดตรงส่วนที่เป็น รอยต่อของข้อระหว่างกิ่ง นำส่วนที่เป็นโรคไป ทำลายนกเปล่งปลูกลูก แล้วพ่นด้วยสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช โพรคลอร่า 45% EC

สภาพแวดล้อม/สาเหะ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใดนี้	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตสำคัญ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					<p>อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แม่น้ำเขียว 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซอกซิสโตรบิน + ไดฟีโนโคนาโซล 20% + 12.5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ห่นให้ทั่วต้น ทุก 5-7 วัน จำนวน 4 ครั้ง<sup>6.</sup> และห่นอีกครึ่งในระยะติดต่อ โดยห่นให้ทั่วต้น<sup>6.</sup> ทุก 7 วัน จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>6. ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรค<sup>6.</sup> ไปใช้ต่อ กับต้นปกติ และควรทำความสะอาด เครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง</p> <p>**** ควรหยุดพ่นสารก่อนการเก็บเกี่ยว อย่างน้อย 15 วัน</p>
7. สับปะรด	ทุกระยะ การเจริญเติบโต	โรคยอด嫩芽 (เพื้อร่า <sup>7.</sup> <i>Phytophthora</i> spp.)	อาการที่ต้น ใบยอดมีเสี้ยด ที่โคนใบหรือฐานใบ จะเน่าข้ามมีสีขาวอมเหลืองขอบผลสีน้ำตาล ส่งกลิ่นเหม็นเฉพาะตัว เมื่อตึงส่วนยอดจะ <sup>7.</sup> หลุดโดยง่าย หากอาการรุนแรงกลุ่มใบตรง <sup>7.</sup> กลางต้นจะหักล้มพื้บลงมา อาการที่ราก อาการเริ่มแรกจะเห็นใบมีเสี้ยด คล้ายอาการที่ต้น ในด้านล่างนิ่มกว่าปกติและ		<ol style="list-style-type: none"> <li>เลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของ โรคนี้มาก่อน</li> <li>แปลงปลูกครั้งมีการระบาดบาน้ำตี ไม่ควรมี น้ำท่วมชั้ง และเมื่อมีน้ำท่วมชั้งควรรีบระบายนอก</li> <li>ใช้ส่วนขยายพันธุ์จากแหล่งที่ไม่พบรการ ระบาดของโรค</li> <li>ก่อนปลูกเช่าจุก หรือ หน้อพันธุ์ ด้วยสาร</li> </ol>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาหนึ่ง	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
				<p>แห้งดายเข้ามายากปลายใบ ต้นจะจักการ เจริญเติบโต รากมีแผลสีน้ำตาล เปื่อยและเน่า ดึงหลุดออกมากจากดินโดยง่าย</p> <p><u>อาการที่ผิด</u> ผลมีขนาดเล็ก ผลเน่าเป็นจุดสี เขียวเข้ม ฝ่าดูภายในเนื้อยื่อจะเน่าเป็นสี น้ำตาล</p>	<p>ป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสฟิต-อะลูมิเนียม 80% WP หรือ ฟอสฟิต-อะลูมิเนียม 80% WG อัตรา 50 - 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสฟอนิก แอชิด 40% SL อัตรา 50-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพราโนไมครอร์บไอลโรคคลอโรต์ + เมทาแลกซิล 10% + 15% WP อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟลูโอฟิโคไล + ฟอสฟิต-อะลูมิเนียม 4.4% + 66.7% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 5 นาที และพ่นยอดทุก 1 – 2 เดือน</p> <p>5. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้น ที่เป็นโรคrunแรง ควรขุดออกนำไปทำลาย นอกแปลงปลูก</p> <p>6. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต นำส่วนต่าง ๆ ของ พืชที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูก</p> <p>7. ไม่นำเครื่องมือที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อ กับ ต้นปกติ และควรทำความสะอาดเครื่องมือ<sup>*</sup> ก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง</p>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใดนี้	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตถ้ามีนาฬิกา/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
	8. ดาวเรือง	ออกดอก - เก็บเกี่ยว	โรคคอคอกน่า (เชื้อราก <i>Colletotrichum</i> sp.)	อาการเริ่มแรกกลับดอกมีลักษณะผื่นๆ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากปลายกลับดอก ไปหาโคนดอก แล้วเน่าลุกตามเปลี่ยนเป็นสี น้ำตาลทึบดอก ดอกเสียคุณภาพ ถ้าเข้ามา ทำลายในระยะดอกตูม จะทำให้ดอกไม่บาน หากโรครุนแรงจะลุกตามสู่ต้นทำให้ต้นเน่า และยืนต้นตาย	1. หมั่นตรวจสอบปลูกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุก อากาศมี ความชื้นสูง เมื่อพบดอกเริ่มแสดงอาการของโรค ตัดออกที่เป็นโรคออก นำไปทำลาย หรือฝังดิน นอกแปลงปลูก ไม่ทิ้งไว้ในบริเวณ หรือข้างแปลง เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค หากโรคยังคง ระบาดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไดฟโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซน 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอโรทาโนลนิล 50% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน 2. กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อให้อาหาร ต่ายเทศาตาก เป็นการลดความชื้น ทำให้ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค
	9. ปาล์มน้ำมัน	ต้นกล้า	โรคใบไหม้ (เชื้อราก <i>Curvularia</i> <i>oryzae</i> )	โรคที่พบมากในระยะต้นกล้า และช่วง 1 ปีแรก หลังลงแปลงปลูก มักพบอาการของโรคบนใบอ่อน ซึ่งส่วนมากจะเป็นปวยที่ใบเริ่มคลื่น ลักษณะอาการ เริ่มแรก เกิดจุดเล็ก ๆ สีเหลือง กระจายทั่วใบ ต่อมาแผลขยายใหญ่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ	1. ใส่ปุ๋ยบำรุงให้ต้นกล้าแข็งแรง 2. สังเกตใบอ่อนของต้นกล้า ซึ่งเป็นส่วนที่ง่าย ต่อการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรค หากพบ ใบเป็นโรคเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่เป็นโรค ออกไปทำลายนอกแปลง

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพิษที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะเวลา เจริญเติบโตของ พิษในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
				ลักษณะบุ่ม ขอบແຄนูน และมีวงสีเหลือง ล้อมรอบ หากโรคระบาดรุนแรงแพลงจะขยาย รวมกัน ทำให้ไปใหม่แห้ง ม้วนงอและเปราะ ฉีกขาดง่าย มีผลให้ต้นกล้าขาดจากการเจริญเติบโต ถ้าอาการโรครุนแรงมากอาจทำให้ต้นกล้าตาย	3. ต้นที่เป็นโรครุนแรง ต้องนำออกจากแปลงเพาะ เพื่อกำจัดแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 4. หากโรคยังคงระบาด พ่นด้วยสาร แม่นโคเซน 80% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซอกซิสโตรบิน + ไดฟิโนโคลาโซล 20% + 12.5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทรแอม 80% WG อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แคปแทน 50% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน ไม่ ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเป็น เวลานาน ควรใช้สลับชนิด เพื่อป้องกันการติดยา ของเชื้อสาเหตุโรค 5. แปลงที่พบโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำ แบบพ่นฝอย

รายงาน : สถาบันวิจัยพืชสวน (นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ) ข้อมูลจาก : วงศส.เพชรบูรณ์ และ ศวท.นครปฐม

: สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชක phenol งาน (นางสาวสุรีรัตน์ ทองคำ) ข้อมูลจาก : กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี

: กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอาชีวภาพพืช

ผู้ลั่นกรอง : สำนักวิจัยพัฒนาการอาชีวภาพพืช