




GPP ภาคเกษตรปี 67 มูลค่า 21,766 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.85 ของ GPP จังหวัด 59,060 ล้านบาท


- จำนวนประชากร 487,981 คน (170,143ครัวเรือน)
- จำนวนประชากรภาคการเกษตร (71,588 ครัวเรือน)
- ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัด ณ เดือนธันวาคม 812.57 ล้าน ลบ.ม. (55.89% ของความจุ)
- เขื่อนทดน้ำปัตตานี 6.49 ล้าน ลบ.ม. (83.18% ของความจุ)
- ปริมาณน้ำฝนสะสม 612.80 มม. (1 ม.ค.69 - 31 ก.ค.69)

สินค้าสิ่งปฏิกูลมูลสัตว์ (GI)

- กล้วยหินบนฝั่งสาธิต: กล้วยที่มีเนื้อแข็ง และเมื่อสุกจะมีรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 15 พ.ย.54
- ทุเรียนสดดีดน้ำยะลา: หนกถึง ทุเรียนพันธุ์หนกทอง ก้านยาว ชนิ พวงมี ไม้ซึ่งดิ่ง และหนวดดำ (ไอฉี) ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.65
- ส้มโชกุนเบตง: เนื้อสีส้มเข้ม หวานมีเปรี้ยวเล็กน้อย ปอกเปลือกง่ายและทานง่าย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 พ.ค.68
- มังคุดในสายหมอกเบตง: เนื้อมีสีขาวนวลนุ่มฟู ไม้ดำน้ำ ไม่เป็นเนื้อแกว่งโยล ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 พ.ค.68
- โกโก้เบตงยะลา: เป็นโกโก้ที่ผลิตจากโกโก้เมืองพันธุ์เบตง มีลักษณะหนักรสชาติหวาน ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 7 พ.ย.68
- ปลานิลสายน้ำไหลเบตง: เนื้อสีขาว แน่น และมีไขมันแทรกเล็กน้อย เมื่อปรุงสุกหรือทานสดจะมีรสชาติหวาน ปราศจากกลิ่นสาบโคลน ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 22 ม.ค.69

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (อยู่ระหว่างการพิจารณารับรอง GI)

- ปลาพลวงชมพูสาธาบาลา (ปลากือเลาะห์): เป็นปลาตระกูลปลาพลวง หรือปลาเวียน ที่มีราคาแพงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถรับประทานได้ทั้งเกล็ด
- ผักน้ำเบตง: เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในแหล่งที่สะอาดและมีการไหลเวียน ลำต้นตั้งตรงหรือทอดนอนแบบเกลียวคล้ายผักบุ้ง ใบประกอบ มีใบย่อยขนาดเล็ก



สถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

โรคใบจุดกลมจากเชื้อราคอแลนโทริคัม (โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา) มีพื้นที่ระบาด 39,512 ไร่
(ร้อยละ 3.38 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด 1,170,483 ไร่)

การแก้ไขปัญห (กรณีพบการระบาดในพื้นที่)

- ให้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พ่นสารเคมีบริเวณทรงพุ่มยอด และการฉีดด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูงบริเวณพุ่มใบจากด้านล่าง
- ให้สารชีวภัณฑ์ควบคุมและกำจัดโรคเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นยางพารา
- การใช้ไล่เดือน (ไล่เดือนแดงและไล่เดือนพันธุ์แอฟริกา) เพื่อประโยชน์ในการไล่พวกวันและให้ธาตุอาหารในสวนยางพารา

โรคเหี่ยวในกล้วยหิน มีพื้นที่ระบาด 607.56 ไร่
(ร้อยละ 16.99 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด 3,577 ไร่)

การแก้ไขปัญห

- สร้างการรับรู้ป้องกันโรคเหี่ยวในกล้วยหิน (ขั้นตอน วิธีการ ป้องกันกำจัดโรค)
- ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหิน (สนับสนุนหน่อพันธุ์กล้วยหินปลอดโรคขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหิน)

โรคโรคนาโคเนนาในทุเรียน มีพื้นที่ระบาด 1,052 ไร่
(ร้อยละ 1.15 ของพื้นที่ต้นทั้งหมด 91,403 ไร่)

สาเหตุของโรค

- เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butler)
- การแพร่กระจาย: ผ่าน น้ำ ดิน ลม ใบ กิ่งพันธุ์ และผล โดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักและความชื้นสูง

แนวทางการป้องกันและกำจัด

- การจัดการสวน/ปรับปรุงดิน/ตัดแต่งกิ่งและกำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรค
- การใช้ชีวภัณฑ์: ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา คลุกกับรำข้าวหรืออินทรีย์วัตถุ เพื่อควบคุมเชื้อ
- การใช้สารเคมี (เมื่อจำเป็น) : ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น เมทาแลกซิล หรือ ฟอสฟอรัสออกไซด์ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 69 มีโครงการที่สำคัญ คือ

งบพัฒนาจังหวัดยะลา

- โครงการพัฒนาขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา (กสค.) 2,304 ลบ.
- โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา (กสค.) 0.632 ลบ.
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปกาแฟ (กสค.) 0.641 ลบ.

งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

- โครงการยกระดับไม้ผลที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่เกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (กสค.) 2,985 ลบ.