




GPP ภาคเกษตรปี 66 มูลค่า 17,746 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.94 ของ GPP จังหวัด 52,282 ล้านบาท


- จำนวนประชากร 488,563 คน (147,055 ครครัวเรือน)
- จำนวนประชากรภาคการเกษตร (72,569 ครครัวเรือน)
- ปริมาณน้ำภาพรวมจังหวัด ณ เดือนธันวาคม 1,029.63 ล้าน ลบ.ม. (70.80% ของความจุ)
- เขื่อนทดน้ำปัตตานี 6.17 ล้าน ลบ.ม. (79.08% ของความจุ)
- ปริมาณน้ำฝนสะสม 10.10 มม. (1 ม.ค.69 - 29 ม.ค.69)

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

- กล้วยหินบันนังสตา** เป็นกล้วยที่มีเนื้อแน่น และเมื่อสุกจะมีรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 15 พ.ย.54
- ทุเรียนสะตอ** หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก้านยาว หนาม พวงหนาม มีกลิ่นหอม (ไอวี่) ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.65
- ส้มโชกุน** เนื้อสีส้มเข้ม หวานมีเปรี้ยวเล็กน้อย ออกเปลือกง่ายและขานิ่ม ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 พ.ค.68
- มังคุดในสายหมอกเบตง** เนื้อสีขาวนวลปุยฝ้าย ไม่ฉ่ำน้ำ ไม่เป็นเนื้อแกว่งยางไหล ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 พ.ค.68
- ไก่เบตงยะลา** เป็นไก่สดที่ผลิตจากไก่พื้นเมืองพันธุ์เบตง มีลักษณะหนังสีขาวอมเหลือง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 7 พ.ย.68

สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (อยู่ระหว่างการพิจารณารับรอง GI)

- ปลาพลวงชมพูสาบาลา** (ปลากือเลาะห์) เป็นปลาดุระกูลปลาพลวงหรือปลาเวียน ที่มีราคาแพงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถรับประทานได้ทั้งเกล็ด
- ปลานิลสายน้ำไหลเบตง** ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้มีอัตราการเจริญเติบโตดี มีขนาดตัว 3 กิโลกรัมขึ้นไป เมื่อนำไปประกอบอาหารจะมีความหวานน้อยกว่าปลานิลที่เลี้ยงในรูปแบบอื่น
- ผักน้ำเบตง** เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในแหล่งที่สะอาดและมีการไหลเวียน ลำต้นตั้งตรงหรือทอดนอนแบบเกลียวคล้ายผักบุ้ง ใบประกอบมีใบย่อยขนาดเล็ก



สถานการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

- โรคใบจุดกลมจากเชื้อราคอลเลโทเรีย (โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา) มีพื้นที่ระบาด 322,704 ไร่**
(ร้อยละ 27.57 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด 1,170,483 ไร่)
การแก้ไขปัญห (กรณีพบการระบาดในพื้นที่)
1) ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พ่นสารเคมีบริเวณทรงพุ่มยอด และการฉีดด้วยเครื่องพ่นแรงดันสูงบริเวณพุ่มใบจากด้านล่าง
2) ใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมและกำจัดโรคเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นยางพารา
3) การใช้ไล่เดือน (ไล่เดือนแดงและไล่เดือนพันธุ์แอฟริกา) เพื่อประโยชน์ในการไล่พวกวันและให้ธาตุอาหารในสวนยางพารา
- โรคเหี่ยวในกล้วยหิน มีพื้นที่ระบาด 777 ไร่**
(ร้อยละ 19.20 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด 4,045 ไร่)
การแก้ไขปัญห
1) สร้างการรับรู้ป้องกันโรคเหี่ยวในกล้วยหิน (ขั้นตอน วิธีการ ป้องกันกำจัดโรค)
2) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหิน (สนับสนุนหน่อพันธุ์กล้วยหินปลอดโรคขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหิน)

โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน มีพื้นที่ระบาด 523.25 ไร่
(ร้อยละ 0.57 ของพื้นที่ต้นทั้งหมด 91,006 ไร่)
สาเหตุของโรค
1) เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butler)
2) การแพร่กระจาย: ผ่าน น้ำ ดิน ลม ใบ กิ่งพันธุ์ และผล โดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักและความชื้นสูง
แนวทางการป้องกันและกำจัด
1. การจัดการสวน/ปรับปรุงดิน/ตัดแต่งกิ่งและกำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรค
2. การใช้ชีวภัณฑ์: ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา คลุกกับรำข้าวหรืออินทรีย์วัตถุ เพื่อควบคุมเชื้อ
3. การใช้สารเคมี (เมื่อจำเป็น) : ใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น เมทาแลกซิล หรือ ฟอสฟอรัสออกไซด์ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 69 มีโครงการที่สำคัญ คือ

งบพัฒนาจังหวัดยะลา

- โครงการพัฒนาขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา (กสค.) 2.304 ลบ.
- โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา (กสค.) 0.632 ลบ.
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปกาแฟ (กสค.) 0.641 ลบ.

งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

- โครงการยกระดับไม้ผลที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่เกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (กสค.) 2.985 ลบ.