

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com

แจ้งเตือนพืชที่เกิดผลกระทบ ช่วงวันที่ ช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศที่เกิด ในช่วงเวลานี้	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
อากาศหนาวเย็น ความชื้นสูงในตอน เช้า และกลางคืน กลางวันอากาศ ร้อน	กาแฟอาราบิกา	ระยะติดผล-ผลสุก พร้อมเก็บเกี่ยว	โรคแอนแทรคโนส (โร ค ไบ โห ม้ สีน้ำตาล/โรคกิ่ง แห้ง/โรคผลแห้ง) (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum coffeanum)	อาการที่ใบ: พบได้ทั้ง ใบอ่อนและใบแก่ ลักษณะเป็นจุดสี น้ำตาล เมื่ออาการ รุนแรงแผลจะขยาย ขนาดเป็นแผลใหญ่ ทำให้ใบแห้งไหม้ทั้งใบ อาการที่กิ่ง: เกิดอาการ ไหม้บนกิ่งเขียว ทำให้ ใบเหลืองและร่วง กิ่ง เหี่ยวและแห้งทั้งกิ่ง อาการที่ผล: พบได้ทั้ง ผลอ่อน และผลแก่ เริ่มแรกผลเป็นจุด สีน้ำตาลเข้ม เมื่อ อาการรุนแรงขึ้นจุดจะ ขยายรวมกันเป็นแผล รูปร่างไม่แน่นอน และ เนื้อเยื่อของผลยุบตัว ผลที่เป็นโรคจะหยุด การเจริญ เปลี่ยนเป็น สีดำ แต่ผลยังคงติด อยู่บนกิ่งกาแฟ	๑. เก็บผลและตัดแต่งกิ่ง ใบ ที่เป็นโรคไป เผาทำลายนอกแปลงปลูก ๒. ควรรักษาระดับร่มเงาให้เหมาะสม เพื่อรักษาระดับความชื้น เป็นการป้องกัน การเกิดโรค ๓. หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคเริ่มระบาด พ่นด้วยสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ เบโนมิล ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ๔. ในระยะติดผลควรหมั่นสำรวจและ ป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟอย่าง สม่ำเสมอ เนื่องจากมอดเจาะผลจะทำให้ ผลเกิดบาดแผล เป็นช่องทางให้เชื้อราเข้า ทำลายผลได้มากขึ้น ๕. หลังเก็บเกี่ยวผลกาแฟควรตัดแต่งกิ่ง และให้ปุ๋ยบำรุงต้น เพื่อให้ต้นกาแฟมี ความแข็งแรง
ท้องฟ้ามีดริ่มและมี ฝนตกหนัก (ภาคใต้)	กาแฟโรบัสตา	ผลสุกและระยะ เก็บเกี่ยวผลผลิต	๑. โรคที่เกิดจาก เชื้อรา Aspergillus sp.	ผลกาแฟสุกที่ร่วงหล่น บริเวณใต้ต้น อาจมี การปนเปื้อนของ เชื้อรา หรือผลผลิต กาแฟมีความชื้น เนื่องจากเก็บผลกาแฟ ที่สุก เ ล ย ร ะ ย ะ เก็บเกี่ยว หรือเก็บไว้ ใน กระ ส อ บ เป็น เวลานานหรือโดนฝน หรือความชื้นขณะตาก ผลกาแฟพบเชื้อราเข้า ทำลาย เมื่อนำมาสี ทำให้เมล็ดกาแฟแตก หัก คุณภาพลดลง	๑. ไม่ควรเก็บผลกาแฟที่ร่วงหล่นบริเวณ ใต้ต้นไม้ใช้ เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อน ของเชื้อรา ๒. เลือกรับผลกาแฟที่สุกเต็มที่ และ นำไปตากทันที ไม่ควรเก็บผลกาแฟไว้ใน กระสอบนาน การตากควรตากบนลาน พื้นปูนซีเมนต์แคร่ไม้ไผ่ หรือตาข่ายสีฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้ผลกาแฟสัมผัสดินและ ความชื้น และควรพลิกกลับผลกาแฟใน ระหว่างตากเป็นช่วงๆเพื่อให้สีของผล สม่ำเสมอ และป้องกันการเกิดเชื้อรา ๒. เมื่อพบเมล็ดกาแฟที่มีเชื้อรา รีบเก็บ ออกนำไปเผาทำลาย ๓. ทำความสะอาดเก็บกวาดเศษซากพืช หรือเศษเมล็ดกาแฟที่ตกค้างบนลานตาก

สภาพแวดล้อม/ สภาพอากาศที่เกิด ในช่วงเวลานี้	ชนิดพืชที่อาจ เกิดผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโต ของพืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควร เฝ้าระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อ
			๒. กิ่งกาแพหักโค่น เนื่องจากฝนตกหนัก	กิ่งกาแพที่ติดผลใกล้ ถึง ระยะเก็บเกี่ยว ฉีกหัก	ควรใช้ไม้ค้ำยันกิ่งกาแพ